

### Glasgow University Library



Sp. Coll. 1802



# PRINCIPES

SUR L'ART

DES ACCOUCHEMENS.

Digitized by the Internet Archive

# PRINCIPES

## SUR L'ART

# DES ACCOUCHEMENS,

PAR DEMANDES ET RÉPONSES, EN FAVEUR DES SAGES-FEMMES

DE LA CAMPAGNE:

NOUVELLE ÉDITION, revue, corrigée; augmentée & enrichie d'un grand nombre de Planches en taille-douce, propres à en faciliter? l'étude;

PUBLIÉE PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT:

PAR Me J. L. BAUDELOCQUE, Membre du Collège, Confeiller du Comité perpétuel de l'Académie royale de Chirurgie de Paris....



### A PARIS;

Chez M è Q U I G N O N l'aîné, Libraire, rue des Cordeliers, près des Écoles de Chirurgie.

M. DCC. LXXXVII.

Avec Approbation & Privilège;

A0324/1 GLASGOW WIVERSITY



## AVERTISSEMENT.

Cet Ouvrage, publié en 1775 pour la première fois, auroit pu être réimprimé l'année suivante, l'édition en ayant été épuisée presque à l'instant où il parut. Rédigé pour une Sage-semme dont l'instruction m'étoit consiée, & mis au jour, en quelque sorte à mon insu, par M. Dufot, Médecin de Soissons, à qui j'en avois communiqué le Manuscrit (\*), il servit

<sup>(\*)</sup> Cet Ouvrage parut d'abord avec le titre de Catéchisme, &c. tel qu'il est énoncé dans le privilège qui se trouve imprimé à la fin, & qu'on le remarque à la tête de quelques exemplaires qui ont été vendus ou donnés avant que les héritiers de M. DUFOT ne m'eussent remis en possession de l'édition, avant même que je ne susse positivement que ce Médecin avoit livré mon Manuscrit à l'impression. C'est sous ce même titre qu'il a publié dans le même temps, une Brochure de quatre-vingt dix pages, revêtue de l'Approbation de l'Académie royale des Sciences, de celle de cinq Médecins, & d'un décret de la Faculté de Paris, imprimée par ordre, & aux dépens du Gouvernement, pour être distribuée gratuitement aux Sages femmes de la Campagne : cette Brochure n'étoit que l'extrait de mon Ouvrage, &

### VI AVERTISSEMENT.

de guide dans plusieurs des Ecoles instituées dans les provinces, & sut traduit en Hollandois pour remplir les mêmes vues: ce qui annonçoit sans doute bien plus le besoin d'un ouvrage élémentaire à la portée des élèves Sages-semmes, que le mérite de celui dont j'étois, avec quelques regrets, devenu l'Auteur; car il étoit loin de la persection qu'on devoit desirer.

i'avois permis à M. Dufot d'en user ainsi, pour remplir les engagemens qu'il avoit pris envers le Magistrat qui l'avoit élevé depuis peu à la Chaire de Professeur d'Accouchemens, établie dans la Généralité de Soissons; ne voulant pas consentir à ce que le mien restât sous son nom. Mais il ne respecta la foi d'aucun des traités saits doubles entre nous, concernant l'un & l'autre de ces Ouvrages. J'ai annoncé dans l'Avertissement que j'ai substitué à celui que M. Dusot avoit mis à la tête du premier, que les approbations de l'Académie des Sciences & de la Faculté de Médecine dont j'ai parlé, me sembloient lui appartenir; je suis certain aujourd'hui qu'elles lui appartenoient, d'après des notes écrites de la main de l'un des cinq Commissaires nommés par la Faculté de Médecine, sur mon Manuscrit même, qui a servi de copie à l'impression: ce qui me fait présumer que ce n'est pas la Brochure de M. Dufot, que le Gouvernement a eu l'intention de faire imprimer à ses dépens, pour être distribuée gratuitement aux Sages-femmes des Provinces; mais l'Onvrage entier.

Malgré cet accueil flatteur, & l'efpoir, non d'un plus grand succès, mais d'un succès mieux mérité, près de douze années se sont écoulées, sans que j'aie pu me déterminer à retou-cher cet ouvrage, & à le livrer une feconde fois à l'impression. J'avoue que rien n'auroit su vaincre la résolution que j'avois prise de le laisser dans l'oubli, si j'eusse trouvé dans ceux qu'on a publiés pendant ce long intervalle de temps, les principes, l'ordre, la clarté & la précisson qui conviennent pour des élèves dont la plupart sont on ne peut moins disposés à l'étude. Ce n'est qu'après avoir revu ces ouvrages, que j'ai cédé aux instances de quelques personnes distinguées, souvent alarmées des tristes fruits de l'ignorance des Sages-semmes de la campagne; aux sollicitations de plusieurs Professeurs établis pour leur instruction, & de quelques-uns de ces hommes choisis pour veiller au bonheur des peuples, qui font de cette institution une branche importante de leur administration, & qui la regardent

viij AVERTISSEMENT.

comme une nouvelle source de pros-

périté pour l'Etat.

En retouchant mon Ouvrage, je n'ai pu m'empêcher de lui conserver la forme de dialogue, & de l'augmenter considérablement: peut - être trouvera-t-on que ce sont des écueils

que j'aurois dû éviter.

Je lui ai conservé la forme de dialogue, parce qu'une expérience de quinze années dans l'art d'enseigner, m'a démontré qu'elle avoit de grands avantages sur la forme ordinaire du discours, sur-tout pour des semmes dont l'esprit, la mémoire & le jugement sont peu cultivés. Au moyen de ce plan, elles pourront s'interroger réciproquement, & se faire des questions aussi suivies que lumineuses sur toutes les parties de l'Art des Accouchemens. D'autres personnes pourront les interroger de même, les instruire, les familiariser en quelque sorte avec les connoissances qu'elles seront susceptibles d'acquérir par l'étude, & les disposer à recueillir plus de fruit des leçons publiques que la bienfaisance du Roi leur fait donner gratuitement dans chaque Généralité. L'importance des fonctions auxquelles on destine ces femmes exigeroit qu'elles ne fussent admises à ces leçons publiques, qu'après y avoir été préparées de cette manière; ou qu'elles soient tenues d'y assister plusieurs années de suite; comme on l'exige des Sagesfemmes qui s'établissent dans la Capitale.

C'est le peu de connoissances qu'elles peuvent recueillir dans un seul cours, c'est la difficulté de les enlever plusieurs années de suite à leurs affaires domestiques, pour s'instruire convenablement, qui m'ont déterminé à leur rédiger un plus grand nombre de principes, & à les leur présenter avec plus de détails. Un volume de cinq cens soizante pages, pour des élèves Sages - semmes, ne paroîtra exorbitant qu'aux Auteurs de quelquesuns des Essais publiés dans les mêmes vues, & qui en sormeroient à peine la quatrième partie: les personnes vraiment pénétrées de l'importance de son

objet, celles qui connoissent l'étendue de notre Art & toutes ses dissicultés, ne verront dans ce livre volumineux que le desir que j'ai eu de le rendre plus utile. Mon dessein, en le composant, n'étoit pas que les Sagesfemmes dussent l'apprendre par cœur, & le réciter à la lettre; mais de les mettre dans le cas de se retracer souvent à l'esprit les vérités qui leur auront été enseignées dans le cours pu-blic des Accouchemens. C'est un Ouvrage qu'elles étudieront à loisir, qu'elles méditeront dans leurs retraites, & qu'elles consulteront fréquemment.

Je ne me suis pas contenté de développer les préceptes que contient cet Ouvrage au-delà de ce que l'ont fait avant moi ceux qui ont écrit en faveur des Sages-femmes; j'y ai joint une trentaine de Planches, pour en rendre l'étude plus facile. On imagine bien qu'elles n'ont pas toutes été faites d'après nature, parce qu'un siècle ne fauroit fournir à un seul homme, quelque employé qu'il fût, les occasions de former une pareille collection;


mais elles portent toutes un caractère de vérité qui ne se rencontre pas même dans celles de Smellie. Quelques-unes concernent le bassin de la semme, la matrice & ses dépendances, l'arrièrefaix & la tête du fœtus; les autres expriment les diverses parties de l'enfant qui peuvent se présenter à l'orifice de la matrice; la situation la plus ordinaire des jumeaux respectivement l'un à l'autre; enfin le renversement de la matrice. J'aurois voulu pouvoir les multiplier davantage, pour frapper d'autant plus la vue des élèves; les objets qui affectent leurs sens se gravant bien mieux dans leur mémoire, que la description qu'on leur en fait, quelque concife & claire qu'elle soit; mais par cela même qu'un plus grand nombre de tableaux eût rendu l'ouvrage d'une étude plus facile encore, il feroit peut-être devenu inutile pour quelques-unes de ces Sagesfemmes, par l'impossibilité de se le procurer.

Ne pouvant exprimer sur un aussi petit nombre de Planches les positions

multipliées & singuliérement variées, qui obligent presque toujours de re-tourner l'enfant & de l'amener par les pieds, je n'ai représenté que celles qui sont les plus ordinaires. Aidées par la connoissance de celles-ci, les Sages-femmes se rappelleront aisément tout ce que le Professeur chargé de les instruire aura eu le soin de leut démontrer sur le mannequin, relativement aux autres : j'observerai d'ailleurs que rien ne peut suppléer aux mannequins dans l'enseignement de l'Art des Accouchemens, & sur-tout pour l'instruction des femmes de la Campagne. Loués avec exagération, & peut-être avec enthousiasme, par quelques personnes, ces instrumens n'ont pas été assez connus ni assez appréciés de tous ceux qui se sont consacrés à l'enseignement. Ces mannequins ne sont qu'un simulacre impar-fait du vrai, je l'avoue; mais en les rejettant, de quels moyens se servira-t-on pour sormer la main des élèves aux opérations importantes de notre Art? Attendra-t-on, pour les exercer, les

occasions difficiles, qu'un Praticien en vogue rencontre à peine trois ou quatre fois dans le cours de chaque année? Quand ces occasions seroient plus fréquentes, seroit-il permis de confier à une main toujours timide & tremblante , fi elle n'est téméraire , la vie de deux individus? Quelqu'un peut-il douter que la faute la plus légère en apparence, même la plus petite omission dans la pratique des Accouchemens difficiles & contre nature, ne devienne quelquefois mortelle, ou ne traîne à sa suite de grandes & longues infirmités? Ce n'est qu'après s'être bien assuré de la capacité & de la dextérité des élèves, que les droits facrés de l'humanité nous permettent de les laisser opérer dans ces sortes de cas. Le mannequin est le seul moyen que nous ayons pour les former à ce genre d'opérations; si l'on ne peut le rendre semblable en tout à la nature, c'est à l'intelligence du Professeur à y suppléer, & à faire comprendre à ses disciples ce que le concours des plus habiles Mécaniciens ne pourroit imiter.

J'ai fait ensorte de rassembler dans cet Ouvrage toutes les vérités importantes de l'Art des Accouchemens, & de les présenter aux Sages-femmes dans le point de vue qui m'a paru devoir être le plus lumineux pour elles. J'ai décrit avec clarté ce que ces Sages-femmes doivent favoir, & ce qu'elles peuvent exécuter. Je n'ai pas craint de me répéter au besoin, afin de moins fatiguer leur attention, & de ne laisser à leur esprit que le moins de travail possible. J'ai indiqué soigneusement les cas qui exigent la présence d'un Accoucheur instruit, même le concours de l'Accoucheur & du Médecin. J'aurai fatisfait au devoir que m'imposoit la confiance des personnes qui m'ont sollicité à en-treprendre cet Ouvrage, & secondé les vues biensaisantes du Gouvernement, qui daigne le protéger & le faire publier par ses ordres, s'il est utile à l'humanité.



# PRINCIPES

SUR L'ART

# DES ACCOUCHEMENS.

De l'Accouchement en général, de fes différences, & des qualités néceffaires aux perfonnes de l'un & l'autre fexe, qui se destinent à l'exercice de l'art d'accoucher.

D. Qu'EST-CE que l'accouchement?

R. L'Accouchement, dans l'acception la plus générale, est la sortie de l'enfant & de son arrière-faix, du sein de la semme, quel que soit le terme de la grossesse où il se fasse & la manière dont il s'opère.

D. A quel terme de la grossesse l'accouchement se fait-il le plus communément?

R. La nature paroît avoir fixé la durée de la grossesse à neuf mois ; & c'est

A

à ce terme communément que l'accouschement a lieu. Nous observerons cependant qu'il ne doit pas se prendre rigoureusement; car il s'en faut le plus souvent de quelques jours, & même d'une semaine entière, que le neuvième mois ne soit révolu, lorsque la plupart des semmes accouchent; de sorte que celles qui deviennent enceintes le premier jour de leur mariage, accouchent avant la révolution du neuvième mois (a).

D. Le terme de l'accouchement ne peut-il

varier que de quelques jours?

R. Indépendamment des causes accidentelles qui peuvent troubler l'ordre de la nature, & provoquer l'accouchement dans tous les temps de la grossesse, on remarque que bien des semmes accouchent constamment au terme de sept mois, d'autres à celui de huit, ou beaucoup plutôt; mais il n'est pas également prouvé que la grossesse puisse puisse se prolonger au-delà de la révolution du neuvième mois.

D. Sous quel nom désigne-t-on l'accouchement, relativement au terme de la grossesse

où il s'opère?

<sup>(</sup>a) L'opinion publique est tellement en faveur de l'invariabilité du terme de l'accouchement, que les semmes vertueuses ont tout sujet de s'inquièter à cette occasion, dans la crainte où elles sont de devenir le jouet de la calonnie,

sur l'Art des Accouchemens. 3

R. On le désigne sous le nom de fausse couche, ou d'avortement, toutes les sois qu'il a lieu avant le septième mois révolu; & sous celui d'accouchement prématuré, lorsqu'il se sait depuis ce terme jusqu'à celui de huit; après ce temps, on l'appelle généralement accouchement à terme.

D. Sur quoi est sondée l'opinion de ceux qui soutiennent qu'il vaut mieux naître au terme de s'ept mois, qu'à celui de huit?

R. Cette opinion, qui paroît remonter jusqu'aux siècles les plus reculés, ne s'accorde ni avec la raison, ni avec l'observation. La raison indique que la certitude de conserver l'enfant est d'autant plus grande, que le terme de sa naissance est plus voisin de celui de la révolution du neuvième mois de la groffesse; & l'observation prouve qu'on élève bien plus de ces enfans qui naissent au huitième mois, que de ceux qui viennent au monde au septième. Ces derniers, en effet, font toujours si délicats, que ce n'est qu'à force de soins qu'on peut les conserver. Si l'on en cite de beaucoup plus forts à ce terme, c'est parce que leurs mères avoient méconnu l'instant où elles étoient devenues grosses, ou parce qu'elles avoient intérêt de le cacher.

D. Quelles sont les dissérentes dénominations de l'accouchement, relativement à la

manière dont il s'opère?

R. On le nomme naturel, contre nature

& laborieux. Le naturel est celui qui s'opère par les seules sorces de la mère; le contre nature est celui où l'on est obligé de retourner l'enfant & de l'amener par les pieds, soit qu'il se présente en mauvaise position, soit que des accidens imprévus ne permettent pas d'abandonner sa naissance aux soins de la nature. L'accouchement laborieux est celui pour la terminaison duquel il est nécessaire de se servir des instrumens.

D. En quoi consiste l'art des accouchemens?

R. Cet art, pris rigoureusement, n'est que celui d'aider la semme dans l'accouchement même, & d'écarter autant qu'il est possible tout ce qui pourroit alors influer sur ses jours & sur ceux de l'ensant. Considéré dans le sens le plus étendu, non-seulement il a pour objet la conservation de la mère & de l'ensant dans le moment de l'accouchement, mais encore le traitement des maladies de l'un & de l'autre, soit pendant la grossesse, soit pendant le temps des couches.

D. Quelles sont les connoissances néces-

saires pour bien exercer cet art?

R. Ces connoissances sont très-étendues : car, indépendamment de celles qui sont essentiellement nécessaires à toutes les personnes qui se destinent à l'exercice de la Médecine & de la Chirurgie, il en est de particulières à l'art des accouchemens. Si

fur l'Art des Accouchemens.

eette étendue de connoissances est audessus de la sphère d'une Sage-semme; sa l'on ne peut les exiger même d'un Accoucheur, du moins doivent-ils s'essorcer d'acquérir toutes celles qui ont rapport exclusivement à la partie qu'ils veulent exercer, de présérence.

D. Quelles sont les connoissances essentiellement nécessaires aux personnes de l'un & l'autre sexe qui se destinent à l'art des accou-

chemens?

R. Ces personnes qu'on nomme Accoucheurs & Sages - Femmes, doivent connoître, 1º. les parties de la femme qui ont quelques fonctions à remplir relativement à la génération, à la grossesse & à l'accouchement; 2°. les changemens que ces mêmes parties éprouvent dans tous ces cas; 3°. leurs rapports avec l'enfant dans le dernier; 4°. le mécanisme de l'ac-<mark>couchement le plus ordinaire ; 5°. les caufes</mark> qui rendent l'accouchement contre nature, ou laborieux, & la meilleure manière de le terminer; 6°. enfin les accidens & les maladies qui exposent les jours de la mère ou ceux de l'enfant, & quelquefois de l'un & de l'autre; celles qui exigent des secours pressans, & qui ne permettent pas, pour le moment, de prendre d'autres conseils que ceux de l'Accoucheur ou de la Sagefemme.

### CHAPITRE PREMIER.

Des parties de la Femme qui ont rapport à la génération, à la grossesse & à l'accouchement.

D. COMMENT divise-t-on les parties de la femme qui servent à la génération, à la gros-fesse & à l'accouchement?

R. On les divise communément en par-

ties dures & en parties molles.

Les parties dures constituent le bassin: les parties molles sont la matrice, ses ligamens, les trompes de Fallope, les ovaires, le vagin, & toutes celles qui forment le pudendum, qu'on appelle encorq parties honteuses.

### ARTICLE PREMIER.

Du Bassin.

D. Qu'EST-CE que le bassin?

R. Le bassin, considéré dans le squélette;

est une cavité située au bas de la colonne
épinière avec laquelle elle a de sortes connexions, & au-dessus des extrémités inférieures qui lui sont unies d'une manière

fur l'Art des Accouchemens. 7
très mobile. Cette cavité n'est formée que
de quatre pièces osseus dans l'adulte;
favoir, des deux os des îles, du facrum
& du coccix; mais on en remarque un
plus grand nombre dans l'enfance, chaque
os des îles étant composé de trois parties,
& le facrum de cinq.

D. Sous quels noms désigne-t-on les trois parties qui forment chaque os des îles, & celles

qui constituent le sacrum?

R. Les premières sont connues sous le nom d'ilium, d'ischium & de pubis : celles qui constituent le sacrum s'appellent sausses vertèbres, & n'ont point d'autres dénominations.

D. Est-il nécessaire de connoître ce que chacune de ces pièces osseuses présente de particulier?

R. Il suffit de considérer l'ensemble de celles qui forment le facrum; mais la description de chacune des trois qui constituent les os des îles, répandra plus de clarté sur tout ce que nous dirons du bassin.

### SECTION PREMIÈRE.

Des os des îles.

D. QUELLE est la figure & la situation des os des îles?

R. Ces os, connus également sous le nom d'os des hanches & d'os innominés, sont d'une figure trop irrégulière pour qu'on

A 1V

puisse leur en assigner une déterminée. Elle est telle néanmoins qu'on peut y considérer deux faces, quatre bords & quatre angles. Placés sur les côtés & le devant du bassin, ils forment plus que les deux tiers antérieurs de cette cavité. Pour les décrire avec plus de précision & de clarté, il faut examiner d'abord ce qui appartient à chacune des trois parties qui les composent dans l'enfance: parties qui conservent les mêmes noms dans l'adulte, quoiqu'elles ne soient plus séparées, & qu'on distingue alors à peine l'endroit où elles se sont réunies, & soudées les unes avec les autres.

D. Faites-nous donc la description de l'os-

R. L'os ilium est la plus grande, la plus mince & la plus élevée des trois pièces qui constituent l'os des îles: on pourroit l'appeller l'os de la hanche. Il est placé audessus de l'ischium & du pubis: sa forme est à-peu-près triangulaire, c'est-à-dire, telle qu'on peut y remarquer deux saces, trois bords & trois angles. Des deux saces, l'une sait partie de l'intérieur du bassin; elle est concave dans presque toute son étendue, & cette concavité s'appelle sos iliaque. Au-dessous de cette sosse se remarque une espèce d'angle ou de coude, qui s'étend obliquement de haut en bas, & du bord postérieur de l'os au bord ans

sur l'Art des Accouchemens.

9

térieur: ce coude, assez tranchant en artière, & arrondi en devant, sorme une partie de la marge du bassin, ou du détroit supérieur. Au dessous de ce coude, & vers la partie postérieure de la face interne de l'ilium, se voit une facette, ou empreinte cartilagineuse, dont la sorme se rapproche de celle d'un croissant; c'est par cette facette que l'os innominé s'artiquele avec le sacrum.

La face externe de l'ilium est moins régulière encore que celle que nous venons de décrire, & ne présente rien de bien important à connoître relativement à l'ac-

couchement.

Des trois bords de l'os isium, l'un est supérieur, le second antérieur, & le troissème postérieur. Le supérieur se nomme crête de l'os des îles, & sorme le rebord de la hanche; il est le plus long, & se contourne légérement à la manière de l'S italique. L'antérieur est beaucoup plus court, & ne présente de remarquable qu'une apophyse plus ou moins longue, qu'on appelle épine antérieure & inférieure de l'os des îles, Le bord postérieur offre une semblable éminence, qu'on désigne sous le nom d'épine postérieure & inférieure. La rencontre de ces deux bords avec le supérieur forme deux angles, qu'on appelle épines supérieures de l'os des îles, & qu'on distingue également en antérieure & en postérieure.

AY

Principes

L'angle inférieur de l'ilium est le plus épais & le plus irrégulier. On y remarque, 10. une fossette assez large, recouverte d'une lame de cartilage aussi mince que lisse & polie, qui fait partie de la cavité cotyloïde que nous indiquerons ci-après; 2°. deux autres facettes plus alongées, par lesquelles l'ilium se joint à l'ischium & au pubis.

D. Faites-nous la description de l'ischium.

R. L'ischium, situé au-dessous de l'ilium, présente moins d'étendue que celui-ci. Sa forme est telle qu'on ne peut le bien décrire qu'en le divisant en plusieurs parties. Sa partie moyenne présente trois faces & trois angles. L'une des faces répond à l'intérieur du bassin, la seconde à l'extérieur, & c'est sur la troisième, qu'on appelle tubérosité, qu'est appuyé le tronc quand on est assis bien perpendiculairement.

Les angles bordent les trois saces dont

il s'agit.

L'os ischium diminue singulièrement d'épaisseur dans sa partie antérieure, & se recourbe en quelque sorte sur lui-même en sorme de croissant. On donne à ce prolongement le nom de branche ou d'apophyse montante de l'ischium; cette apophyse se joint à une semblable, qui descend de l'os pubis, & sorme avec elle un des côtés de cette large échancrure qui se voit à la partie antérieure & inférieure du fur l'Art des Accouchemens. 11 bassin, que nous appellerons arcade du

pubis.

L'extrémité postérieure de l'ischium est beaucoup plus épaisse que le reste de l'os. On y remarque une sossette, qui fait partie de la cavité cotiloïde, & deux autres sacettes plus longues que larges, par lesquelles cet os s'unit à l'ilium & au pubis. On observe de plus à cette grosse extrémité de l'ischium une apophyse, longue de quatre à six lignes, & assez aiguë, qu'on nomme épine ischiaique.

D. Faires-nous la description de l'os pubis.

R. L'os pubis est la plus petite des trois pièces qui composent l'os innominé; il occupe le devant du bassin, & forme avec son semblable, une portion de cercle trèsalongée: on l'appelle communément l'osbarré. Le corps, ou le milieu de cet os est triangulaire; on y remarque une face supérieure, une interne & une externe, ainsi que trois angles, dont le plus saillant sait partie de ce qu'on appelle la marge du bassin, ou le détroit supérieur.

L'os pubis est plus gros en arrière qu'en devant. Sa grosse extrémité présente deux facettes, par lesquelles il s'unit à l'ilium & à l'ischium, & une troissème un peu concave & recouverte de cartilage, qui concourt à former la cavité cotyloïde.

L'extrémité antérieure de l'os pubis est applatié de devant en arrière, ou de l'intérieur du bassin au dehors; elle se termine par une empreinte articulaire, longue
de douze à quinze lignes, sur six lignes
au plus de largeur, par laquelle il s'unit
à celui de l'autre côté. La direction de
cette empreinte articulaire est telle, qu'elle
forme avec la face supérieure de l'os
pubis un angle presque droit; c'est le point
de réunion de ces deux parties qu'on appelle l'angle, & quelquesois l'épine du pubis.

De l'extrémité antérieure de l'os pubis descend une espèce d'apophyse, longue de six à huit lignes, un peu applatie & plus large vers son commencement qu'à son extrémité; on la nomme la branche du pubis. Elle est comme torse dans sa longueur, de manière qu'un de ses bords devient presque antérieur; & elle s'unit à l'apophyse montante de l'ischium, avec laquelle elle sorme un des côtés de l'arcade du pubis.

D. Comment ces trois os, l'ilium, l'ischium & 'le pubis s'unissent & se soudent ils en-

Semble?

R. Ces pièces se soudent au moyen d'une substance cartilagineuse, qui se durcit & se convertit elle-même insensiblement en os; de manière que dans la suite, & toujours avant l'âge parfait, il ne reste presque aucune trace de leur séparation.

Cette espèce de soudure se remarque vers le milieu de la cavité cotyloide, &

fur l'Art des Accouchemens. 13
à l'union de la branche de l'ischium avec

celle du pubis.

D. Indiquez-nous ce que présente de particulier l'os des îles ou innominé, lorsque les trois pièces qui viennent d'être décrites sont

ainsi réunies.

R. Il offre, vers le milieu de sa face externe, une cavité de sorme circulaire assez prosonde, recouverte d'un cartilage lisse & poli; & au-devant de cette cavité; destinée à recevoir la tête de l'os de la cuisse, une large ouverture, qu'on appelle tron ovalaire.

### SECTION IL

### De l'os sacrum.

D. INDIQUEZ-NOUS quelle est la figure & la situation de l'os sacrum, & ce qu'il présente

de plus remarquable.

R. L'os facrum ressemble à une espèce de pyramide un peu applatie & recourbée sur elle-même, mais dont la base seroit en haut & la pointe en bas. Il est situé à la partie postérieure du bassin, & comme enclavé entre les deux os des îles.

On y considère deux faces, deux bords

sa base & sa pointe.

Celle des faces qui fait partie de l'intérieur du bassin est concave selon sa longueur. On y remarque huit trous d'inégale

largeur, qu'on nomme trous sacrès antérieurs. Ces trous paroissent percés obliquement dans l'épaisseur de l'os, de sorte qu'ils sorment vers leurs bords externes, comme autant de gouttières plus ou moins superficielles. Ils pénètrent dans un canal pratiqué selon la longueur de l'os même, donnent issue à de gros ners, dont la plupart vont se distribuer aux cuisses, aux jambes & aux pieds : ce sont les ners sacrés.

La face externe du facrum est convexe; & comme hérissée d'un grand nombre d'apophyses distribuées en plusieurs rangées; celles du milieu se nomment apophyses épineuses. Au-dessus de la première de ces apophyses se remarque une ouverture triangulaire & assez large, qui forme l'entrée du canal sacré; & il en est une autre semblable vers le bas, mais plus petite, qui termine ce même canal. On voit de plus à la face externe du sacrum huit trous, distribués comme ceux de la face interne.

Les bords du facrum présentent supérieurement une empreinte articulaire, comme celle que nous avons remarquée à la partie postérieure de la face interne de l'os ilium.

La base du sacrum en est la partie la plus large & la plus épaisse. On y remarque au milieu une empreinte cartilagineuse de sorme ovale, dont la direction est telle

fur l'Art des Accouchemens. 15 que le bord antérieur se trouve plus élevé que le postérieur. Derrière cette empreinte sont deux apophyses qui s'élèvent des bords de l'entrée du canal sacré; elles sont un peu concaves d'un côté, & recouvertes d'un cartilage articulaire.

La pointe du facrum offre une autre empreinte ovalaire temblable à celle de la base, mais beaucoup plus petite, & inclinée différemment, son bord postérieur

étant plus élevé que l'antérieur.

#### SECTION III.

#### Du Coccix.

D. FAITES-NOUS la description du coccia; R. Le coccix, qu'on appelle vulgairement l'os du croupion, est formé de trois pièces qui diminuent insensiblement de largeur depuis le haut de la première jusqu'à l'extrémité de la dernière. Réunies, ces trois pièces représentent en petit la figure du sacrum, & forment, comme lui, une espèce de pyramide, longue seulement de douze à quatorze lignes, & légérement recourbée sur sa partie antérieure.

Les trois os du coccix sont liés entre eux, de manière qu'ils jouissent long-temps de quelque mobilité; & le premier est joint à-peu-près de même à la pointe du

facrum.

### SECTION IV.

De la connexion des os du bassin entre eux; de celle du bassin même avec la colonne vertébrale & les extrémités inférieures.

D. DE quelle manière les os du bassin se joignent-ils ensemble, & quels sont les moyens

qui les tiennent réunis?

R. L'espèce de cercle que le bassin décrit intérieurement paroît interrompu ou coupé par trois lignes qu'on nomme symphises. Celle qui se voit en devant est la symphyse du pubis, & les autres placéesen arrière & sur les côtés sont les sym-

phises sacro-iliaques.

Les os pubis sont liés ensemble, 1° au moyen d'une substance cartilagineuse & ligamenteuse qui est attachée sermement à l'extrémité antérieure de chacun d'eux; 2° par un grand nombre de faisceaux tendineux ou aponévrotiques & ligamenteux, qui s'entre-croisent disséremment; 3° par des ligamens particuliers, dont le plus remarquable, appellé ligament trans-versal, est au-dessous de la symphise.

Les os des îles s'articulent à-peu-près de la même manière avec le facrum; & ces trois os font également liés par des ligamens forts & nombreux, qui s'attachent

fur l'Art des Accouchemens. 17

à l'un & à l'autre os de chaque côté. Quelques-uns de ces ligamens sont à la partie postérieure du bassin, & les autres fe trouvent au-dessus & au-dessous de la jonction des os. Nous ne décrirons que les derniers qu'on appelle facrosciatiques.

Les ligamens sacro-sciatiques ne sont qu'au nombre de deux, un de chaque côté. Ils descendent de la partie postérieure de l'os des îles, des parties latérales du facrum & du coccix, vers la tubérofité & l'épine de l'un & l'autre os ischium; où ils se terminent par deux branches, qui laissent entre elles un espace triangulaire assez considérable.

Ces ligamens tendus en manière de corde depuis le facrum jusqu'aux os ischium, fervent à compléter les parties postérieures & latérales du bassin, & sont paroître audessous des symphises sacro-iliaques, deux larges ouvertures ovales, comme celles qui se remarquent aux côtés de l'arcade

du pubis.

Le coccix s'unit à la pointe du facrum au moyen d'une substance ligamenteuse & cartilagineuse, & de plusieurs ligamens particuliers; mais cette articulation n'est pas aussi serrée que les précédentes.

D. Comment le bassin est-il uni à la colonne

veriébrale?

R. La connexion du bassin avec la colonne vertébrale est plus composée que celles que nous venons de décrire. On

remarque, 1° que le facrum est uni au bas de la dernière vertèbre lombaire par une substance ligamenteuse & comme cartilagineuse, assez épaisse & élastique, qui est attachée fortement à l'un & à l'autre; 2°. que ce premier moyen d'union est fortissé par plusieurs ligamens, dont les uns sont en devant, en arrière & sur les côtés, & les autres dans le canal formé par la réunion des vertèbres, & qui se continue avec celui du sacrum postérieurement; 3°. que le sacrum-s'aricule encore à cette dernière vertèbre au moyen des deux apophyfes, que nous avons décrites en parlant de la base de cet os; 4°. enfin, que la vertèbre dont il s'agit, est liée de chaque côté à la crête de l'os des îles & à la base du sacrum même, par deux ligamens très-forts.

D. Quelles sont les connexions du bassin avec les extrémités inférieures?

R. Ces connexions font bien différentes de ce'lles dont nous venons de parler. Ce ne sont plus des pièces assemblées qui ne fe touchent que par des surfaces peu étendues diversement figurées, & que de nom-breux ligamens retiennent en place. On voit au milieu de la face externe de l'os des îles, une cavité circulaire, appellée cotyloïde, qui reçoit la tête de l'os de la cuisse, & dans laquelle cette tête est rețenue par un ligament très-fort, & par fur l'Art des Accouchemens. 19 une capsule très-épaisse en forme de bourse; mais de sorte que la cuisse peut exécuter les plus grands mouvemens dans toutes les directions possibles.

# EXPLICATION

# DE LA PREMIÈRE PLANCHE.

Cette Planche représente un bassin bien conformé.

AAAA. Les os ilium.

BBBB. Les os ischium.

CCCC. Les os pubis.

dddd. Le facrum.

EEE. Le coccix.

F. La dernière vertèbre des lombes:

gg. Les fémurs, ou les os des cuisses.

HH. Les fosses iliaques.

hhhh. La crête des os des îles.

ii. L'épine supérieure & antérieure des os des îles.

KK. L'épine antérieure & inférieure des os des îles.

LL. Les cavités cotyloïdes.

MM. Lieu où l'os ilium, l'os ischium & l'os pubis se soudent ensemble.

NN. La tubérosité de l'ischium,

OO. L'angle de l'os pubis.

PP. La branche de l'os pubis & celle de l'os ischium soudées ensemble.

qq. Le trou ovalaire. RRRR. Les trous sacrés.

SSSS. Ligamens qui vont des apophyses transverses de la dernière vertebre des lombes, à l'os facrum & à la crête des os des îles.

T. La symphise du pubis.

VV. Les symphises sacro-iliaques. uu. La symphise sacro-vertébrale. xx., L'articulation de l'os de la cuisse

avec l'os des îles.


## SECTION V.

De l'état naturel des symphises des os àu bassin, & de l'altération qu'elles éprouvent quelquefois, soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement.

D. UEL est l'état naturel des symphises

des os du bassin?

R. Ces symphises, dans l'ordre naturel, sont tellement disposées, & si étroitement ferrées, que les os du bassin ne sauroient fe mouvoir, au moins d'une manière apparente à la vue; car ils ne sont pas absolument immobiles. La raison & l'observation prouvent que cette disposition étoit des plus importantes & des plus nécessaires à la facilité de certaines fonctions; que





sur l'Art des Accouchemens. 21.

fans elle la marche n'eût pu fe faire que difficilement, avec douleur & en boîtant; que la course, la danse & beaucoup d'autres evergices pous eusent été impossibles.

tres exercices nous eussent été impossibles. Si cette stabilité étoit nécessaire de la part des symphises facro - iliaques & de celle du pubis, elle eût été nuisible dans celle du facrum avec le coccix; aussi avonsnous déjà observé que cette connexion étoit autrement disposée, & que le coccix pouvoit se mouvoir, soit en portant sa pointe en dehors, soit en la ramenant vers la cavité du bassin.

L'immobilité du coccix auroit pu devenir contraire à la facilité de l'accouchement; comme on le remarque quelquefois, quand cette appendice est soudée intimément au sacrum, & ne fait qu'une

feule & même pièce avec lui.

La jonction du facrum à la colonne vertébrale, semblable à celle du coccix; quoique plus composée, permet également au bassin de se mouvoir sur cette colonne, & à celle-ci d'exécuter quelques mouvemens sur le bassin; & cette mobilité n'étoit pas moins nécessaire que celle du coccix, quoiqu'en des circonstances bien différentes.

D. Quelles sont les diverses altérations que peuvent éprouver la symphise du pubis & les symphises sacro-iliaques, soit dans la grossesse seit dans l'accouchement?

R. Ces symphises peuvent se relâcher à des degrés dissérens dans le cours de la grossesse, par l'infiltration de la sérosité qui a lieu dans le tissu des parties ligamenteuses qui les constituent; ce qui permet aux os de se mouvoir, de vaciller en quelque sorte, & de s'écarter. D'autres sois ces mêmes symphises, moins disposées à résister ou à s'alonger, se déchirent dans les essorts de l'accouchement; ce qui donne lieu au même écartement & à des accidens le plus souvent très-sâcheux.

D. Le relâchement de ces symphises a-t-il lieu constamment à la sin de la grossesse ?

R. Si ce relâchement existe aussi constamment que bien des auteurs l'ont assuré; du moins n'est-il pas remarquable extérieurement, & aucuns symptomes rationnels ne l'annoncent-ils pas chez la plupart des semmes qui sont près du moment de l'accouchement. Rarement on l'a observé d'une manière assez apparente à l'ouverture des cadavres, soit à la suite d'un accouchement ordinaire, soit à la suite d'un accouchement dissicile, pour ne laisser aucun doute sur son existence; & quand on l'a trouvé, le plus souvent il ne permettoit qu'un très-petit écartement de la part des os.

On ne peut nier cependant que ce relâchement n'eût été quelquefois assez grand pour permettre aux os de s'écarter de fur l'Art des Accouchemens. 23
plusieurs lignes; mais alors les semmes en étoient très-incommodées avant d'accoucher.

D. A quels signes reconnoît-on qu'un pareil relâchement a lieu dans les symphises

indiquées?

R. Quand il est aussi considérable, on le reconnoît au toucher, par la mobilité des os. La semme ne peut marcher qu'en boîtant, avec peine & douleur; souvent même elle ne peut faire un seul pas, & le plus léger mouvement des extrémités inférieures, même quand elle est au lit, lui devient pénible & douloureux. Ces derniers symptomes, que nous appellons rationnels, ont accompagné plusieurs sois un relâchement moins considérable que celui dont il s'agit.

D. Ce reláchement si contraire au bien-être de la femme dans les derniers temps de la grossesse, ne devroit-il pas être favorable à

L'accouchement?

R. C'est l'opinion de la plupart de ceux qui ont écrit sur l'Art des accouchemens depuis plus de deux mille ans; & à peine s'est-il trouvé quelques Auteurs, dans cette longue suite d'années, qui se soient élevés contre ce sentiment, quoique peu vraisemblable. Plusieurs, d'après cette opinion, ont même prescrit des moyens pour relâcher les symphises dont il s'agit, croyant ainsi agrandir le bassin; & d'autres ont conseillé

de couper celle du pubis. Tandis que ceuxci coupoient la symphise qu'ils croyoient ne pouvoir relâcher, les premiers assuroient que par des bains, des somentations & des linimens, on avoit plus d'une sois procuré au bassin l'amplitude nécessaire pour l'accouchement, & prévenu, en pareilles circonstances, la nécessité de l'opération césarienne, toujours très-dangereuse.

D. Comment démontrerez-vous que le relâchement des symphises du bassin n'a pu être aussi favorable à l'accouchement que l'ont

annoncé tant d'Auteurs?

R. Ce relâchement ne peut être favorable à l'accouchement qu'autant qu'il permet aux os du bassin de s'écarter au point de procurer à ce canal les dimensions qui sui sont nécessaires pour donner issue à l'ensant. Or, ce relâchement ne peut être assez considérable pour ramener le bassin mal conformé à son état naturel & propre à l'accouchement. Quand il permettroit aux os pubis de s'écarter d'un pouce, ce qui est sans exemple, l'ouverture du bassin, considérée du pubis au sacrum, ne s'en trouveroit que de deux lignes plus large; lorsque souvent il s'en saut d'un pouce, & même de deux, que le diamètre de cette ouverture, pris dans la direction assignée, ne soit aussi grand que le plus petit

fur l'Art des Accouchemens. 25° petit des diamètres de la tête de l'enfant.

Si un écartement d'un pouce entre les os pubis, qui n'a jamais eu heu à l'inftant de l'accouchement sans que la symphise ne sût déchirée, ne peut donner que deux lignes de plus au petit diametre de l'entrée du bassin, un écartement beaucoup plus petit, & tel qu'on l'a remarqué le plus souvent, n'ajoutera rien à ce diamètre, & presque rien dans les autres directions selon lesquelles on a coutume de mesurer le bassin. C'est une vérité qu'on ne peut méconnoître aujourd'hui.

D. Si la rupture de la symphise du pubis permet aux os de s'écarter davantage, que ne le fait le relâchement de cette symphise, tou-jours si borné, ne seroit-il pus à propos,

dans bien des cas, de la coifer?

R. On ne peut se dissimuler que la rupture complette de la symphise du pubis n'eût permis à quelques semmes d'accoucher avec moins d'essorts; & que dans le nombre de celles qui ont éprouvé cet accident, il en est dont on n'auroit pu obtenir que difficilement l'issue de l'ensant, si la symphise dont il s'agit ne se sût déchirée: mais quelle a été la destinée de ces semmes? Si or, ne se sût décidé que d'après leurs exemples à couper la symphise du pubis, comme on l'a fait tant de sois depuis 1777, aucune semme n'auroit encore soussert cette nouvelle opération.

 $\mathbf{R}$ 

Principes

D. Quelles sont tes indications curatives du relâchement & de la rupture des symphises

des os du bassin?

R. Le relâchement, à moins qu'il ne foit extrême, n'entraîne pas après lui de suites bien fâcheuses; il en résulte seulement une marche claudicante, pénible & douloureuse. Mais la rupture de ces symphises est toujours un accident très-grave; elle conduit promptement à la mort, quand elle est complette, & lorsque l'écartement a été confidérable.

Dans le cas de relâchement, on presmaintient les os du bassin rapprochés au moyen d'un bandage convenable; on a recours aux cataplasmes astringens, aux sumigations aromatiques & aux bains froids; mais on observe de n'employer ces derniers moyens que lorsque les suites des couches n'existent plus, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a plus d'écoulement de lolorsqu'il n'y a plus d'écoulement de lochies.

Dans le cas de rupture, on s'efforce de prévenir ou de combattre l'inflammation qui suit de près ce déchirement, &: de s'opposer à la suppuration, aux dépôts; & autres accidens qui en dépendent.

#### SECTION VI.

# Division du Bassin.

D. COMMENT divise-t-on le bassin?

R. On le divise communément en deux parties, une supérieure, qu'on appelle le grand bassin, & une inférieure, qu'on

nomme le petit bassin.

La première comprend tout ce qui est au-dessus de la ligne que nous avons déjà désignée sous le nom de marge. Elle est formée par les deux tiers des os ilium proprement dits, par une portion du sacrum & les dernières vertèbres des lombes. Elle se trouve échancrée largement en devant, de sorte qu'il y a huit à neuf pouces de vuide, de l'extrémité antérieure de la crête de l'un des os des îles au même point de l'autre.

Le petit bassin est formé par le tiers inférieur des os ilium, les ischium, les pubis, le coccix, & presque la totalité

du facrum.

Tous ces os sont disposés & arrangés de manière qu'ils sorment supérieurement une espèce de cercle un peu applati, & inférieurement trois échancrures larges & prosondes, dont l'une est au-dessous de la symphise du pubis, & les deux autres vers les symphises sacro-iliaques. On

Bij

appelle ces dernières, échancrures sacro-sciatiques, & la première, arcade du pubis.

D. Comment doit-on considérer le bassin

relativement à l'accouchement?

R. On doit en connoître la figure, les dimensions & la direction: mais, pour exposer ces choses avec plus de clarté, il convient d'examiner séparément les dissérentes parties de cette cavité. On considère au perit bassin deux détroits, savoir un supérieur & un inférieur, & de plus son excavation, qui en est la partie moyenne.

D. Qu'entendez-vous par détroit supérieur, qu'lle en est la figure, & quelles en sont les

dimensions?

R. Le détroit supérieur n'est autre chose que le cercle dont nous venons de parler. Il est formé par le bord antérieur de la base du facrum, le coude que décrit la face interne des os ilium, & l'angle supérieur des os pubis. Ce détroit est pour l'ordinaire d'une forme un peu ovale, de sorte qu'il est plus large d'un os des îles à l'autre, que du pubis au facrum. Quelques ois le contour en est circulaire; d'autres sois semblable à un cœur de carte à jouer, & dans quelques cas on ne peut plus irrégulier; ce qu'il est important de bien connoître dans la pratique des accouchemens difficiles.

Pour déterminer le développement ou

fur l'Art des Accouchemens. 29 l'étendue du détroit supérieur, on y assigne plusieurs diamètres : ce sont autant de lignes qui vont d'un point du détroit à un autre point, en passant à-peu-près au centre de cette ouverture.

Le plus petit de ces diamètres, qui est pour l'ordinaire de quatre pouces, se mesure de la symphise du pubis au milieu de la saillie que sorme la base du sacrum.

Le plus grand passe transversalement d'un os ilium à l'autre, & est communé-

ment de cinq pouces.

Le troisième & le quatrieme diamètres coupent le détroit obliquement, du point qui répond au bord antérieur de la cavité cotyloïde d'un côté, au milieu de la symphite facro-iliaque du côté opposé : on les nomme diamètres moyens ou obliques, & ils ont quatre pouces six à huit lignes d'étendue sur la plupart des bassins.

D. Vous venez d'assigner la figure & les dimensions du détroit supérieur, prises dans un bassin sec & privé de tous les muscles, dites-nous si ces mêmes muscles n'y apportent pas de changemens dont la connoissance soit

nécessaire à l'accouchement.

R. Les connoissances que nous venons d'établir à cet égard suffisent à l'accoucheur; mais pour la plus grande exactitude, nous ajouterons que parmi les muscles qui recouvrent le dedans du bassin, il y en a deux appellés psoas, qui descendent

Biij

30 Principes

des parties latérales de la colonne lombaire sur les côtes du détroit supérieur, pour se rendre à la partie supérieure & interne de l'os des cuisses; que ces deux muscles, un de chaque côté, changent un peu la forme du détroit, & en diminuent la largeur, de manière que le diamètre transversal est alors plus petit que les diamètres obliques; mais cette remarque est peu importante.

D. Quelle est la figure du détroit inférieur,

& quelles en sont les dimensions?

R. Ge détroit décrit un cercle très-irrégulier, étant formé par le contour de l'arcade du pubis, le bord interne de la tubérofité de l'un & l'autre os ischium, les ligamens sacro-sciatiques, & l'extrémité du coccix. On y assigne deux diamètres principaux, dont l'un s'étend du bord inférieur de la symphise du pubis à la pointe du coccix, & l'autre mesure transversalement le plus grand écartement que laissent entre eux les os ischium. Ils sont au moins de quatre pouces d'étendue chez le plus grand nombre de semmes.

Nous observerons que le premier de ces diamètres est susceptible de s'augmenter au moment où la tête de l'enfant traverse le détroit inférieur, l'extrémité du coccix pouvant alors se porter en arrière; ce qui fait qu'il passe généralement pour le plus grand. Nous ajouterons encore que ce

diamètre se trouve dans la direction du plus petit diamètre du détroit supérieur, & que le plus grand de celui-ci répond au plus petit du détroit inférieur: observation qui n'est pas moins importante que la précédente, & que l'accoucheur ne doit jamais perdre de vue dans la pratique des accouchemens difficiles, puisque de cette observation seule dépend quelquesois le succès de son entreprise.

D. Le développement que vous venez d'assigner à l'un & à l'autre détroits est-il abso-

lument nécessaire à l'accouchement?

R. Non; à moins que la tête de l'enfant ne soit beaucoup plus grosse que d'ordinaire. Dans la plupart des cas, chaque diamètre pourroit avoir six lignes de moins que la longueur qui lui a été assignée, sans que le bassin en devienne trop étroit pour le passage de l'enfant: la longueur requise de la part du petit diamètre de l'un & l'autre détroits étant de trois pouces & demi, & celle du grand diamètre de quatre pouces au plus.

D. Quel est le plus grand diamètre du détroit supérieur, quand il affecte parfaitement

la forme circulaire?

R. Tous les diamètres seroient alors de la même longueur, si les muscles des environs ne changeoient pas un peu la sorme circulaire de ce détroit. Mais comme les muscles psoas le rétrecissent transversale.

Principes 2

ment, ainsi que nous l'avons observé cià dessis, le diamètre qui va du pubis au sacrum est le plus grand, relativement à l'accouchement.

D. Quelles sont les dimensions de la partié moyenne, ou de l'excavation du bassin?

R. La partie moyenne du bassin préfente un peu plus de largeur du milieu du sacrum à la symphise du pubis, que les détroits même mesurés dans cette diréction; ce qui vient de la courbure, ou de la concavité du sacrum.

D. Quelle est la profondeur du peit bassin?

R. La profondeur du bassin doit être déterminée par la hauteur des parois de cette cavité. Elle est de quatre pouces & demi à cinq pouces vers la partie postérieure, de trois pouces & demi au plus sur les côtés, & d'un pouce & un quart, ou un pouce & demi derrière la symphise du pubis.

D. Quelles sont les dimensions de l'arcade

du pubis?

R. Cette arcade, qui a pour sommet le bord insérieur de la symphise du pubis, & pour base l'écartement que laissent entre elles les tubérosités ischiatiques, est d'un pouce & demi de largeur en haut, & de plus de trois pouces & demi en bas. Sa hauteur est de deux pouces moins quelques lignes, dans la plupart des bassins. sur l'Art des Accouchemens. 33

D. Quelle est la direction du canal du bassin, soit relativement à l'horison, soit re-

lativement au corps de la femme?

R. Lorsque le squélette est debout, & dans une attitude naturelle, l'ouverture supérieure du bassin est tellement inclinée de derrière en devant, que la base du facrum se trouve beaucoup plus élevée que les os pubis, & que l'œl ne découvre que le sommet de l'arcade de ces derniers.

# EXPLICATION DE LA PLANCHE II. FIGURE I.

Cette figure représente le grand bassin seulement, & le détroit supérieur.

aa. Les os ilium & les fosses iliaques.

bb. Les os pubis.

cc. Le dessus des cavités cotyloïdes; points où les os pubis se joignent aux os ilium.

dd. La base du sacrum.

ee. La dernière vertebre des lombes.

f. La symphise du pubis.

gg. Les symphises facro-iliaques. h. La symphise sacro-vertébrale.

AA. Cette ligne indique le diamètre antero-

Principes

postérieur, ou le pétit diamètre du détroit supérieur.

BB. Le diamètre transversal, ou le grand

diamètre.

CC. Diamètre oblique qui va de la cavité cotyloïde gauche à la symphise facro-iliaque droite.

DD. Diamètre oblique qui va de la cavité cotyloïde droite à la symphise sacro-

iliaque gauche.

## FIGURE II.

Cette figure présente un bassin renversé, de manière qu'il offre à la vue tout le développement du détroit inférieur.

aa. La face externe des os des îles. bb. Les épines supérieures & anté-

rieures des os des îles.

ce. Les épines antérieures & inférieures de ces mêmes os.

dd. La face antérieure des os pubis.

ee. La symphise des 03 pubis.

f f. Les cavités cotyloïdes.

gg. Les trous ovalaires & les ligamens obturateurs.


hh. La tubérosité des os ischium.


i i i i. La face antérieure du facrum.

kkkk. Les trous facrés.

1. Le coccix.

mmmm. Les ligamens facro-ischiatiques; nnn. L'arcade des os pubis.







fur l'Art des Accouchemens. 35 Les lignes ponctuées indiquent les diamètres du détroit inférieur.

AA. Diamètre qui va de la fymphise du pubis à la pointe du coccix,

ou le grand diamètre.

BB. Diamètre transversal, ou petit diamètre, qui va de la tubérosité de l'un des os ischium à celle de l'autre.

#### SECTION VII.

Des vices de conformation du bassin.

D. QUE doit-on entendre par vices de con-

formation du bassin?

R. On doit appeller ainsi les divers états dans lesquels la figure & les dimensions du bassin s'éloignent assez de la description que nous venons d'en faire, pour que le mécanisme de l'accouchement en soit dérangé, ou que la semme en éprouve quelques accidens.

Ces défauts de conformation peuvent fe rapporter à la trop grande capacité du bassin; & à sa trop petite largeur, qu'on

exprime par le mot étroitesse.

Le bassin est trop grand lorsque ses dimensions surpassent de beaucoup celles qu'il a communément; & il est resserré lorsqu'il n'a pas le développement néces-

B vj

Principes

faire au libre passage d'un enfant de vol

D. Quelles peuvent être les suites de la trop

grande capacité du bassin?

R. Si les femmes dont le bassin est aussilarge, paroissent devoir accoucher plus facilement que les autres, en ce que l'enfant doit éprouver moins de frottemens en le traversant, l'expérience prouve qu'eiles paient souvent, par de longues incom-

modités, ce foible avantage.

Celles dont le bassin est trop large sont plus sujettes à la descente de matrice que les autres, sur-tout après quelques grosfesses; & il est plus difficile de contenir certe descente. Les derniers temps, & souvent le commencement de la grossesse, font accompagnés de pefanteurs vers le fondement, & de douleurs vers les lombes, zinfi que dans les aînes. La grossesse ne met pas toujours ces femmes à l'abri de la descente de matrice, cet accident pouvant avoir lieu pendant le travail même de l'accouchement. La matrice, chez les femmes dont le bassin est très-large, peut prendre une plus grande obliquité que chez les autres, & cette obliquité apporte de nouveaux obstacles à l'enfantement, &c. Ajoutez à tous ces accidens ceux qui suivent souvent un accouchement trop précipité.

D. Quels sont les effets de l'étroitesse du

bassin ?

Sur l'Art des Accouchemens. 37

R. Ces effets sont en général bien plus fâcheux que ceux qui naissent de l'excès d'amplitude; puisque ce vice de conformation rend constamment l'accouchement difficile, & aussi long que pénible pour la mère & pour l'ensant, & qu'il peut le rendre même impossible par la voie naturelle.

Pour expoter ces effets avec clarté, il faut établir préalablement les principaux

degrés de l'étroitesse du bassin.

D. Indiquez nous donc de quelle manière; & à quel degré le bassin peut être resserré. R. Le bassin peut être resserré dans

R. Le bassin peut être resserré dans toutes ses parties en même temps, dans une seule, ou bien dans plusieurs. On remarque quelquesois que ce désaut de conformation n'affecte que le grand bassin, & ne consiste que dans le peu d'écartement que laissent en devant les os des îles; mais alors il a peu d'insluence sur la grossesse en vice n'affecte que le petit bassin; & c'est dans ce cas qu'il mérite toute notre attention.

Le détroit supérieur, le plus souvent, est celui qui te trouve trop resserré pour l'accouchement; & presque toujours on remarque que c'est dans la direction du pubis au facrum. Rarement ce détroit est trop petit transversalement.

Le détroit inférieur peut être également resserré; mais ce vice ne consiste fréquency ment que dans le trop grand rapproche-ment des tubérosités ischiatiques; ce qui rend en même temps l'arcade du pubis

beaucoup plus étroite.

On observe assez souvent qu'il n'y a qu'un des détroits qui soit resserré, pendant que l'autre a toute sa largeur naturelle, & quelquefois plus. Il est aussi des bassins dont les deux détroits sont affectés du même vice de conformation; tantôt dans les mêmes directions, & tantôt en fens contraire, mais rarement au même degré.

L'étroitesse du bassin, & sur-tout celle du détroit supérieur, présente des nuances infinies. Quelquefois ce défaut de conformation est léger, & ne diminue le diamètre qui va du pubis au haut du facrum que de quelques lignes; d'autres tois il est plus grand, & ne laisse à ce diamètre que trois pouces un quart, trois pouces, trois pouces moins un quart, deux pouces & demi, & même beaucoup moins. Il y a des bassins sur lesquels le pubis n'est éloigné de la faillie que forme la base du sacrum que de deux pouces, & même d'un feul.

Ces degrés d'étroitesse influent diverfement sur l'accouchement; & ce vice en général est plus à redouter de la part du détroit supérieur, que du détroit inférieur.

D. Quels sont donc les inconveniens qui penyent résulter de ce vice de conformation

sur l'Art des Accouchemens. 39

R. Il influera d'autant plus fortement fur le mécamme de l'accouchement, qu'il fera plus confidérable, ou que le bassin conservera moins de largeur. Si ce vice de conformation ne diminue le diamètre du détroit qui en est affecté que de quelques lignes, l'accouchement en deviendra seulement plus long, & plus douloureux pour la semme. Il sera plus dissicile & plus pénible, si ce diamètre ne conserve que trois pouces un quart d'étendue, & il le sera extrêmement, lorsque ce diamètre n'aura que trois pouces (a).

Il y a peu d'exemples que l'accouchement se soit opéré naturellement chez des femmes dont le bassin ne présentoit que trois pouces moins un quart, ou deux pouces & demi de petit diamètre; & ces exemples ne doivent être regardés que comme des exceptions excessivement rares à la règle générale. Dans tous ces cas d'exceptions, la tête de l'enfant étoit plus petite, ou beaucoup plus molle qu'elle ne l'est ordinairement; ce qui lui a permis de changer de forme, & de s'accommoder à celle du détroit resserré.

<sup>(</sup>a) On suppose ici que l'enfant est à terme & d'une grosseur ordinaire; que sa tête est solide comme à ce terme. & qu'elle a trois pouces & demi d'épaisseur d'un côté à l'autre, sur quatre pouces au moins de longueur.

Les degrés de resserrement qui ne laissent qu'au-dessous de deux pouces & demis de diamètre, rendent constamment l'accouchement impossible, fans les secours extrêmes de l'art.

D. Les difficultés de l'accouchement peuventelles influer, dans tous les cas, sur la vie

de la mère & sur celle de l'enfant?

R. Oui : on ne voit que trop souvent alors l'un & l'autre expolés à de fâcheux accidens; la compression qu'éprouvent les parties molles qui garnissent l'intérieur du bassin étant proportionnée à celle de la tête de l'enfant poussée avec force dans ce canal. Tandis que cette tête s'affaisse dans un sens quelconque, se déprime, & quelquefois se fracture, les vaisseaux du cerveau s'engorgent, se dilatent & se déchirent; ce qui donne lieu à des épanchemens mortels. Les parties de la femme, pressées par cette tête contre les os du bassin, s'engorgent de même, s'enflam-ment, & souvent après s'ulcèrent. Les urines retenues ne peuvent s'évacuer, & le fang, ne pouvant traverfer librement les vaisseaux iliaques, reflue vers les parties supérieures; ce qui produit de nouveaux accidens.

D. D'où proviennent toutes ces défectuo-

sites du bassin?

R. Elles proviennent toutes de la mauvaise conformation des os qui constituent

fur l'Art des Accouchemens. 41 cette cavité, & du vice de leurs articulations. L'étroitesse de toutes les parties du bassin ne peut dépendre que du vice de tous les os, plus petits ou plus irrégu-liers que de coutume. La mauvaise con-formation du sacrum, & sa position contre nature, peuvent influer fur toutes les parties du bassin, ou sur un des détroits exclusivement.

Lorsque le sacrum est très-recourbé; sa base & sa pointe, pour l'ordinaire, se trouvent plus rapprochées du pubis; ce qui rétrecit les détroits. Comme le facrum alors a moins de longueur que dans l'état naturel, le bassin en perd de sa prosondeur en arrière.

La connexion du facrum avec les os des îles est quelquefois dispotée de manière que sa base se rapproche beaucoup des os pubis, & que sa pointe s'en trouve très-éloignée; ce qui augmente le détroit inférieur, & rétrecit le supérieur. D'autres fois l'articulation du sacrum est telle que sa base se porte en arrière, & sa pointe en devant ; de sorte que le détroit supérieur en devient plus large, & le détroit inférieur plus petit.

Chez quelques femmes, l'irrégularité & l'étroitesse du bassin paroît dépendre uniquement de la direction & de la fituation des os pubis, qui femblent enfoncés vers le dedans de cette cavité, au lieu de décrire en

dehors la convexité, ou portion de cercle

dont nous avons parlé ailleurs.

Ajoutez à tous ces vices de conformation & de position, la longueur & la déviation des épines ischiatiques en certains cas; la soudure intime du coccix avec le sacrum, & des trois pièces de cette appendice entre elles; les exostoses qui peuvent s'élever à la surface interne du bassin, & vous aurez l'ensemble de tout ce qui peut rétrecir cette cavité.

D. Quelles sont les causes qui peuvent produire ces vices de conformation?

R. Le rachitis, cette maladie connue fous le nom de noueure, en ramollissant les os, les dispose à prendre une forme irrégulière, selon la manière dont ils seront tiraillés par les muscles qui s'y attachent; pressés par le poids du corps abandonné à lui-même, ou par les bras de la nourrice.

D. Quels sont les moyens de s'assurer se

le bassin est bien ou mal conformé?

R. On peut distinguer ces deux états opposés au moyen du toucher, de manière à apprécier les principales nuances des difformités dont nous avons parlé. Mais avant d'entrer dans ces détails, il convient de dire deux mots des parties molles qui ont rapport au bassin, tant intérieurement: qu'extérieurement.

## EXPLICATION

# DE LA PLANCHE III.

#### FIGURE I.

Cette figure représente un bassin, dont le détroit supérieur est resserré du pubis au Sacrum, de manière à ne laisser d'autres ressources pour l'accouchement que l'opération césarienne.

aa. Les os ilium.

bb. Les os pubis.

cc. Les os ischium.

ddd. Les trois dernières vertèbres des lombes.

cee. La base du sacrum.

ff. Les cavites cotyloïdes

gg. Les trous ovalaires.

h. L'arcade des os pubis. i. La symphise du pubis.

kk. Les symphises sacro-iliaques. AA. Diamètre qui va du pubis au sacrum: fa longueur n'est que d'un pouce deux lignes.

BB. Diamètre transversal : sa longueur est de quatre pouces dix lignes.

CC. Distance de la saillie du sacrum à la

Principes
cavité cotyloïde gauche: un pouce
& une ligne.

DD. Distance de la saillie du sacrum à la cavité cotyloïde droite : un pouce

h iit lignes.

Le détroit inférieur sur ce bassin est très-

## FIGURE II.

Cette figure représente un bassin d'une sorme encore plus irrégulière que celle du précédent, & le détroit inférieur en étoit également désectueux.

Nota. Nous n'indiquerons que les dimensions du détroit supérieur.

AA. Diamètre qui va du pubis à la faillie du facrum ; deux pouces deux lignes.

BB. Diamètre transversal; trois pouces

huit lignes.

CC. Distance de la faillie du facrum au fond de la cavité cotyloïde gauche : fix à fept lignes.

DD. De la faillie du facrum au fond de la cavité cotyloïde droite, un pouce

deux lignes.

EE. Diamètre transversal, mesuré du sond d'une cavité cotyloïde à l'autre, à égale distance du sacrum & de la symphise du pubis, un pouce huit: lignes.

{a



#### SECTION VIII.

Des parties molles qui ont rapport au bassin.

D. QUELLES sont les parties molles qui se trouvent dans le bassin?

R. Le bassin n'ayant d'autres bornes que celles de la cavité abdominale même, & quelques-unes des parties contenues dans celle-ci pouvant descendre jusques dans la première, nous pourrions faire mention de tous les viscères abdominaux, sans que cette digression tût étrangère à notre objet; mais nous nous bornerons à celles

du bassin proprement dit.

On trouve de chaque côté, sur la face interne de l'ilium, un muscle appellé iliaque, & au-dessous de celui-ci un autre, qu'on nomme psoas. Ces deux muscles réunis à leur partie inférieure passent au-dessus de la cavité cotyloïde pour aller se terminer à l'os de la cuisse. On rencontre quelquefois un troisième muscle assez mince, qu'on appelle petit psoas : il est placé à côté du second, & vient s'insérer à l'extrémité du pubis, derrière la cavité cotyloïde. Des cordons de nerfs semblent sortir de l'épaisseur des muscles psoas, & descendent le long de ces muscles, jusqu'à leur fortie du bassin, pour se distribuer à la partie antérieure des cuisses : ce sont les ners cruraux.

On remarque au-devant des vertèbres: lombaires deux gros vaisseaux placés l'un à côté de l'autre. Celui qui est sur la gauche est l'aorte inférieure, & l'autre la veine-cave. Ces vaisseaux se divisent chacun en deux branches, qu'on appelle iliaques; & celles-ci bientôt en deux autres, dont l'une s'ensonce dans le bassin, pour se distribuer aux parties qu'il renserme, tandis que l'autre s'avance le long du muscle psoas, jusqu'à la cuisse, où elle prend le nom de crurale, & va se répandre dans toute l'extrémité inférieure.

Il y a donc, contre l'un & l'autre psoas;

une grosse artère & une grosse veine.

On trouve dans le petit bassin, 1°. vers le sacrum, l'intestin rectum; derrière cet intestin de gros ners qui viennent du canal sacré, & dont la plupart se réunissent de chaque côté en un seul, pour aller à la cuisse; dans ce même lieu d'autres ners & beaucoup de vaisseaux, dont quelques-uns se nomment hémorthoïdaux. 2°. Derrière & au-dessus des os pubis on découvre la vessie & le canal de l'urètre. 3°. Entre la vessie & l'intestin rectum sont la matrice & ses ligamens, les trompes de Fallope, les ovaires & le vagin. 4°. On

fur l'Art des Accouchemens. 47 remarque encore d'autres muscles dans le bassin, tels que les releveurs de l'anus, les obturateurs internes, &c.

D. Quelles sont les parties molles qui ont quelque rapport au bassin extérieurement?

R. Un grand nombre de muscles s'attachent aux parois de cette cavité, & la recouvrent de toutes parts. De ces muscles, dix appartiennent au bas-ventre, & en forment comme l'enceinte antérieurement. Huit descendent du bord insérieur & des côtes de la poitrine à la crête des os des îles & à l'angle des os pubis. Des autres muscles, les uns appartiennent aux bras, aux lombes & au dos; les autres aux cuisses & aux jambes....

D. En quoi la connoissance du rapport de toutes ces parties avec le bassin, tant intérieurement qu'extérieurement, peut-elle être

utile à l'Accoucheur?

R. La connoissance des parties qui sont à l'extérieur du bassin est moins nécessaire que celle des parties intérieures; néanmoins elle ne peut être que fort utile. La connoissance du rapport des muscles abdominaux avec la poitrine & le bassin, par exemple, sert à expliquer l'influence de leur action dans l'accouchement; celle du rapport des autres muscles avec le bassin, à déterminer la meilleure attitude qu'on peut donner à la semme, soit re-

Principes

lativement à l'accouchement, soit en d'au-

Parmi les parties intérieures, il en est qui diminuent la capacité du bassin, & qui sont exposées à un degré de compression, tantôt plus fort & tantôt plus foible, soit durant la grossesse, soit pendant l'accouchement; d'autres éprouvent une espèce de resoulement & de déplacement plus ou moins grand, selon le vo-lume & la pesanteur de la matrice distendue par le produit de la conception. C'est à tous ces changemens qu'on doit attribuer un grand nombre des phénomènes que présentent la grossesse & l'accouchement. La constipation, la rétention, ou la difficulté de rendre les urines, l'infiltration des cuisses & des jambes, la foiblesse de ces extrémités, les crampes, les tremblemens, les engourdissemens qu'elles éprouvent, soit vers la fin de la grossesse, soit dans le cours du travail de l'accouchement, & une infinité d'autres effets sont dus à la compression de l'intestin rectum, à celle du col de la vessie, des vaisseaux iliaques, des nerss cruraux & Tacrés, &c.



#### SECTION IX.

De la manière d'examiner le bassin pour reconnoître s'il est bien ou mal conformé.

D. DANS quels cas est-il nécessaire de s'assurer si le bassin est bien ou mal conformé?

R. Ces recherches devroient être le principal objet de l'Accoucheur, dès qu'il a reconnu que la femme éprouve les douleurs de l'accouchement, & sur-tout lorsqu'elle n'a point encore eu d'enfant ; puisque la facilité de cette opération dépend en général de la bonne conformation du bassin, & que rien ne peut la rendre plus difficile que la mauvaise conformation de cette cavité. Ces recherches importantes, quand la semme a été nouée dans son bas âge, & qu'elle en conferve des marques extérienres, font bien plus importantes encore, quand elle éprouve dépuis quelque temps les douleurs de l'accouchement, & que malgré ses efforts', l'enfant, quoique bien placé, ne peut s'engager.

Les parens qui craignent d'exposer la vie de leur fille, lorsqu'elle à quelques difformités apparentes, consultent quelquesois sur son état ayant de la marier, & s'en rap-

portent au jugement des personnes de l'art; tantôt d'une Sage-Femme, & tantôt d'uni Accoucheur. Comme la destinée de la jeune personne qu'on soumet à l'examen que nous allons décrire, dépend de notre décifion, on voit de quelle importance est cet examen, & les lumières qu'il exige de la part de celui qui le fait.

D. Comment doit-on proceder à l'examen

du bassin, & quels sont les signes qui nous feront distinguer celui qui est bien conformé d'avec celui qui est désectueux?

R. On peut procéder à cet examen de dissérentes manières, & aucune ne doit être négligée; car le résultat qu'on obtient de l'une ne fait qu'ajouter à la certitude du réfultat des autres. Nous observerons: cependant que ces divers procédés ne peuvent être mis en pratique dans toutes les: circonstances possibles; quelques - unes; de ces circonstances exigeant qu'on s'ent tienne à un feul.

Quand on a beaucoup d'usage dans l'art: du toucher, & qu'on a souvent remarqué par l'application des mains à l'extérieurs d i bassin, l'ensemble des signes qui caractérisent sa bonne conformation, il est aisés de distinguer celui qui est bien disposé d'avec celui qui est désectueux.

Pour acquérir l'habitude nécessaire à cet

effet, on peut s'exercer dans le cours de

sur l'Art des Accouchemens. 31 l'accouchement ordinaire, qui offre des occasions fréquentes, à bien juger de l'élévation, de la rondeur, de la largeur, de l'égalité des hanches, & de l'écartement qu'elles présentent en devant, ainsi que de la forme du facrum & des os pubis extérieurement.

Quand les hanches sont ouvertes en devant de l'étendue de huit à neuf pouces; quand elles présentent la même largeur, la même élévation & la même rondeur; si la région du pubis est faillante, & la partie postérieure & supérieure du facrum peu déprimée, le bassin est bien conformé dans son entrée. On en sera plus certain encore, si l'épaisseur de la semme, prise au moyen d'un compas d'épaisseur, depuis le milieu du mont de Vénus jusqu'à la partie postérieure & supérieure du facrum, est audessus de sept pouces.

On juge presque avec la même facilité de la distance de la pointe au coccix à la symphise du pubis, & de l'écartement des tubérosités ischiatiques, en touchant extérieurement, quand les cuisses & les

jambes de la femme sont ployées.

L'irrégularité des hanches, l'applatissement du pubis, la grande convexité du facrum extérieurement, & la dépression profonde de sa partie supérieure, dénotent une mauvaise conformation; & sur-tout

Cij

72 Principes celle du détroit supérieur. Il reste à déterminer alors de combien ce détroit est resserré.

Ces premières recherches se font en passant les mains sous les habits de la femme, soit en les appliquant immédiatement sur le corps, soit pardessus la chemise.

D. Comment peut-on apprécier le degré d'ouverture du détroit supérieur, qu'on soup-

conne déjà resserré?

R. Le plus simple & le plus sûr de tous les procédés est de prendre l'épaisfeur du bassin, depuis le milieu du mont! de Vénus, vis-à-vis le haut de la symphise du pubis, jusqu'à la partie postérieure: & supérieure du facrum, environ quatre: pouces au - dessus du coccix, comme oni l'a déjà annoncé; & de déduire trois pouces; pour l'épaisseur de la base du sacrum &: celle des os pubis antérieurement, y compris même les graisses & les tégumens, si la femme est maigre. Cette déduction de troiss pouces sur l'épaisseur de la femme entre les deux points assignés sussit encore, si l'embonpoint est médiocre, & même audessus de ce terme; parce qu'alors on affaisse les graisses du mont de Vénus par une pression convenable.

Pour mesurer ainsi le bassin, on se servira d'un compas d'épaisseur, dont les

fur l'Art des Accouchemens. 53
pointes formeront des boutons lenticu-

laires (a).

Exemple: quand on trouve sept pouces d'épaisseur sur une semme maigre & d'une stature ord naire, on peut assurer que le diamètre qui se mesure-du pubis à la base du facrum est d'environ quatre pouces: l'erreur ne peut être, dans aucun cas, au-dessus de deux lignes.

On peut aussi mesurer ce diamètre au moyen d'une autre espèce de compas qui se développe en dedans du bassin; mais l'application de cet instrument est difficile douloureuse, & le résultat ne sauroit en être plus certain que celui du compas

d'épaisseur bien appliqué.

On peut encore déterminer la longueur de ce même diamètre avec le doigt index introduit dans le vagin. On en avance l'extrémité jusqu'à la faillie du facrum, près la jonction de cet os avec la dernière vertèbre lombaire; on relève alors le poignet, pour appuyer le bord radial de ce doigt contre le bord inférieur de la symphise du pubis, & l'on mesure la distance de ces deux points. L'étendue que parcourt ce doigt depuis la faillie du facrum jusqu'au bas de la symphise du pubis, est

<sup>(</sup>a) Nous en avons fait construire un sur lequel se trouve une échelle ponstuée de l'étendue de neuf pouces.

ordinairement de six lignes plus grande que le diamètre du détroit supérieur (a).

On ne peut mesurer de même, ni le diamètre transversal, ni les diamètres obliques du détroit supérieur; mais on se rappellera que c'est presque toujours celui qui va du pubis au facrum qui est vicié, & dont il importe le plus de connoître la longueur.

D. Comment peut-on apprécier l'étendue

des diamètres du détroit inférieur?

R. On peut mesurer la distance de la pointe du coccix au bord insérieur de la symphise du pubis avec assez d'exastitude, pour ne pas commettre de faute capitale: mais on ne doit pas s'attendre à une grande précision. Pour mesurer cette distance, on introduira le doigt indicateur dans le vagin jusqu'à la pointe du coccix; en le tenant d'ailleurs appuyé contre le bord insérieur de la symphise du pubis; & on verra, après l'avoir retiré, à quelle prosondeur on l'avoit porté. On peut en juger encore, au moyen de deux doigts appliqués extérieurement sur l'extrémité du coccix, & sous la commissure antérieure des grandes lèvres.

<sup>(</sup>a) Il ne peut encore se trouver qu'une ou deux lignes d'erreur dans le résultat de ce procédé, quand on a les connoissances requises pour le bien exécuters

Sur l'Ait des Accouchemens. 55

Pour apprécier, autant que cela se pent, l'écartement des tubérosités ischiatiques, ou le petit diamètre du détroit insérieur, on sera ployer les jambes & les cuisses de la semme, & on palpera extérieurement, au moyen de deux doigts de l'une ou l'autre main, jusqu'à ce qu'on sente distinctement les tubérosités dont il s'agit, à travers les parties molles dont elles sont recouvertes. Après les avoir bien reconnues, on observera quel est l'écartement des doigts qui les touchent ainsi. Cette estimation est difficile, & ne sauroit se faire plus sûrement en introduisant le doigt dans le vagin.

D. Comment peut-on juger des dimensions

de l'excavation du bassin?

R. On peut estimer sa prosondeur de devant en arrière, comme on mesure le diamètre de ses détroits; mais cette partie du bassin mérite peu d'attention, quand on est certain de la bonne ou mauvaise consormation du reste.

D. Les divers procédés que vous venez de décrire pour mesurer le bassin, peuvent-ils se

mettre en pratique dans tous les cas?

R. Non: on ne peut les mettre tous en pratique sur la même femme que dans le temps du travail de l'accouchement: hors ce temps, on ne peut, ou l'on ne doit pas se servir des espèces de compas qui se développent dans le bassin; parce qu'il

C 1A

pourroit en résulter des inconvéniers, indépendamment de la difficulté qu'on éprouveroit à les diriger convenablement, & des douleurs qui seroient inséparables de

leur usage.

On doit peut-être éviter avec le même foin l'intromission du doigt, quand la perfonne qu'on examine est encore dans l'état de virginité. On se bornera, dans ce cas, à l'application des mains sur l'extérieur du bassin, & à celle du compas d'épaisseur.

## ARTICLE II.

Des parties molles qui ont rapport à la génération, à la grossesse & à l'accous chement.

## SECTION PREMIÈRE.

Des parties externes.

D. Sous quel nom désigne-t-on les parties

externes qui servent à la génération?

R. On désigne ces parties sous le nom de honteuses, mais chacune d'elles est connue sous une dénomination particulière; telle que le mont de Vénus, les grandes lèvres, les petites lèvres ou les nymphes,

sur l'Art des Accouchemens. 57 le clitoris, le méat urinaire, l'orifice du vagin, l'hymen, les caroncules myrthiformes, la fourchette & la fosse naviculaire : nous y ajouterons le périnée, pour avoir occasion d'en dire un mot.

D. Qu'est-ce que le mont de Vénus?

R. On donne ce nom à cette élévation ou éminence qui se remarque au-devant des os pubis, & qui se recouvre de poils à l'âge de puberté.

Cette élévation est plus ou moins grande, selon que les os pubis sont plus arqués ou plus applatis, & que la semme a plus ou moins d'embonpoint.

D. Quelles sont les parties auxquelles on

donne le nom de grandes lèvres?

R. Ce sont deux replis de la peau qui femblent prendre naissance du bas du mont de Vénus, & se portent parallélement en arrière pour se réunir à un pouce ou environ au-devant de l'anus. Elles forment les bords d'une espèce de fente ou de

cavité appellée vulve.

Les grandes lèvres présentent deux faces, l'une externe, qui se couvre de quelques poils à l'âge de puberté, & ne diffère d'ailleurs en rien des tégumens ordinaires; l'autre interne, rougeâtre chez les jeunes filles, & plus pâle chez les femmes qui ont eu des enfans, est formée d'une peau très-mince, semblable à celle de l'intérieur des lèvres de la bouche.

La réunion des grandes levres, tant en devant qu'en arrière, se nomme commissure.

On trouve dans l'épaisseur de ces parties du tissu cellulaire, un peu de graisse,

des vaisseaux & des glandes.

D. Quelles sont les parties qu'on désigne sous le nom de petites lèvres, ou nymphes?

R. Ce font deux replis de la membrane interne des grandes lèvres, affez ressemblans aux crêtes qui pendent sous le gosier de certaines poules, tant par leur grandeur que par leur couleur. Elles sont d'un rouge plus vis chez les jeunes semmes que chez celles qui sont mariées depuis long-temps, & qui ont eu des ensans. Elles sont, comme les grandes lèvres, plus sermes chez les premières que chez les autres.

Les nymphes, le plus souvent au terme de la naissance, excèdent le bord des grandes lèvres; mais dans la suite on ne peut les découvrir, qu'en écartant celles-ci.

Elles sont plus rapprochées à leur extrémité supérieure qu'en bas, où elles pa-

roissent médiocrement écartées.

Elles contiennent dans leur épaisseur peu de tissu cellulaire, beaucoup de vaisfeaux, de filets de nerfs, & de petites glandes.

Elles sont d'une sensibilité plus exquise que les grandes lèvres. Leur usage est de

fur l'Art des Accouchemens. 59 diriger le cours des urines à leur fortie du canal de l'urètre, & de contribuer un peu à la dilatation de la vulve & de l'entrée du vagin lors de l'accouchement.

D. Qu'est-ce que le clitoris?

R. On donne ce nom à une espèce de caroncule d'un rouge pâle, qui se voit audessus des nymphes & au-dessous de la réunion antérieure des grandes lèvres. Cette espèce de verrue, ou de caroncule, enveloppée d'un repli de la membrane interne des grandes lèvres qu'on appelle prépuce, ne sorme que l'extrémité du clitoris. Le clitoris est un corps cylindrique un peu plus gros qu'une plume à écrire, & long de six à huit lignes. Il est formé de la réunion de deux autres corps également cylindriques, appellés corps caverneux. Ceux ci sont attachés au bord antérieur de la branche de l'un & l'autre os pubis, & se joignent au-devant du bord insérieur de la symphise de ces mêmes os.

Le clitoris n'a cependant pas la même longueur ni la même grosseur chez toutes les femmes. Quelquesois il égale le petit doigt, & d'autres sois il est de beaucoup plus long & plus gros. On a souvent pris les femmes chez qui se trouve cette conformation pour des hermaphrodites, c'estadire, pour des individus qui participoient

des deux fexes.

Le clitoris a deux muscles qui en embrassent les racines ou corps caverneux;

on les nomme muscles érecteurs.

Le clitoris est la plus sensible de toutes les parties extérieures de la génération. Il se gonsle & se roidit aux moindres attouchemens voluptueux.

D. Qu'est ce que le méat urinaire?

R. C'est une ouverture assez petite, quoiqu'un peu plus large que longue, située au dessus de l'entrée du vagin, & dans l'écartement que les petites lèvres laissent entre elles. Cette ouverture, destinée à la sortie des urines, est la fin d'un canal appellé urètre, qui aboutit au col de la vessie. Ce canal, long d'un pouce ou environ, passe obliquement sous la symphise du pubis dans l'état naturel, & monte quelquesois le long de cette symphise dans les derniers temps de la grossesse, parce que la vessie se trouve souvent alors au-dessus des os pubis.

Les Sages - Femmes , quelquefois dans l'obligation de fonder , ne doivent pas perdre de vue ce que nous venons de dire fur la fituation du méat urinaire & la di-

rection du canal de l'urêtre.

D. Qu'est-ce que l'orifice du vagin?

R. C'est une ouverture située au-dessous du méat urinaire, & au-devant de la réunion postérieure des grandes lèvres, qu'il faut écarter si on veut la découvrir

D. Qu'est-ce que l'hymen?

R. C'est le repli membraneux, de forme demi - circulaire, dont nous venons de parler, placé au-devant & au bas de l'orifice du vagin, qu'il rétrecit plus ou moins.

Cette membrane forme quelquetois un cercle entier, au lieu d'un croissant, &z présente alors, dans son milieu, une ouverture pour le passage du sang menstruel. D'autres tois elle recouvre complétement l'entrée du vagin, & ne laisse aucune issue au sang dont il s'agit; la semme est alors impertorée, & elle peut ignorer cette conformation jusqu'à l'âge de puberté: mais à cette époque il se développe des accidens qui ont sait plus d'une sois suspecter de grossesse, la semme la moins disposée à devenir grosse. On ne peut remédier alors à ces accidens qu'en incisant l'hymen, &z en donnant issue au sang retenu dans le vagin & dans la matrice.

Ce n'est pas toujours l'hymen qui met obstacle à l'évacuation du sang des règies,

on a plus d'une fois trouvé des cloisons membraneuses dans le vagin, qui produi-foient les mêmes effets; d'autres fois une membrane qui voiloit & bouchoit l'orifice de la matrice.

L'existence de l'hymen passe généralement pour le signe physique de la virginité; mais il n'en offre pas une preuve plus certaine, que les débris de cette membrane n'indiquent l'état contraire. L'hymen peut exister, quoique la semme ait soussert les approches d'un homme, même quoiqu'elle soit enceinte; & cette membrane a pu être détruite par des causes qui ne donnent aucune atteinte à cette vertu morale, connue sous le nom de virginité.

D. Quelles sont les parties qu'on appelle

caroncules myrthiformes?

R. Ces caroncules sont des espèces de crêtes ou appendices très-petites, qui se remarquent au bord inférieur de l'orifice du vagin, & qu'on regarde comme autant de lambeaux de la membrane hymen déchirée dans l'acte vénérien. Ces caroncules sont au nombre de trois pour l'ordinaire.

D. A quelle partie donne-c-on le nom de

frein, ou de fourchette?

R. On donne ce nom à un repli semilunaire de la membrane interne des grandes. lèvres, situé au bas de l'orifice du vagin, au devant & un peu au-dessous de l'hymen. fur l'Art des Accouchemens. 63.

Ce repli se déchire presque toujours lors du premier accouchement, malgré les soins qu'on apporte à le conserver; mais cette déchirure n'a rien de désagréable, quand elle ne se prolonge pas fort au loin sur le périnée.

D. Qu'est-ce que la fosse naviculaire?

R. C'est un enfoncement en forme de petite nacelle située transversalement dervière le frein ou la fourchette, & audevant de l'hymen. Cette fosse ne peut être telle, qu'autant que le frein est entier.

D. Que désigne-t-on sous le nom de périnée ?

R. Le périnée est l'espace qui s'étend depuis le bas de la vulve jusqu'à l'anus. Sa longueur est de quatorze à quinze lignes, même plus. Cette espèce de pont est formé par la paroi postérieure & inférieure du vagin, par des muscles très.

minces, & la peau.

Le périnée s'élargit beaucoup dans tous les sens, quand la tête de l'enfant sait effort pour sortir; & trop souvent, il se déchire à l'instant où elle traverse la vulve. Presque toujours cette déchirure se borne au milieu de sa longueur, & quelquesois elle s'étend jusqu'à l'anus, de sorte que cette ouverture & la vulve ne paroissent en sormer qu'une. C'est cette grande déchirure que l'Accoucheur doit s'estorcer de

prévenir, parce que les suites en sont als moins très-désagréables pour la semme, si elles ne deviennent sâcheuses.

#### SECTION II.

Des parties molles internes.

D. QUELLES sont les parties internes de la génération?

R. Ce sont la matrice & ses ligamens,

les trompes, les ovaires & le vagin.

D. Qu'est-ce que la matrice?

R. La matrice est un viscère creux, charnu, membraneux & vasculeux. Elle est située dans le petit bassin, entre la vessie & l'intestin rectum, de manière que son sond est en haut & son orifice en bas.

D. Quelle est la forme naturelle de la matrice, quel en est le volume, & que doit-

on y considérer extérieurement?

R. La forme naturelle de la matrice est assez semblable à celle d'une poire un pen applatie selon son épaisseur, & plus longue que large.

Son volume est tel, qu'elle a deux pouces & demi au moins de longueur, dix-huit: à vingt lignes dans sa plus grande largeur,

& huit à dix lignes d'épaisseur.

On divise la matrice en sond, en corps. & en col. Le sond en est la partie supé-

fur l'Art des Accouchemens. 65 rieure, le corps la partie moyenne & le col la partie inférieure. Ce dernier forme dans le vagin, une faillie longue de plusieurs lignes, & présente une ouverture que nous décrirons ci-après.

On considère à la matrice extérieurement, 1°. deux faces légérement arrondies, dont l'une regarde la vessie, & l'autre l'intestin restum; la première est la face antérieure, & l'autre la tace postérieure; 2°. trois bords, savoir un supérieur qui est le fond de la matrice, & deux latéraux qui forment les côtés de ce viscère; 3°. trois angles, dont deux supérieurs, desquels paroissent sortir les trompes de Fallope, & un troisième qui termine le col insérieurement, c'est le museau de tanche.

D. Quelle est la grandeur respective de fond, du corps & du col de la matrice?

R. Le fond est la plus petite de ces trois parties de la matrice dans l'état naturel; il comprend seulement ce qui se trouve au-dessus de l'insertion des trompes de Fallope. Le corps en est la partie la plus considérable; c'est celle qui offre le plus de longueur, le plus de largeur & le plus d'épaisseur. Le col en est la partie la plus étroite; la moitié de sa longueur se remarque dans le sond du vagin, & y forme cette saillie que nous avons annoncéée sous le nom de muséau de tanche.

D. Pourquoi a-t-on désigné cette partie du col de la matrice sous le nom de museau de tanche?

On l'a nommée ainsi par rapport à la ressemblance qu'on a cru lui trouver avec le museau d'un poisson appellé tanche.

Cette partie du col de la matrice chez les femmes qui n'ont point eu d'enfans, & qui font dans l'état le plus naturel à cet égard, forme une espèce de mammelon de la longueur de quatre à six lignes, un peu applati de devant en arrière, & à l'extrémité duquel se remarque une ouverture transversale, longue de plusieurs lignes & si étroite qu'on a peine à la distinguer en touchant du bout du doigt. Cette ouverture est l'orisice externe de la matrice; sa lèvre antérieure est un peu plus épaisse & plus alongée que sa lèvre postérieure.

D. La forme du muscau de tanche & de son orifice est-elle la même chez toutes les

femmes?

R. Elle est constamment la même chez toutes celles qui n'ont pas eu d'ensans, qui ne se sont pas livrées avec excès à l'acte vénérien, & qui n'ont eu aucune maladie dans cette partie; mais on ne voit que trop souvent la forme du museau de tauche altérée par l'une de ces causes. Chez les semmes qui ont eu plusieurs enfans, même un seul, le museau de tanche

paroît plus gros, plus arrondi & plus court; fon orifice est plus large, plus irrégulier, & presque toujours comme découpé & échancré dans son bord, mais tantôt d'un côté, & tantôt de l'autre. Ces changemens ne sont pas exclusivement la suite de l'accouchement; & le Praticien qui assureroit qu'ils ne peuvent dépendre que de cette cause, s'exposeroit à compromettre la réputation, & même la vie de certaines semmes (a).

D. Quelle est la structure ou la composicion

de la matrice?

R. La matrice est d'une structure difficile à déterminer hors le temps de grossesse. On ne peut alors juger ni de la nature de ses sibres, ni de leur arrangement, ni de leur entrelacement. On remarque seulement qu'elles sont plus molles, plus rougeâtres & moins serrées dans le corps de ce viscère, que dans son col, où elles sont plus denses & plus pâles.

<sup>(</sup>a) L'Accoucheur chargé, quelquefois juridiquement, d'examiner une femme accusée d'infanticide ou de suppression de pârt, & de déterminer si elle est véritablement accouchée ou non, s'exposeroit à faire un faux jugement, & à compromettre la vie de l'accusée, s'il ne prononçoit affirmativement que d'après les altérations du col de la matrice, exclusivement à tous les autres signes.

Dans le cours de la grossesse, toutes ces sibres se développent, deviennent plus longues, plus épaisses, plus souples, & prennent par-tout le caractère de la sibre charnue. Elles paroissent former alors différentes lames étroitement appliquées les unes sur les autres, & liées entre elles par des sibres de traverses, de manière qu'il est impossible de les séparer sans couper ou déchirer beaucoup de ces sibres.

Les fibres de ces diverses lames ne suivent pas la même direction. Les plus extérieures semblent descendre du milieu du fond de la matrice au bord de son orifice, & celles des plans intérieurs croisent

ces premières en divers sens.

Dans l'épaisseur de ce tissu se trouve un grand nombre de vaisseaux de toutes espèces, & des petites glandes qui filtrent une partie de l'humeur dont la cavité de

la matrice est toujours enduite.

Les vaisseaux sanguins viennent de plusieurs sources. Les artères sont produites,

1°. par les spermatiques qui naissent de
l'aorte inférieure; 2°. par les honteuses
communes qui viennent des iliaques internes ou hypogastriques. Les veines qui
accompagnent ces artères vont se rendre
dans la veine-cave inférieure par des troncs
connus sous les mêmes noms que ces artères.
Tous ces vaisseaux, dans l'état habituel,
suivent un cours très-tortueux, & paroissent

fur l'Art des Accouchemens. 69 repliés sur eux-mêmes de mille manières différentes. Mais ils se développent dans la grossesse, & ne décrivent à la sin de celleci que des courbures très-alongées.

On trouve une autre espèce de vaisseaux sanguins dans la substance de la
matrice, qu'on nomme sinus utérins. Des
artères très-déliées viennent s'y terminer,
& des veines assez grosses paroissent en
prendre naissance. Ces sinus s'ouvrent dans
la cavité même de la matrice, par autant
d'orifices assez remarquables, dans le temps
des règles sur-tout; & plus remarquables
encore après l'accouchement, car on en
trouve alors de très-larges à l'endroit où
étoit attaché le placenta.

Les vaisseaux lymphatiques de la matrice ne sont pas moins nombreux que les vaisseaux sanguins; mais les ners, beaucoup plus petits, n'y paroissent pas distribués avec autant de prosusion. Ces ners viennent des spermatiques, des plexus

facrés & hypogastriques.

La matrice est recouverte extérieurement par le péritoine (a), qui forme ses principaux ligamens, & qui lui est intimément adhérent, excepté sur les côtés & au-dessous des trompes. La cavité de la matrice est tapissée d'une autre membrane

<sup>(</sup>a) Le péritoine est une membrane qui tapisse toute la cavité du ventre.

beaucoup plus mince, & percée de nombre de trous.

D. Indiquez-nous quelle est l'épaisseur des

parois de la matrice.

R. Cette épaisseur est d'environ quatre lignes vers le milieu du corps de la matrice, & un peu moindre dans les autres parties.

D. Quelle est la forme & l'étendue de la cavité de la matrice, & qu'y trouve-t-on de

remarquable?

R. La cavité de la matrice peut être divisée en deux parties; 1°. en celle qui appartient au corps de ce viscère; 2°. en celle qui appartient au col. La première a une figure triangulaire, & la seconde est à-peu-près ovalaire. L'accouchement, pour l'ordinaire, altère la forme naturelle de la cavité du col de la matrice; & chez la plupart des semmes qui ont eu des enfans, elle ressemble à un entonnoir, dont la pointe seroit en haut & le pavillon vers le vagin.

L'étendue de la cavité du corps de la matrice est telle, qu'elle contiendroit dissicilement une grosse sêve de marais. On y remarque supérieurement, de chaque côté, une ouverture très-étroite qui sorme l'entrée de la trompe; & une troisième en bas, & un peu plus large, qu'on appelle orifice interne de la matrice. On y trouve d'ailleurs un grand nombre d'autres ouvertures beaucoup plus petites, répandues par-tout, & dont les plus remarquables appartien-

nent au finus dont nous avons parlé.
Indépendamment de pareilles ouvertures, on remarque dans la cavité du col, des rugosités ou replis formés par le tissu même de la matrice & la membrane qui

la recouvre intérieurement (a).

l'ovaire.

D. Quels sont les ligamens de la matrice?

R. Ces ligamens font au nombre de quatre principaux; favoir, deux qu'on appelle ligamens larges, & deux autres connus fous le nom de ligamens ronds.

Les ligamens larges sont des replis du péritoine qui s'étendent de la matrice aux parties latérales du bassin, & qui forment eux-mêmes supérieurement deux autres replis placés l'un au-devant de l'autre, qu'on appelle aîlerons: l'un de ces aîlerons enveloppe la trompe de Fallope, & l'autre

Les ligamens ronds naissent des parties supérieures & latérales de la matrice, audevant & un peu au-dessous de l'origine des trompes: ils descendent d'abord entre les deux lames des ligamens larges, & se recourbent ensuite en montant vers les

<sup>(</sup>a) La matrice, chez certaines femmes, s'est trouvée double; & chez d'autres sa cavité étoit divisée par une cloison longitudinale qui s'étendoit depuis le col de ce viscère jusqu'à son sond.

os pubis, pour fortir du ventre par les an-neaux inguinaux, & aller se perdre au pli des aînes, en se divisant en plusieurs branches, & sormant une espèce de patte d'oie.

Les ligamens ronds ne sont pas, comme les autres, de simples replis du péritoine, mais des espèces de cordons formés de fibres qui paroissent charnues, ainsi que de quelques vaisseaux sanguins & de quelques filets de nerfs. On remarque encore quatre replis du péritoine en forme de croissant, qui passent pour autant de ligamens de la matrice. Deux de ces replis semblent descendre des parties latérales & antérieures de la matrice vers la vessie, & les autres, de ses parties latérales & postérieures vers l'intestin rectum.

D. Faites-nous la description des trompes

de Fallope.

R. Les trompes de Fallope font deux conduits, un de chaque côté, qui s'élèvent des parties latérales & supérieures de la matrice, & qui se portent vers les côtés du bassin, où ils se terminent par une ouverture assez large, dont le bord est: découpé & comme frangé : cette ouver-ture se nomme le pavillon de la trompe,. & le bord trangé, le morceau du disble. Une des franges est attachée à l'ovaire,, & les autres sont flottantes. La longueur des trompes est de quatre à cinq travers

de doigts; leur direction est un peu tortueuse, & l'on observe qu'après s'être élargies graduellement en s'éloignant de la matrice, elles se rétrecissent un peu, pour se dilater de nouveau, & sormer le pavillon.

Les trompes sont d'un tissu fibreux de la même nature que celui de la matrice, & elles sont enveloppées dans l'aîleron

antérieur des ligamens larges.

D. Faites-nous la description des ovaires.

R. Les ovaires sont deux corps glanduleux, ou qui paroissent tels; du volume d'une grosse sêve de marais; placés dans l'aîleron postérieur des ligamens larges, à quelque distance de la matrice, à laquelle ils sont attachés par ce même aîleron.

Ces corps sont un peu bosselés extérieurement, & remplis intérieurement d'in nombre indéterminé de petites vessies pleines de liqueur, qu'on regarde comme autant d'œus, & dont la grosseur n'excède pas celle d'un grain de chenevi. Ces œus, vrais ou présumés tels, n'autendent que leur sécondation pour se détacher, & être portés dans la matrice au moyen, de l'une des trompes.

Selon quelques auteurs, les ovaires ne font que des organes destinés à séparer une liqueur semblable à celle que préparent les testicules de l'homme; mais ce

D

74 Principes

sentiment a peu de partisans aujourd'hui, tandis que celui des œuss est généralement admis.

D. Qu'est-ce que le vagin?

R. C'est un canal membraneux de la longueur de plusieurs pouces, qui s'étend depuis le milieu du col de la matrice, auquel il s'unit extérieurement, jusqu'au bas de la vulve. Le vagin paroît composé de deux membranes, dont l'interne trèsépaisse & trèsélastique, forme une infinité de replis qui rendent le dedans de ce canal inégal & comme raboteux. Ces replis se développent & s'essacent dans chaque accouchement; disparoissent même chez les semmes qui ont eu plusieurs ensans, de manière que le vagin en devient plus ample, & plus lisse intérieurement.

L'extrémité inférieure du vagin est entourée d'un plexus de vaisseaux assez remarquable; & de deux muscles en sorme de bandes, qui montent de la partie antérieure du sphincter de l'anus jusqu'au clitoris, auquel ils se terminent: on nomme ces muscles constricteurs du vagin. On trouve sous ces muscles, & dans l'épaisseur du plexus vasculaire qui vient d'être décrit, deux glandes, dont le canal excréteur, long de plusieurs lignes, va s'ouvrir sur les côtes de l'entrée du vagin.

La surface interne du vagin présente

fur l'Art des Accouchemens. 75 une infinité de peties ouvertures qui fournissent l'humeur muqueuse dont elle est enduite continuellement (a).

### EXPLICATION

## DE LA PLANCHE IV.

#### FIGURE I.

Cette Figure représente la matrice & ses ligamens; les trompes de Fallope, les ovaires & le vagin, dans l'état naturel.

aa. La matrice vue par sa partie posté-

b. Le fond de la matrice.

cc. Le corps de la matrice.

d. Le col de la matrice.

e. Le museau de tanche.

f. L'orifice externe de la matrice, ou du museau de tanche.

gggg. Les ligamens larges.

hhhh. Les aîlerons des ligamens larges.

ii. Les ligamens ronds de la matrice

<sup>(</sup>a) Indépendamment de ce que l'hymen peut fermer l'entrée du vagin, on a vu quelquesois de pareilles cloisons membraneuses dans la longueur de ce canal. Il s'est aussi rencontré des femmes chez lesquelles le vagin se terminoit dans le restum, au lieu de s'ouvrir à l'extérieur.

76 Principes

KK. Les pattes d'oie formées par les ligamens ronds lorsqu'après leur sortie du bas-ventre, ils se terminent au pli des aînes.

LL. Les trompes de Fallope.

MM. Le pavillon des trompes & leur bord frangé.

NN. La frange du pavillon qui est attachée à l'ovaire.

OO. Les ovaires.

PP. Le vagin, ouvert felon sa longueur, dans sa partie postérieure.

aqqq. Les replis ou rugosités formés par la membrane interne du vagin.

#### FIGURE II.

Cette Figure représente la matrice ouverte dans s sa partie antérieure, pour en faire voir la s cavité.

A. La cavité du corps de la matrice.


B. La cavité du col de la matrice.


C. L'orifice interne de la matrice.

D. L'orifice externe.

EE. L'orifice des trompes de Fallope.

CARD





#### SECTION III.

De la matrice considérée dans l'état de grossesse.

D. Q U E L S sont les changemens que la matrice éprouve dans le temps de la grossesse ?

R. Les changemens que la matrice éprouve dans les premiers jours de la grossesse ne peuvent être appréciés; mais après ce temps, le toucher nous fait assez bien connoître ceux qui s'opèrent, tant dans la forme que dans le volume de ce viscère. Nous observons que le corps de la matrice se développe & s'arrondit, de manière que le fond s'élève graduellement jusqu'au-dessus de l'ombilic dans les six premiers mois; & continue de le faire lans le septième & le huitième, au point que vers la fin de ce dernier il touche resque au cartilage xiphoïde. Au lieu de 'élever davantage encore pendant le neurième mois, il semble descendre; & le rentre paroît plus bas aux approches de accouchement.

Après le fixième mois, le col de la natrice commence à se développer; il épaissit d'abord vers sa base, & diminue e longueur insensiblement, jusqu'à ce u'il soit complétement essacé; l'orisice

D iii

alors se dilate assez pour admettre le doigt.

L'époque où l'orifice de la matrice commence à s'ouvrir n'est cependant pas la même chez toutes les semmes; quelquefois il est assez ouvert pour recevoir le doigt dès le huitième mois, & même plutôt, sur-tout chez les semmes qui ont eu déjà des ensans.

La matrice, dans les derniers temps de la grossesse, paroît avoir dix à douze pouces de longueur sur sept à huit de largeur dans le milieu de son corps. Cette augmentation d'étendue s'opère sans que l'épaisseur de ses parois diminue considé-

rablement.

D. La matrice éprouve-t-elle quelques déplacemens dans le cours de la grossés ?

R. Il est assez ordinaire de la trouver plus basse dans les deux premiers mois; mais par la suite son orifice s'éloigne de l'extérieur à mesure qu'elle s'élève dans le bas-ventre, & presque toujours son son son se porte vers l'un ou l'autre côtés de cette cavité, ou se déjette en devant au-dessus des os pubis. On nomme cess déplacemens obliquité. Voyez l'art. obliquité.

D. De quelle action la matrice est-elle:

susceptible?

R. La matrice est douée de la facultés de revenir sur elle-même, de se resserrer, & de se réduire à un très-petit volume, lorsque les substances qui l'avoient sorcées

fur l'Art des Accouchemens. 79 de se dilater en sont sorties; cette faculté

se nomme action tonique.

La matrice est capable d'une autre action beaucoup plus forte, qu'on appelle contraction. C'est au moyen de celle - ci qu'elle expulse l'enfant & le délivre. Cette contraction ne dure qu'un instant, ensuite elle cesse, & recommence après un intervalle de quelques minutes, pour reprendre ainsi jusqu'à ce que l'accouchement soit terminé. (Voyez l'art. douleur de l'accouchement).

D. Quel est l'état de la matrice après l'ac-

couchement?

R. La matrice se resserrant & diminuant de capacité à mesure que l'ensant s'en dégage, se trouve réduite, immédiatement après l'accouchement, à un volume tel que son sond est plus bas que l'ombilic. Elle perd encore de son étendue par la sortie du placenta, & n'excède guère la grosseur du poing après la délivrance. Réduite à ce terme, elle ne tarde pas à se tumésier un peu de nouveau, par rapport à l'engorgement de ses parois, pour diminuer intensiblement ensuite, & revenir lentement à son état naturel.

D. La matrice se resserre-t-elle aussi promptement que vous l'annoncez, après la sortie

de l'enfant, chez toutes les femmes?

R. Non: il arrive quelquefois qu'elle ne se resserre pas dans les proportions ci-

dessus, soit parce que ses facultés se trouvent affoiblies, soit parce qu'elle se délivre trop promptement de l'enfant, & que ses parois tombent dans une espèce d'affaissement & de relâchement. Au lieu de se contracter & de se durcir, comme dans le cas précédent, elle reste souple & flafque au toucher; de manière qu'on a peine à la distinguer & à la reconnoître. On a coutume d'exprimer cet état de foiblesse & de relâchement par le mot atonie, ou inertie. Cet état peut avoir des suites. fâcheuses, comme on le verra ci-après. ( Voyez l'art. délivrance....)

# EXPLICATION

## DE LA PLANCHE V.

Cette Figure représente la forme extérieure de la matrice dans le neuvième mois de la grossesse.

AA. Le corps de la matrice.

BB. Le col de la matrice.

C. L'orifice externe.

The stand of the stand parent town and business and the days of the

DDDD. Les ligamens larges.

EEEE. Les ligamens ronds.

FFFF. Les trompes de Fallope.

GG. Les ovaires.



# CHAPITRE II.

Des règles, de la fécondité, de la serilité & de la conception.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des règles.

D. Q U'ENTENDEZ-VOUS par règles? R. On défigne sous ce nom, l'évacuation de fang qui se fait périodiquement par le vagin, depuis l'âge de douze à quatorze ans jusqu'à celui de quarante-cinq à cinquante. On substitue souvent à cette dénomination celle de mois, de flux lunaire; de flux menstruel, d'ordinaires, &c.

D. Les régles commencent-elles toujours à l'âge que vous venez d'assigner, & cessentelles de même à celui de quarante-cinq à cin-

quante ans?

R. Non: nous avons indiqué l'époque a plus ordinaire, tant pour la première pparition des règles, que pour leur suppression absolue; mais elles paroissent uelquefois beaucoup plutôt, quelquefois lus tard, & finissent de même. On a 'u des enfans à peine sortis du berceau

éprouver cette évacuation; & des femmes y être sujettes jusques dans l'extrême vieillesse.

D. Toutes les femmes sont-elles réglées? R. Il en est bien peu qui ne le soient pas; & il n'est pas rare que chez ces semmes une évacuation quelconque, telle qu'un faignement de nez, un flux hémorrhoïdal ou une diarrhée, ne remplace périodiquement les règles. On regarde ces femmes comme inhabiles à la génération, & le vulgaire les appelle bréhaines.

D. D'où provient le sang des règles?

R. Ce sang transsude de la surface interne de la matrice par les ouvertures nombreuses, que nous avons regardées comme les orifices des sinus utérins; & dans l'opinion de quelques auteurs, il découle immédiatement des artères ou des veines de la matrice. Les vaisseaux du vagin, & ceux du mufeau de tanche, en fournissent peut-être une partie.

D. Quelle est la qualité du sang de règles?

R. Chez une semme saine, le sang des: règles est pur, comme celui qu'on tire-roit d'une veine du bras dans le même temps: il n'a aucune des mauvaifes qualités que des auteurs lui ont assignées; comme de faire tourner à l'aigre les li-queurs en sermentation, ou les boissons sermentées, d'exciter la pourriture des viandes, de ronger le fer, &c.

Si on le trouve quelquesois altéré, & d'une odeur fétide, &c. il faut l'attribuer à la mauvaise santé de la femme, à l'altération de ses humeurs, à quelques maladies des voies utérines, ou à ce que ces femmes négligent, dans le temps des règles, les soins que demande la propreté.

D. Les règles reparoissent-elles souvent chez la même femme, & de combien de temps est

leur durée?

R. La plupart des femmes n'éprouvent cette évacuation qu'une fois le mois; il en est quelques-unes qui sont réglées tous les quinze à vingt jours, & d'autres on

ne peut plus rarement.

La durée de cette évacuation est de quatre à six jours, & de huit à l'égard de certaines femmes. Nous ajouterons que chez d'autres les règles n'ont lieu que pendant un jour, & même moins.

D. Quelle est la quantité du sang qui

s'écoule pendant ce temps?

R. On ne peut trop l'apprécier : mais cette quantité, qu'on estime de trois à quatre onces, diffère selon la constitution de la femme, sa manière de vivre, le climat qu'elle habite, &c. Les femmes d'une constitution sanguine perdent en général plus que les autres; celles qui habitent les villes, & qui vivent dans l'aisance, perdent davantage que celles de la campagne, qui font plus d'exercice, & se

nourrissent d'alimens grossiers & peu suc-

D. Les femmes enceintes sont-elles réglées?

R. Non: cette évacuation se supprime pendant la grossesse, & ne reparoît, le plus souvent, que six semaines ou deux mois après l'accouchement, même plus tard, chez les semmes qui n'allaitent pas leurs enfans. Il s'en trouve néanmoins qui sont réglées une ou deux sois dans le commencement de la grossesse; quelques-unes qui le sont jusqu'à un terme plus avancé, & bien peu chez qui cette évacuation se soutient périodiquement jusqu'au moment de l'accouchement.

D. D'où provient le sang des règles pen-

dant la grossesse?

R. Il ne peut provenir de la furface interne de la matrice, comme chez les femmes qui ne font pas enceintes, puisque le produit de la conception remplit la cavité de ce viscère, & y est adhérent de toutes parts. On présume, avec raison, que ce sang n'est produit que par les vaisfeaux du col de la matrice, & peut-être par quelques uns du vagin: aussi a-t-on observé que les règles étoient alors moins abondantes, & que le sang en étoit plus séreux.

D. Peut-on assurer qu'une femme est réglée : parce qu'elle perd du sang de temps à autre : pendant la grossesse ?

sur l'Art des Accouchemens. 85

R. Non: pour qu'une femme foit réglée, il faut que l'évacuation dont il s'agit vienne périodiquement, comme avant la grossesse, & aux mêmes époques. Les femmes qui ne voient du sang qu'à des intervalles irréguliers, sont dans un état de perte; & presque toujours ce sang vient de ce qu'une portion du placenta s'est détachée de la matrice.

D. Est-il bien important de distinguer les règles d'avec la perte?

R. Cette distinction seroit utile en certains cas; mais elle est quelquesois bien dissicile. Elle seroit utile, en ce que les règles, qui sont une évacuation naturelle, ne peuvent influer aussi désavorablement sur la grossesse, qu'une perte qui proviendroit du détachement d'une portion de placenta.

Les règles peu abondantes alors s'arrêtent d'elles-mêmes, & durent peu de temps; elles foulagent la femme, au lieu de l'affoiblir; mais il n'en est pas de même de la perte, qui peut augmenter, si l'on ne prend les précautions convenables, & être suivie de fausses-couches ou d'accou-

chement prématuré.

D. Comment peut on distinguer ces deux espèces d'évacuations?

R: Voici quelques observations qui peuvent avoir leur utilité en pareilles circon-

stances. Les règles paroissent au temps marqué comme avant la grossesse; le sang coule en petite quantité, il est plus sluide, plus pâle, & se coagule dissicilement; cette évacuation n'est précédée d'aucune cause remarquable, à laquelle on puisse l'attribuer. La perte, au contraire, s'annonce à la suite de l'une de ces causes; soit d'une chûte, d'un esfort, d'une violente passion, ou dans un cas de pléthore excessive. Elle n'a point de temps marqués; elle est accompagnée d'un sentiment de pesanteur, de douleurs vers la matrice, & de défaillances. Le sang en est plus épais, plus rouge, & se coagule plus aisément: souvent même il sort sous forme de caillot.

D. Les femmes enceintes ont-elles quelques précautions à observer pendant le cours des

règles?

R. Quand cette évacuation n'est que médiocre, les semmes observeront seulement de ne pas faire de grands mouvemens, ni aucun excès dans le régime; mais elles garderont le repos, elles se tiendront au lit, & elles feront usage de quelques boissons tempérantes & acidules, si les règles deviennent abondantes.

Si les règles se renouvelloient ainsi tous: les mois, il seroit à propos de les prévenir, ou de les modérer par une saignée: du bras, faite quelques jours avant leur. fur l'Art des Accouchemens. 87 apparition, lorsque la femme en éprouve les symptomes avant-coureurs.

D. Que doit-on prescrire à la semme dans

le cas de perts?

R. Lorsque la perte ne fait que s'annoncer, & qu'il coule peu de sang, si elle n'a pour cause qu'un mouvement violent, une passion vive, &c. la conduite cidessus est celle qu'il convient de garder; mais quand cet accident provient de la plénitude des vaisseaux qui a détruit une partie des adhérences du placenta, il saut pratiquer une ou deux saignées du bras selon les circonstances, prescrire le repos le plus exact, donner des boissons sortement acidulées, &c. on verra dans la suite ce qu'il faut saire dans ce cas, selon qu'il devient plus ou moins grave.

devient plus ou moins grave.

D. Les femmes qui allaitent leurs enfans sont-elles réglées comme dans l'état habituel?

R. Il est rare que ces semmes soient sujettes à cette évacuation périodique. Elle ne paroît chez la plupart qu'après qu'elles ont sevré l'enfant, & chez d'autres, que vers la fin de l'allaitement, c'est-à-dire, après un an. Il en est cependant aussi dont les règles reviennent plutôt, & l'opinion qu'on a de ces semmes est telle, qu'on les regarde généralement comme de mauvaises nourrices.

D. Pourquoi ces femmes ne seroient-elles.
pas aussi bonnes nourrices que les autres ?

88 Principes

R. 1°. C'est qu'une nourrice qui est réglée périodiquement, & dès les premiers temps, a plus de disposition qu'une autre à devenir grosse; 2°. c'est que le lait souvent s'éclaircit & diminue pendant le cours des règles; ce qui peut insluer sur la santé de l'enfant. Mais il est des semmes dont le lait ne perd aucune de ses bonnes qualités, quoiqu'elles soient réglées tous les mois; s'il convient de changer l'enfant de nourrice dans le premier cas, on ne seroit nullement sondé à le faire dans le second.

# SECTION II.

De la fécondité & de la stérilité.

D. Qu'EST-CE que fécondité?

R. La fécondité, chez la femme, est la faculté de concevoir.

D. A quel âge la femme jouit-elle de cette

faculté?

R. La femme est en état de concevoir, & de devenir grosse, dès qu'elle est bien réglée, & tant que cette évacuation menstruelle continue; conséquemment depuis l'âge de douze à quatorze ans jusqu'à celui de quarante-cinq à cinquante dans les climats tempérés.

D. La femme ne peut-elle pas devenir grosse avant la première apparition des règles, &

après leur cessation absolue?

sur l'Art des Accouchemens. 89

R. Quoique les règles soient le présage de la técondité, & que la plupart des femmes ne conçoivent qu'autant que cette évacuation s'est manifestée, & se manifeste encore, il en est cependant qui ont conçu & qui sont devenues grosses avant d'être réglées, & d'autres plusieurs années après la suppression absolue de cette évacuation.

D. D'où provient la fécondité?

R. Cette aptitude à concevoir ne paroît pas seulement une suite de la bonne contitution de la semme, de la bonne conformation des parties de la génération, de la qualité des fluides qui arrosent ces parties, & de la sensibilité dont elles jouissent; car on ne voit que trop de semmes valétudinaires, même infirmes, concevoir & devenir mères.

D. Qu'est-ce que la stérilité?

R. La stérilité est l'inaptitude à concevoir ; c'est la privation de cette faculté connue sous le nom de fécondité. La stécilité est, chez la semme, la même chose que l'impuissance chez l'homme.

D. Quelles sont les causes de la stérilité?

R. L'obturation du vagin & celle du col de la matrice sont les seules causes qui paroissent devoir s'opposer à la conception. Les vices de conformation des parties, tant externes qu'internes, de la sénération, la mauvaise qualité des fluides

qui vivisient toutes ces parties, & qui les arrosent; le défaut d'évacuations menstruelles, ou leur abondance; les écoulemens d'humeurs blanches qu'éprouvent habituellement certaines femmes, l'embonpoint excessif, &c. qu'on a regardés comme autant de causes de stérilité, ne peuvent passer absolument pour telles.

D. Il n'est donc pas facile de déterminer quelle est la cause de la stérilité chez bien des

femmes.

R. Il est d'autant plus difficile de le faire, que nous en voyons souvent qui deviennent grosses, quoique affectées de plusieurs de ces maladies, de ces vices de conformation dont nous venons de parler; tandis que d'autres semmes saines, du moins en apparence, & hien conformées, ne peuvent le devenir. Combien n'en a-t-on pas vu long-temps stériles avec un premier mari, avoir des ensans avec un second; ou ne pouvoir en donner à celuici, quoiqu'en ayant eu plusieurs en premières noces?

D. Ne peut-on pas remédier à la stérilité?

R. On peut y remédier dans beaucoup de cas. Quand elle dépend de l'obturation du vagin & de celle du col de la matrice, par exemple, on la fait cesser, en ouvrant ces conduits. On guérit de même quelques-unes des maladies qui semblent devoir rendre la femme stérile, &c. mais

fur l'Art des Accouchemens. 91 les procédés pour y parvenir, toujours au-dessus des lumières d'une Sage-semme, sont du ressort d'un Accoucheur instruit, ou du Médecin.

#### SECTION III.

De la conception & de la génération.

D. Q v'EST-CE que la conception?

R. On ne fauroit donner une définition bien claire de la conception. C'est l'action par laquelle se réunissent dans le sein de la femme les principes nécessaires à la formation de l'enfant & de ses dépendances.

L'arrangement & le développement de ces mêmes principes se nomme génération.

D. Quels sont les principes que fournissent Chomme & la semme dans l'acte de la génération?

R. La nature de ces principes nous est inconnue; l'Être suprême ayant couvert d'un voile impénétrable le mécanisme de la génération. Malgré le travail insatigable des plus savans Naturalistes, nous ignorons encore comment s'accomplit cette fonction, & en quoi l'homme & la semme y contribuent. Tous les systèmes établis à ce sujet se réduisent à deux principaux; l'un dans lequel on admet le mêlange d'une liqueur fournie par l'homme avec une

92 Principes

semblable qui vient de la semme; & dans l'autre on suppose, chez la semme, des œus qui contiennent les rudimens du sétus, & que l'homme ne sait que séconder ou vivisier.

Ce dernier système est le plus généralement admis; & le premier n'a que peu de partisans.

D. Dans quelle partie de la femme se sait

la conception?

R. Soit qu'on admette le fystème du mélange des deux liqueurs prolifiques, ou celui des œus, on sera également fondé à croire que la conception se fait dans l'un des ovaires, puisqu'on y a trouvé des entans bien formés. Dans l'un de ces systèmes, l'œus fécondé dans l'ovaire s'en détache, & en est exprimé par le pavillon de la trompe, qui le transporte dans la matrice; où il se nourrit: & se développe pendant neus mois ou environ.

Le produit de la conception s'arrête quelquesois dans le milieu de la trompe même; d'autres sois le pavillon de cette trompe le laisse échapper & tomber dans le bas-ventre, où il peut aussi se déve-lopper; ce qui constitue autant d'espèces de grossesse, que nous indiquerons dans la suite.

D. Le produit de la conception est-il tou-

sur l'Art des Accouchemens. 93

R. Si l'on peut assurer qu'il est toujours de la même nature dans les premiers momens, du moins présente-t-il quelquesois de grandes dissérences dans la suite. S'il résulte presque toujours de la conception un ou plusieurs enfans avec leurs annêxes, quelquesois ce n'est qu'une espèce de masse fongueuse & comme charnue, qu'on désigne sous le nom de môle, ou de fauxgerme: de-là viennent ces dénominations, de bonne conception & de fausse conception.

D. Quels sont les signes qui dénotent

qu'une femme vient de concevoir?

R. Il n'en est pas d'après lesquels on puisse l'assurer, sans craindre de se tromper. Si quelques semmes éprouvent, à l'instant même de la conception, des changemens remarquables dans leur manière d'être, soit en bien, soit en mal, qui les portent à croire qu'elles viennent de concevoir, le plus grand nombre n'en est affecté en aucune saçon.



# CHAPITRE III.

De la grossesse , de ses différentes est pèces, & des signes qui la font: reconnoître.

## SECTION PREMIÈRE.

De la grossesse & de sa division.

.D. Qu'EST-CE que la grossesse?

R. On désigne sous ce nom l'état d'une: femme qui a conçu, & qui porte en elle: le produit de la conception.

D. Combien peut - on établir d'espèces des

grossesses?

R. On ne peut en établir que deux espèces générales, qui dissèrent par la nature du produit de la conception. On ne doit pas appeller du nom de grossesse, comme l'ont fait quelques auteurs, certaines maladies qui donnent lieu au déves loppement du ventre de la semme, telles que l'hydropisse, &c. cet état n'ayant rien de commun avec le premier, si ce n'est la forme extérieure & le volume du ventre?

L'une des deux espèces de grossesses que nous admettons, est formée par un ou plusseurs enfans avec leurs dépendances : nous

sur l'Art des Accouchemens. 95 l'appellerons vraie grossesse. L'autre, qui est également la suite de la conception, n'est formée que d'une masse qui a quelque ressemblance avec le placenta, & qu'on désigne tantôt sous le nom de môle, tantôt sous celui de faux-germe: nous la nommerons fausse grossesse.

D. La vraie grossesse ne présente-t-elle pas

elle-même différentes espèces?

R. La vraie grossesse présente de trèsgrandes différences; 1°. selon le lieu où se développent les substances qui la constituent; 2°. selon le nombre d'ensans qui la forment; 3°. selon les accidens qui l'accompagnent.

Relativement à toutes ces différences, la grossesse a reçu des dénominations par-

ticulières.

On appelle bonne grossesse, grossesse ordinaire, grossesse utérine, celle où le produit de la conception se développe dans
la matrice; & on la distingue en simple,
en composée, & en compliquée. La grossesse simple, qui est la plus ordinaire,
est celle où il n'y a qu'un seul enfant; la
grossesse composée, celle où il se trouve
plusieurs enfans, ou bien un seul avec
une môle ou saux-germe: l'une & l'autre
de ces grossesses peuvent être compliquées d'accidens.

La grossesse extra-utérine, qu'on peut appeller mauvaise grossesse, parce que l'issue

en est toujours sâcheuse, a reçu également des dénominations particulières, selon le lieu où se trouve l'ensant & ses dépendances: on l'appelle grossesse tubaire, quand elle est dans l'une des trompes; des ovaires, quand elle a son siège dans l'un des ovaires; ensin, grossesse abdominale, lorsque l'ensant se développe dans le bas-ventre même.

Il peut exister en même temps une grossesse utérine & une grossesse extra-utérine;

mais les exemples en sont rares.

## SECTION II.

Des signes de la grossesse.

D. QUELS sont les signes de la grossesse.

en général?

R. On a toujours distingué ces signes; en rationnels & en sensibles. Les signes; rationnels font ceux qu'on déduit des changemens qu'éprouve la semme dans sa manière d'être; telles sont la suppression des règles, les lassitudes spontanées, les dégoûts, les nausées, les vomissemens, les desir de certaines choses de peu d'usage, soit en alimens, soit en boissons, le gonssiement & la tension douloureuse des mammelles, &c.

D. Peut-on assurer d'après ces signes que

la femme est grosse?

R. Si le plus grand nombre des femmes

sur l'Art des Accouchemens. qui éprouvent ces symptomes sont enceintes, il en est chez lesquelles ils ne dépendent que de la suppression des règles. La grossesse d'ailleurs ne donne lieu souvent à aucun de ces petits accidens : s'ils ont paru comme autant de fignes de cet état, il faut convenir qu'ils font trèsincertains.

La fecrétion du lait, ou son excrétion par les mammelles, n'est pas un indice plus fûr de la grossesse; puisqu'on l'a remarquée à la suite d'une suppression accidentelle des règles, & même chez de très-jeunes filles (a).

D. Qu'entendez-vous par signes sensibles

de la grossesse?

R. Les signes sensibles de la grossesse sont ceux qui se manifestent à la vue, ou qu'on découvre par le toucher. Ces signes, qu'on ne déduit que de l'état de a matrice, des changemens qu'elle a éprouvés, & de l'existence de l'enfant, ne laissent aucun doute sur la grossesse; même en font connoître l'espèce, lans le plus grand nombre des cas, ainsi que le terme auquel elle est parvenue.

<sup>(</sup>a) Nous avons vu une petite fille de l'âge de mit ans, en sournir abondamment, & de la meilsure qualité.

## SECTION III.

Du coucher, de son utilité, & de la manière d'y procéder.

D. QUE doit-on entendre par le toucher; pris dans le sens relatif à l'Art des accouchement?

R. Le toucher, dans ce sens, consiste à porter un doigt dans le vagin, pour s'assurer de l'état de la matrice, & de ce: qu'elle renserme. On peut l'entendre éga-lement de l'application des mains à l'extérieur du ventre, faite dans les mêmes vues.

D. Le toucher est - il d'une grande utilité. dans l'Art des accouchemens?

R. Il est tellement nécessaire, qu'ont doit le regarder comme la boussole de l'Accoucheur, & qu'aucun autre sens ne peut y suppléer. Les occasions de le pratiquer sont on ne peut plus multipliées. C'est par le toucher qu'on juge de la bonne ou de la mauvaise conformation du bassin, & de l'état sain ou morbisque des parties internes de la génération; qu'on reconnoît la grossesse, & qu'on en apprécie les dissérens termes; qu'on distingue la grossesse utérine d'avec la grossesse extra-

fur l'Art des Accouchemens. 99 utérine, la grossesse composée d'avec la simple; les vraies douleurs de l'enfantement d'avec les sausses douleurs, ou celles qui lui sont étrangères. Enfin, c'est par le toucher que nous apprécions les progrès du travail; que nous reconnoissons la partie que l'enfant présente à l'orifice de la matrice, & dans quelle position se présente cette partie, &c.

D. Comment doit-on proceder au toucher?

R. Pour se rendre habile dans cette partie essentielle des accouchemens, il faut l'exercer fréquemment & sur beaucoup de semmes; en commençant par celles qui ne sont pas enceintes, afin de prendre une connoissance exacte de la matrice dans l'état naturel. Ce n'est qu'au moyen de ces connoissances préliminaires que l'Accoucheur doit s'attendre à distinguer les changemens que la grossesse, ou certaines affections morbifiques, déterminent dans la matrice.

On touchera d'abord la femme debout; pour juger plus sainement de la position de la matrice, de sa pesanteur & de sa mobilité; & ensuite étant couchée sur le dos, pour mieux en apprécier le volume. Le doigt indicateur de l'une ou l'autre main étant enduit de beurre, de pommade ou de tout autre corps gras, on cherchera doucement l'entrée du vagin; un écartant les grandes lèvres, & ou

E ij

l'introduira jusqu'à ce qu'on rencontre museau de tanche. On examinera quelle est la longueur, la grosseur, la dureté de cette partie, & le degré d'ouverture de son orifice; on sera attention à sa situation, à la pesanteur de la matrice, & à sa mobilité.

Après ces recherches, si la semme est couchée sur le dos, on lui sera relever les genoux, de manière que les cuisses & les jambes soient à demi sléchies; on placera un oreiller sous la tête & les épaules, pour que la poitrine soit plus haute que le bassin, & que les muscles du bas-ventre, ainsi que la peau, soient dans un état de relâchement. On appliquera la main gauche sur le ventre, la paume vers le pubis, & les doigts alongés du côté de l'ombilic. On déprimera le ventre par une pression convenable, qu'on augmentera graduellement, & en portant: le bout des doigts réunis alternativement: d'un côté à l'autre, jusqu'à ce qu'on rencontre la matrice, qui se présente profondément sous la forme d'un corps assez. dur.

On s'assurera que ce corps est la ma-trice, en appuyant un peu plus sortements à l'extérieur, & en relevant ensuite les museau de tanche au moyen du doigt! porté dans le fond du vagin. En la fixant: ainst entre ce doigt & la main qui est: fur l'Art des Accouchemens. 101 au-dessus du pubis, on jugera facilement de son volume.

D. Le procédé que vous venez de décrire

est-il facile à exécuter?

R. Il ne présente de grandes difficultés que chez les semmes qui ont de l'embonpoint, ou dont le bas-ventre est extrêmement sensible; mais il est d'une exécution facile sur les semmes maigres, & sur-tout chez celles qui ont eu des ensans. Nous ajouterons qu'une partie de ces recherches devient inutile, quand l'Accoucheur a beaucoup d'expérience dans l'art de toucher; & que le doigt introduit dans le vagin lui sussit pour juger de la matrice, & distinguer celle qui est dans l'état naturel d'avec celle qui est affectée de quelque engorgement considérable, ou dans l'état de grossesse.

D. Comment doit-on pratiquer le toucher, quand il s'agit de déterminer si une semme

est enceinte ou non?

R. Quand il s'agit d'une grossesse douteuse, & au-dessous du terme de quatre mois, il faut procéder au toucher comme nous venons de le décrire; c'est-à-dire, qu'il convient de toucher la semme debout, & ensuite couchée, asin de pouvoir saisir & sixer la matrice entre le doigt porté dans le vagin & la main appliquée au-dessus du pubis. On peut se conduire de même dans un cas de grossesse plus

E iij

avancée, quoiqu'il suffise alors de toucher la femme debout.

D. A quels signes reconnoît-on une grof-sesse de deux, ou trois mois au plus?

R. On ne peut en assurer l'existence que d'après le volume de la matrice. Au terme de six semaines à deux mois, on trouve le corps de ce viscère sensiblement développé; il s'est arrondi dans tous les fens, & sa grosseur surpasse celle d'un œuf d'oie. La matrice, souvent à ce terme, fe trouve un peu plus basse que dans l'état ordinaire.

Au troisième mois, son corps plus arrondi encore, & plus développé, paroît égaler le volume du poing d'un homme; quelquefois la tête d'un très-petit enfant de naissance.

D. Peut-on assurer qu'une femme est grosse

d'après ces signes?

R. Non: ces signes n'appartiennent pas exclusivement à la grossesse l'engorgement des parois de la matrice, & nombre d'autres maladies, peuvent en augmenter le volume à ce point, & même bien plus. Mais dans le cas d'engorgement & d'obstruction, le corps de la matrice est dur; il est inégal au toucher, & comme raboteux; & le plus souvent: le col est affecté de la même manière.

Dans la grossesse, au contraire, la ma-trice plus volumineuse que dans l'état!

fur l'Art des Accouchemens. 103 ordinaire, est égale, & présente une sorte de souplesse au toucher, ainsi que le museau de tanche.

Les petits accidens que la femme éprouve depuis qu'elle se soupçonne grosse, & que nous avons regardés comme autant de signes rationnels de la grossesse, donnent un degré de certitude aux signes que nous déduisons de l'augmentation de la matrice; parce qu'ils n'ont pas lieu ordinairement dans les maladies de ce viscère.

D. Ne peut-on pas juger de la grossesse commençante d'après l'état du col de la ma-

trice seulement?

R. Beaucoup d'Auteurs l'ont pensé, d'après l'opinion où ils étoient, que l'orifice de la matrice se refermoit exactement après la conception. On ne peut assurer ce qui se passe à l'égard de l'orifice interne, parce que le doigt ne sauroit y parvenir avant les derniers mois de la grosfesse; mais quant à l'orifice externe, on ne le trouve dans aucun temps assez étroitement fermé, chez les semmes qui ont eu des ensans, pour qu'on ne puisse y introduire le doigt.

D. Quels sont les signes qui indiquent le quatrième & le cinquième mois de la grossesse ?

R. Au quatrième mois, le corps de la

R. Au quatrième mois, le corps de la matrice paroît au-dessus des os pubis, & son fond occupe à-peu-près le milieu de l'espace compris entre ces os & l'om-

bilic. Le museau de tanche est tourne vers le sacrum, & se trouve en général. plus élevé que dans les deux premiers mois.

Au cinquième mois, le corps de la maririce, plus volumineux encore, occuper toute la région hypogastrique, qui est alors saillante; & son fond s'approches à la distance de deux travers de doigts ou environ de l'ombilic.

C'est entre ces deux époques que la plupart des semmes distinguent les premiers mouvemens de l'enfant; & que l'Accoucheur peut le reconnoître manis.

festement.

L'époque de ces premiers mouvemens n'est cependant pas invariable. Il y a des femmes qui les distinguent dès le troissème mois, & d'autres qui n'en sont affectées qu'après le sixième, & même plus tard (a).

D. De quelle espèce sont les mouvemens; que la semme ressent dans ces premiers temps?

R. Ces mouvemens dépendent de l'action de l'enfant même, & sur tout de

<sup>(</sup>a) Nous avons donné des foins à plusieurs; semmes qui nous ont assuré n'avoir ressenti less premiers mouvemens de l'enfant que vers la révolution du septième mois; une autre semme n'en a éprouvé aucun avant l'acconchement, & toutes sont accouchées d'un ensant de grosseur ortinaire & bien portant.

sur l'Art des Accouchemens. 105 l'agitation de ses membres, qui frappen, alors avec assez de sorce la surface interne de la matrice, qui n'est tapissée que du chorion & de l'amnios, pour que la femme en soit affectée. La tête & le tronc de l'ensant se meuvent pareillement; mais leurs mouvemens impriment une sensation différente de celle qui résulte du mouvement des extrémités.

D. L'enfant ne commence-t-il à remuer qu'à l'époque où la femme s'apperçoit de ses mouvemens?

R. Étant animé dès l'instant de la conception, l'enfant doit remuer beaucoup plutôt; mais ses premiers mouvemens ne sont ni assez forts, ni assez étendus pour que la semme les distingue.

D. L'enfant n'a-t-il pas d'autres mouvemens que ceux dont vous venez de parler?

R. L'enfant a un autre mouvement, qu'on pourroit appeller de déplacement ou de ballottement; c'est un mouvement de totalité, auquel l'action de ses organes ne contribue en rien. Entouré d'un volume d'eau, toujours très-grand relativement à sa petite masse dans les premiers mois, l'enfant peut être déplacé par les mouvemens de la semme & l'attitude qu'elle prend, ou par les secousses que l'Accoucheur communique à la matrice, tant au moyen du doigt porté dans le vagin, que

Ey

par les mains appliquées extérieurement: mais le ballottement qu'éprouve l'enfant dans ces fecousses ne se manifeste qu'au doigt introduit dans le vagin.

D. Indiquez-nous d'une manière plus précise comment on peut exciter & reconnoître ce ballottement.

R. Pour le faire bien comprendre, nous établirons d'abord que l'enfant étant plus pefant qu'un pareil volume d'eau, doit toujours occuper la partie la plus basse de la cavité de la matrice; conséquemment la région qui avoisine le col de ce viscère, quand la semme est debout : aussi est-ce cette attitude que nous choisirons pour la toucher. Cela posé, pour exciter & reconnoître le ballottement de l'enfant, on se conduira de la manière suivante.

On avancera l'index d'une main jufqu'au fond du vagin, le plus haut poffible entre le museau de tanche & la symphise du pubis, & l'on placera l'autremain sur le ventre, à la hauteur du sond de la matrice. Alors on agitera doucement ce viscère au moyen du premier doigt, pour déplacer l'enfant, & l'obliger de s'élever au milieu des eaux; aussité tôt on donnera une autre secousse avec les doigts placés extérieurement, pour accélérer sa chûte sur le point d'où on l'avoit éloigné. L'enfant ainsi ballotté, en le point d'où on l'avoit éloigné. L'enfant ainsi ballotté, en le point d'où on l'avoit éloigné. L'enfant ainsi ballotté, en le point d'où on l'avoit éloigné. L'enfant ainsi ballotté, en le point d'où on l'avoit éloigné. L'enfant ainsi ballotté, en le point d'où on l'avoit éloigné. L'enfant ainsi ballotté, en le point d'où on l'avoit éloigné. L'enfant ainsi ballotté, en le point d'où on le premier de la place de la plus de

fur l'Art des Accouchemens. 107
retombant frappe le doigt introduit dans
le vagin, avec d'autant plus de force, que

la grossesse est plus avancée.

Ce ballottement est si peu remarquable au toucher avant le quatrième mois de la grossesse, que les personnes peu exercées ne sauroient le reconnoître; mais il devient d'autant plus manisesse, que la grossesse se rapproche davantage du huitième mois; c'est pourquoi les commençans feront bien de s'en assurer d'abord à cette époque, puis à celle de sept mois, de six & de cinq, pour se mettre à même de le reconnoître au quatrième.

D. La mère peut elle distinguer ce mouve = ment de ballottement de l'enfant?

R. On pourroit croire qu'elle ne le remarque pas, car elle n'en fait aucune mention; ce qu'il y a de certain, c'est que ce ballottement ne peut être aussi remarquable pour elle, que les mouvemens ordinaires dont nous avons parlé; excepté cependant quand l'enfant est mort. La femme, dans ce dernier cas, ressent ce mouvement de ballottement, & quelquefois d'une manière incommode; elle annonce qu'une espèce de boule pesante tombe constamment sur le côté où elle se couche, & suit les mouvemens qu'elle exécute.

D. Puisque la matrice contient beaucoup

d'eau, relativement à la grosseur du fœtus; dans les premiers temps de la grossesse, ne peut-on pas distinguer l'ondulation de ce fluide, comme on la distingue dans l'hydro-

pisie du ventre?

R. Les eaux de l'amnios ne sont jamais en assez grande quantité dans la grossesse ordinaire, pour qu'on puisse en distinguer l'ondulation, comme quelques uns l'ont annoncé. On ne pourroit d'ailleurs regarder cette ondulation comme un signe appartenant exclusivement à la bonne grossesse, puisqu'il auroit lieu également dans quelques unes des fausses grossesses.

ques-unes des fausses grossesses.

D. Quels sont les signes qui caractérisent le sixième & le septième mois de la grossesse.

R. Au sixième mois, le sond de la ma-

R. Au sixième mois, le fond de la matrice s'élève généralement au - dessus de l'ombilic, & cette cicatrice semble moins enfoncée; le col de la matrice paroît un peu plus court que dans l'état naturel, parce que la base du museau de tanche, ou sa partie supérieure, est plus développée, plus large & plus épaisse. L'orisice de la matrice est encore plus en arrière & plus haut qu'aux époques précédentes.

Au septième mois, le sond de la matrice commence à occuper la région épigastrique, & se trouve alors plus de trois travers de doigt au-dessus de l'ombilic; & la sorme du ventre est telle, que sa fur l'Art des Accouchemens. 109 plus grande convexité est à la hauteur de cette même cicatrice.

Le museau de tanche est quelquesois si éloigné de la vulve, que le doigt ne peut

y atteindre que difficilement.

Le col de la matrice est plus court que dans l'état naturel, & sa base encore plus large qu'au sixième mois. On trouve presque toujours la tête de l'ensant au détroit supérieur, & on la distingue aisément à travers l'épaisseur des parois de la matrice.

D. La tête de l'enfant ne se présente-t-elle ainsi qu'au septième mois de la grossesse ?

R. On la découvre également au fixième mois, & même plutôt, chez quelques femmes, quand on est suffisamment exercé dans l'art de toucher; mais ce n'est qu'au septième, pour l'ordinaire, qu'elle se préferte de manière à être reconnue des Accoucheurs les moins versés dans l'art dont il s'agit. La facilité avec laquelle on la reconnoît alors a fait croire au plus grand nombre des Praticiens qu'elle ne se présentoit que dans ce temps; & que c'étoit l'époque à laquelle l'ensant se restournoit, & faisoit la culbute (a).

<sup>(</sup>a) Nous discuterons cette opinion en parlant de la situation de l'enfant dans le sein de sa mère.

D. Quels sont les signes qui caractérisent? le huitième mois de la grossesse?

R. A ce terme, le fond de la matrice: est tellement élevé, qu'il touche presque au bord antérieur & inférieur de la poitrine chez le plus grand nombre des femmes. Le museau de tanche a peu de longueur, & dans bien des cas, ce n'est: qu'une espèce de mammelon très-court, ou un bourlet très-peu saillant, & assez. souple. Il est rare que l'orifice en soit ouvert chez les femmes enceintes de leur premier enfant; mais on y introduit constamment le doigt chez celles qui ont eu d'autres grossesses. La tête de l'enfant, à cette époque, paroît plus basse, & on la trouve plus solide & plus grosse qu'au septième mois. Souvent l'orifice de la matrice est si haut & si incliné vers le sacrum, qu'on ne peut y atteindre qu'avec une extrême difficulté.

D. Quels sont les signes qui dénotent le

neuvième mois de la grossesse?

R. Le fond de la matrice, au lieu de s'élever de plus en plus vers la poitrine dans le neuvième mois de la grossesse, semble s'en éloigner, & se rapprocher de l'ombilic, de manière que la région épigastrique devient plus souple: ce qui fait dire aux femmes que leur ventre a baissé, & qu'elles ne tarderont pas à accoucher. Cette espèce d'affaissement du ventre se

fur l'Art des Accouchemens. 111 fait insensiblement chez quelques-unes, & plus subitement chez d'autres. La matrice après ce temps paroît acquérir plus de largeur d'un côté à l'autre, & présente en devant plus de rondeur.

Le museau de tanche achève de se déployer dans le cours de ce dernier mois; il s'efface au point que souvent le bord de l'orifice est très-mince, quelques jours avant l'accouchement, & assez ouvert pour permettre au doigt de toucher les mem-

branes qui enveloppent l'enfant.

La réunion de tous ces signes fait connoître que le terme de l'accouchement n'est pas éloigné, & il en est d'autres qui annoncent qu'il est très-proche.

D. Quels sont les signes qui indiquent que le travail de l'accouchement ne tardera pas à

Se déclarer?

R. On peut distinguer ces signes en rationnels & en sensibles. Les premiers se déduisent du temps de la suppression des règles; de l'époque des premiers mouvemens de l'ensant; des mal-aises qu'éprouve la semme; des douleurs qu'elle ressent, tantôt vers les lombes, & tantôt dans le bas-ventre; des envies fréquentes d'uriner; de l'humidité des parties, des glaires qui en découlent, & souvent de l'apparition d'un peu de sang: mais ces signes sont moins certains que les suivans, que nous appellons signes sensibles.

Le moment de l'accouchement n'est pass éloigné, lorsque le col de la matrice est: complétement développé & entre-ouvert, comme nous l'avons dit, quand le bord! de l'orifice se durcit momentanément &: se relâche ensuite, lorsque les membranes. qui se présentent à cette ouverture se tendent & se détendent alternativement.

Ces effets sont comme le prélude du travail, & les douleurs qui en sont les premiers signes sensibles pour la femme, n'attendent, pour se faire sentir, qu'un degré d'action de plus de la part de la matrice; ce qui ne tardera pas à avoir lieu (a).

(a) Nous n'avons parle dans cet article que des fignes de la grossesse la plus ordinaire. Nous exposerons ailleurs ceux de la grossesse de plusieurs enfans, & de la grossesse extra-utérine, autant

qu'ils peuvent être connus.

Nous observerons de plus, que tout ce que nous avons dit de la hauteur du fond de la matrice jusqu'au huitième mois de la grossesse, & de l'état du museau de tanche, a rapport spécialement à une première groffesse. Nous ajouterons ici que le fond de la matrice paroît un peu moins élevé à chacune des époques assignees, chez les semmes qui ont en plusseurs enfans; que le museau de tanche conserve un peu plus d'épaisseur, & s'ouvre de meilleure heure; mais ces différences ne sauroient tromper l'Accoucheur instruit sur le terme de la grossesse, au-delà de quelques semaines,

# CHAPITRE IV.

Du fœtus, du placenta, du cordon ombilical; des membranes & des eaux.

#### SECTION PREMIÈRE.

Du fætus.

D. Qu'EST-CE que le fætus?

R. On donne ce nom à l'enfant depuis l'instant de la grossesse où toutes ses parties extérieures sont ébauchées, de manière à être reconnues, jusqu'au moment de sa naissance. On le nomme embryon avant le terme de six semaines à deux mois.

D. Peut-on juger de l'âge du fœtus d'après

sa longueur ou sa pesanteur?

R. Nous croyons qu'on ne peut le faire sans crainte de se tromper, si ce n'est peutêtre jusqu'au deuxième, ou au deuxième mois & demi de la grossesse. Avant ce terme, on remarque peu de différence dans la forme & la grandeur des embryons: ils paroissent tous dessinés d'après le même modèle. Ceux du terme d'un mois, ou environ, ne paroissent ni plus gros ni plus

longs qu'une fourmis ordinaire; & ceux de fix semaines on à-peu-près le volume: d'une grosse mouche à miel. Quoique less fœtus de deux mois & de deux mois &: demi soient beaucoup plus grands, ils ne présentent pas plus de différence entre! eux, qu'on n'en remarque dans le même:

nombre des premiers.

Après le terme de deux mois à deux: mois & demi, le fœtus augmente bient plus proportionnément d'une quinzaine: de jour à l'autre, qu'il ne l'a fait avant ce temps; & la différence est telle, qu'en comparant un fœtus de deux mois avec un de deux mois & demi, on ne sauroit: se persuader qu'en si peu de jours il se fût autant développé; & que la marche de! la nature fût aussi lente dans les premiers mois de la grossesse, & aussi rapide dans, la fuite.

La différence d'un fœtus de quatre mois, d'avec celui de trois, n'est pas moins remarquable que celle d'un fœtus de cinq d'avec celui de quatre, & ainsi de suite; de sorte que celui de neus mois surpasse en

général de beaucoup celui de huit.

D. Les enfans, à quelque terme que cer
foit de la grossesse, ne présentent-ils pas quel-

ques différences entre eux?

R. Oui: on leur remarque des différences, qu'on pourroit appeller individuelles. Les uns sont plus grands, plus gros & plus

sur l'Art des Acçouchemens. 115 pesans; les autres plus courts, plus grêles & d'un moindre poids. Mais il est un caractère propre, en quelque sorte, à chaque âge, qui mettra toujours un Accoucheur habitué à observer, à même de distinguer un fœtus d'un âge quelconque, d'un fœtus d'un âge au-dessus ou dessous. D. Quelles sont en général la longueur

& la pesanteur du fætus à terme?

R. La longueur la plus ordinaire est de dix-huit à vingt pouces, & la pesanteur de six à sept livres. On a vu des ensans qui n'avoient que seize à dix-sept pouces, tandis que d'autres étoient de vingt-deux

à vingt-trois.

Les uns ne pesoient que quatre livres, les autres quatre à cinq, ou cinq à six. On en a trouvé du poids de huit, de neuf, de dix livres, & même plus; mais ces derniers sont excessivement rares. On en cite du poids de vingt-cinq; & il est des mères de famille qui se plaisent à répéter qu'elles en ont eu de plus forts encore; mais ces faits ne sont pas avérés, & nous les croyons faux (a).

<sup>(</sup>a) Un Accoucheur, employé dans une ville de province, se trouvant chez moi à l'instant où l'on me présentoit un enfant assez gros, qui étoit mort dans le travail de sa naissance, le jugeant comparativement à un de vingt-cinq livres, qu'il me disoit avoir reçu depuis peu, l'estima de ving-

D. Comment doit-on considérer le fœtus

relativement à l'accouchement?

R. On doit connoître; 1°. fon attitude dans le sein de la mère, ou la manière dont il est replié sur lui-même; 2°. sai situation à l'égard de la matrice; 3°. less diverses régions de sa surface, & les castractères qui les distinguent les unes dess autres ; 40. la structure de ses parties prins cipales, la tête & la poitrine, telles que les changemens qu'elles peuvent éprouvers dans l'accouchement, leurs dimensions, & les mouvemens variés qu'elles peuventu exécuter, ainsi que les extrémités, tanta supérieures qu'inférieures, c'est-à-dire less bras & les jambes.

D. Quelle est l'attitude du fatus dans le:

Jein de sa mère?

R. Le corps du fœtus est courbé sur sa! partie antérieure, & sa tête est abaissée sur le haut de la poitrine; les cuisses sont: fléchies sur le bas-ventre, les jambes sur les cuisses, mais de manière que les genoux se trouvent écartés l'un de l'autre, & les pieds très-rapprochés, même croisés

trois à vingt-quatre livres, quoique je ne l'évaluasse que de huit livres au plus. La balance fit connoître qu'il n'en pesoit que huit moins un quart.

J'en ai reçu plusieurs du poids de dix livres; un seul du poids de douze, & un de treize moins un quart. Ce dernier étoit d'une grosseur énorme.

fur l'Art des Accouchemens. 117 & appliqués fur les fesses; les bras sont couchés sur les côtés de la poitrine, les coudes portés en avant; les avant-bras ployés & appliqués sur la poitrine même.

C'est cette même attitude que l'enfant reprend dans les premiers temps de sa naissance, toutes les sois qu'il se trouve

débarrassé de ses langes.

Reployé ainsi, il se présente sous la forme d'un corps ovoïde, dont le plus grand diamètre, qui est de dix pouces au moins, passe du haut de la tête aux pieds appliqués sur les sesses; & le plus petit diamètre, qui est de quatre pouces & demi à cinq pouces, d'une épaule à l'autre (a).

D. Quelles inductions peut-on tirer de cette observation relativement à l'accouchement?

R. La plus importante de toutes ces inductions, c'est que l'enfant ne peut sortir du sein de sa mère, qu'il ne présente à l'orifice de la matrice une des extrémités de l'espèce de corps ovoïde, qu'il sorme dans l'attitude que nous venons de décrires c'est-à-dire, qu'il ne présente la tête, les pieds, les genoux ou les sesses, comme on le remarquera ci-après.

D. Quelle est la situation la plus ordinaire de l'enfant dans le sein de sa mère?

<sup>(</sup>a) On peut juger de l'attitude du fœtus par relle qu'on lui a donnée fur la Planche VIII.

R. Les Auteurs sont encore très-partagéss sur sa situation avant le septième mois. Ils conviennent tous qu'il n'a point de position déterminée dans les premiers mois, parce qu'il est alors très-petit; mais qu'il en prend une dans la suite, & qu'il la conserve jusqu'à l'époque de sept mois, temps où il se retourne.

D. Quel est donc la position que les Auteurs donnent à l'enfant, & comment se re-

tourne-t-il?

R. Cette position est telle, que les sesses & les pieds sont en bas, que la tête répond au sond de la matrice, le dos à la partie possérieure de ce viscère; la sace

& la poitrine étant en devant.

Quand l'enfant se retourne, le sommet de la tête descend le long de la partie antérieure de la matrice, & vient se présenter au détroit supérieur, de manière que l'occiput répond au pubis, & le front au facrum; tandis que les sesses pieds remontent le long de la partie postérieure de la matrice, pour se rendre vers le sond; de sorte qu'après ce déplacement, le dos se trouve en devant & au-dessus du pubis.

D. Comment a-t-on désigné ce déplacement,

& peut-on l'admettre?

R. On l'a désigné sous le nom de culbutte. Quoique généralement admis, & par des hommes d'une grande autorité dans tout ce qui concerne l'art des accouchemens, nous ne pouvons nous empêcher de le rejetter, & de dire que sur mille ensans, il n'en est pas deux qui se retournent ainsi, & qui fassent la culbute au terme indiqué par ces Auteurs.

D. Comment prouverez-vous que l'enfant

ne fait pas cette culbute?

R. La raison & l'observation s'accordent à prouver que l'enfant ne se retourne pas, comme l'ont publié la plupart des auteurs. De toutes les positions dans lesquelles on peut se représenter l'enfant entouré d'eau, la plus incommode, la moins conforme au rapport des parties, & la plus difficile à conserver deux instans de suite, est celle que lui donnent les partisans de la culbute, jusqu'à l'époque où celle-ci s'exécute. La position de la tête après la culbute n'est pas plus commode & plus naturelle, & on ne la remarque presque jamais au temps de l'accouchement, quel que soit le terme de la grossesse où il se fasse. L'observation nous instruit d'ailleurs que dans les avortemens qui se font avant le septième mois, c'est presque toujours la tête qui se présente; qu'à l'ouverture des femmes mortes avant cette époque, on a le plus souvent trouvé cette partie sur le col de la matrice; enfin, qu'on la reconnoît de très - bonne heure à travers les parois de ce viscère, au moyen du doigt introduit dans le vagin; quand on est suffisamment instruit dans l'artt de toucher, &c. &c.

D. L'enfant ne peut - il pas se retourners

en quelques cas?

R. Il en est quelques-uns où il peut le faire; mais ce seroit par l'effet du plus; grand hasard, s'il se retournoit alorss comme dans la culbute que nous venons; de décrire. Dans l'opinion que nous adoptons pour ces cas d'exception à la règle: générale, l'enfant peut changer de position, & présenter successivement à l'orifice de la matrice diverses parties éloignées les unes des autres, même diamétralement opposées; comme la tête dans; un instant, le dos, la poitrine, un de ses: côtés, ou les pieds dans l'instant qui suit : de même qu'il peut présenter d'abord! l'une de ces dernières parties, & la tête: un moment après (a).

<sup>(</sup>a) Nous sommes certains de ce que nous avançons à ce sujet, ayant observé plusieurs sois ces déplacemens de l'ensant dans le cours du travail de l'accouchement. Un grand nombre d'élèves ont remarqué, comme nous, dans l'un de ces cas, toutes les parties dont nous venons de parler, successivement à l'orifice de la matrice, chez une femme parsaitement à terme, & dont le travail a duré plus de trente-six heures. Dans un autre temps, nous avons observé les mêmes changemens sur une semme qui accouchoit au terme de cinq mois.

fur l'Art des Accouchemens. 121

D. Quels sont les cas où l'enfant peut exécuter d'aussi grands mouvemens, & changer ainsi de position?

R. Il ne peut changer ainsi de position, qu'autant qu'il est entouré d'une grande quantité d'eau, relativement à son volume, & qu'il jouit d'une extrême mobilité; ce qui a toujours lieu dans les premiers mois de la grossesse, & quelquesois sur la fin, mais dans des cas excessivement rares. Les dimensions de la cavité de la matrice étant alors beaucoup plus grandes que les dimensions de l'enfaut, il peut changer de position, selon l'attitude que la femme prend, & les mouvemens extraordinaires dont il se trouve quelquesois agité. Si la tête se présente d'abord à l'orifice de la matrice, elle peut se porter vers le fond ou vers l'un des côtés, &c.

D. Cette observation peut-elle être de quelque utilité dans la pratique des accouchemens?

R. Oui : elle nous apprend, 1°. que dans certains cas, nous ne devons prononcer sur la position de l'enfant qu'après l'écoulement des eaux de l'amnios, puisque ce n'est que dans ce moment qu'elle devient sixe; 2°. qu'il seroit avantageux dans les circonstances où l'enfant préfente successivement tant de parties à l'orifice de la matrice, de faire écouler les eaux à l'instant où la tête se trouve en

en bas (a), pourvu toutefois que l'orifice foit déjà bien dilaté.

D. Quelle est donc la position la plus or-

dinaire de l'enfant?

R. Cette position est telle, que le sommet de la tête se présente au détroit supérieur, l'occiput, le plus souvent, vers la cavité cotyloïde gauche, & le front vis-àvis la symphise sacro-iliaque droite; de sorte que les sesses occupent le sond de la matrice (b).

D. Comment divise - t - on la surface de

l'enfant?

R. On peut la diviser en régions anté-

rieure, postérieure & latérale.

La région antérieure comprend la face; le devant du col, la poitrine, le basventre, le devant du bassin & les genoux.

La région postérieure comprend l'occiput, le derrière du col, le dos, les lombes & les fesses.

Chaque région latérale présente, 1°. le

<sup>(</sup>a) Nous nous sommes comportés de cette manière dans un cas de l'espèce que nous venons de décrire, la semme n'étant grosse que de cinque mois. La tête de l'ensant s'étoit éloignée plusieurs, sois de l'orifice de la matrice, & les pieds s'yr étoient présentés de même: les caux écoulées, la rête s'engagea, & l'accouchement se sit heureusement.

<sup>(</sup>b) Voyez la Planche VIII.

fur l'Art des Accouchemens. 123 côté de la tête; 2°. le côté du col, l'épaule, le côté proprement dit, & la hanche.

Nous ajouterons, pour compléter les régions de la surface de l'enfant, le sommet de la tête & les pieds.

- D. Toutes ces régions peuvent-elles se préfenter à l'orifice de la matrice dans le temps de l'accouchement?
- R. Il n'en est aucune qui ne puisse s'y présenter; mais celles qu'on y remarque le plus souvent sont, 1°. le sommet de la tête; 2°. les pieds, 3°. les fesses, 4°. l'une ou l'autre épaule, 5°. le dos, 6°. l'une ou l'autre hanche. Quoique les autres régions ne se présentent que rarement, il n'est pas moins nécessaire que l'Accoucheur sache les distinguer.

D. Comment peut-on reconnoître toutes ces régions, & les distinguer les unes des autres?

- R. Elles ont toutes des caractères particuliers qui servent à les saire connoître; & ce sont ces mêmes caractères, plus ou moins apparens, que l'Accoucheur devroit s'habituer à bien saisir au moyen du toucher, puisqu'il n'a d'antre guide que ce sens dans presque tous les cas.
- D. Que doit-on considérer à la tête du fatus relativement à l'accouchement?
  - R. On doit en confidérer la forme;

la structure & les dimensions; son articulation avec le tronc, & les mouvemens qu'elle peut exécuter.

D. Quelle est la forme de la tête du fœtus?

R. La tête du fœtus, séparée du corps, est d'une sorme à-peu-pres ovoïde, mais légérement applatie en dissérens sens; de sorte qu'on peut y distinguer cinq régions & deux extrémités.

La région supérieure se nomme vertex, ou sommet; la région inférieure est la base du crâne; l'antérieure la face, & les côtés s'appellent régions temporales ou pariétales.

Le menton forme l'une des extrémités de la tête, & l'occiput en constitue l'autre: nous appellerons cette dernière extrémité postérieure ou occipitale.

D. Quelle est la structure de la tête du

fætus?

R. La tête du fœtus, comme celle de l'homme, comprend le crâne & la face; mais nous ne parlerons que de la structure du crâne.

Le crâne est cette boîte osseuse qui renferme le cerveau. Il est formé d'un grandl nombre de pièces dans le sœtus, & de huit: seulement dans l'adulte; plusieurs se réunissant, avec le temps, pour n'en faire qu'une: seule.

Ces huit os font le coronal, l'occipital,, les deux pariétaux, les deux temporaux, l'os fphénoïde & l'os ethmoïde,

Sur l'Art des Accouchemens. 125 Ces os se touchent à peine chez le sœtus, & ne sont liés entre eux que par des membranes; de sorte qu'ils peuvent fe croiser ou s'éloigner un peu les uns des autres, felon que la tête est pressée dans un sens ou dans un autre; ce qui lui permet de s'applattir, de s'alonger, & de changer de forme au besoin.

Les endroits où les os du crâne se joignent & se lient entre eux; se nomment sutures; & ceux où aboutissent plusieurs

futures s'appellent fontanelles.

D. Quelles sont les principales sutures qui

se remarquent à la tête du fætus?

R. Ces sutures sont la fagittale, la coronale, la lambdoïde, & celles qui unifsent les os temporaux aux os pariétaux.

La suture sagittale est celle qui règne le long du sommet de la tête: la coronale commence à l'extrémité antérieure de la fagittale, & descend de chaque côté jusqu'aux tempes: la lambdoïde commence de même à l'autre bout de la sagittale, & descend derrière les oreilles.

Les sutures écailleuses, ou temporales s'étendent du bas de la suture coronale au bas de la lambdoïde, en formant un

demi-cercle au-dessus des oreilles.

On remarque une autre future chez le , fœtus, qui monte de la racine du nez jusqu'à la suture sagittale, & qui coupe l'os coronal en deux parties égales : eile

est plus serrée & plus étroite que les précédentes.

D. Combien remarque-t-on de fontanelles

à la tête du fætus?

R. Elles y sont en grand nombre, si l'on prend pour sontanelles tous les endroits où plusieurs sutures semblent se rencontrer; mais nous n'en décrirons que deux, qui sont les plus importantes à connoître.

La plus remarquable se voit à l'endroit où la suture sagittale semble se joindre à la suture coronale, & à celle qui monte de la racine du nez le long du milieu du front. On l'appelle sontanelle antérieure; & elle est connue du vulgaire sous le nom de sontaine de la tête. Cette sontanelle est quelques si grande, qu'on ne peut la couvrir de l'extrémité du pouce. Elle est toujours membraneuse au terme de la naissance, & le crâne ne s'ossisse en cet endroit qu'après quelques années.

La seconde fontanelle que nous avons annoncée, est l'endroit où la suture sa-gittale se joint à la lambdoïde. Pour l'ordinaire, elle est très-petite, & on ne la trouve pas membraneuse comme la première; nous l'appellons fontanelle possé-

rieure.

D. Comment peut-on distinguer ces deux fontanelles l'une de l'autre?

R. Le toucher nous les fait aisément.

Sur l'Art des Accouchemens. 127 distinguer. On trouve à la première un espace membraneux assez étendu, auquel viennent se rendre quatre branches de sutures, & autant d'angles offeux, dont deux appartiennent aux pariétaux, & deux au coronal.

La fontanelle postérieure n'est que le point de réunion de trois branches de sutures, & de trois angles ofseux, dont l'un, qui est le plus alongé, appartient à l'occipital, & les deux autres aux os

pariétaux.

D. Ne trouve-t-on pas quelquefois à la fontanelle postérieure autant de branches de sutures & d'angles osseux, qu'on en remarque

à la fontanelle antérieure?

R. Oui: on y trouve quelquefois quatre branches de futures & quatre angles offeux; mais ce cas est trop rare pour en faire mention. Malgré cette disposition, l'Acconcheur instruit saura toujours distinguer ces deux fontanelles.

D. La fontanelle antérieure n'a-t-elle pas une sorte de pulsation ou battement remarquable au toucher, qui puisse servir à la faire

distinguer de l'autre fontanelle?

R. Ce battement est assez remarquable après la naissance; mais s'il existe avant, on ne sauroit le reconnoître au toucher, & l'Accoucheur, en le recherchant longtemps au moyen du doigt introduit dans le vagin, pourroit s'y tromper, en pre-

nant la pulsation des artères de son doigt pour celle de la sontanelle.

D. Quelles sont les dimensions de la tête

du fœius?

R. Pour déterminer la grosseur de la tête du sœtus, nous y remarquerons quatre diamètres. Le plus grand traverse la face & le crâne obliquement du menton à l'extrémité postérieure de la suture sagittale; il est de cinq pouces & quelques lignes. Le second, qui va du milieu du front au milieu de l'occiput, est de quatre pouces & quelques lignes. Le troissème traverse la tête d'une bosse pariétale à l'autre, audessus des oreilles; & le quatrième, du sommet à la base du crâne. Ces deux diamètres sont pour l'ordinaire de trois pouces cinq à six lignes (a).

D. Quels sont les mouvemens que peut

exécuter la tête du fœtus?

R. Au moyen de la disposition & de la mobilité des vertèbres qui appartiennent au col, & de la manière dont la tête est articulée avec la première de ces ver-

<sup>(</sup>a) Lorsque nous prononcerons le mot de grand diamètre & de petit diamètre de la tête du sœtus, dans la suite de cet ouvrage, nous prévenons que ce sera de celui qui passe du milieu du front à l'occiput, & de celui qui traverse le crâne d'une protubérance pariétale à l'autre, dont il sera question.

fur l'Art des Accouchemens. 129 tèbres, le fœtus peut baisser le menton sur le haut de la poitrine, renverser la tête sur le dos, l'incliner sur l'une & l'autre épaule, & tourner la face vers les côtés, en lui faisant décrire un demi-cercle ou environ. Nous appellerons dans la suite ce dernier mouvement, mouvement de pivot, ou de rotation.

D: Est-il bien nécessaire que l'Accoucheur connoisse la forme, la structure & les dimensions de la tête du fœtus, ainst que les mou-

vemens qu'elle peut exécuter?

R. Ces connoissances sont tellement liées à celles que nous avons établies sur le bassin de la femme, que sans elles ces dernières nous deviendroient inutiles. L'Art des accouchemens n'étant, en esset, que celui d'extraire l'enfant du sein de sa mère, comment donner à la tête la position la plus avantageuse, si l'on ne connoît pas le rapport de ses dimensions avec celles du bassin? Comment changer sa position avantageusement, si on ignore les mouvemens qu'elle peut exécuter? &c.

fœtus, nous voyons qu'elle ne peut traverser aisément le bassin, qu'autant qu'elle s'y engage en présentant une de ses extrémités; savoir l'occipitale, quand elle vient la première; & le menton, quand

on amène l'enfant par les pieds,

2°. D'après la structure du crâve, nous

concevons comment la tête peut passer à travers un bassin un peu resserré; comment, en s'alongeant dans un sens, & ent diminuant dans un autre, elle peut quelquesois s'accommoder à la forme de ces bassin désectueux.

3°. La connoissance des diamètres de la tête nous fait voir comment elle doitt se présenter, soit au détroit supérieur, soit au détroit inférieur, pour passer plus facilement; & de quelle manière on doits

la diriger dans les cas difficiles....

4°. Les mouvemens qu'elle peut exécuter prescrivent des règles aussi salutaires. Connoissant ces mouvemens & leurs; bornes, nous ne craignons pas de faire; rouler la tête sur son axe, de faire parcourir à la face le quart de la circonférence; intérieure du bassin, pour obtenir une position plus avantageuse, &c.

Enfin, toutes ces connoissances nous mettent à même d'expliquer la marche de la tête de l'enfant dans l'accouche-

ment le plus naturel.

D. Quelle est la structure du tronc du

fætus?

R. Le tronc du fœtus est formé d'unit bien plus grand nombre de pièces que la tête; & toutes ces pièces sont liées entre elles, d'une manière bien plus sâche encore que les os du crâne; ce qui fait s qu'elles peuvent éprouver de plus grands fur l'Art des Accouchemens. TTT déplacemens, & que le tronc peut exécuter de plus grands mouvemens, & s'affaisser au point de traverser librement un bassin que la tête ne sauroit franchir (a).

D. Dans quel sens le tronc du fœtus est-il

le plus mobile?

R. Le tronc peut se courber en devant, en arrière & sur les côtés: mais de toutes les courbures qu'il décrit dans ces sortes de flexions, aucune ne peut être ni plus grande, ni moins fatiguante pour l'enfant, que celle qu'il fait en se ployant en devant. Le tronc peut encore exécuter un mou-

Le tronc peut encore executer un mouvement de rotation, dans lequel la colonne épinière est comme légérement torse selon sa longueur. Ce dernier mouvement est, comme tous les autres, plus libre & plus étendu dans le sœtus que dans l'homme; mais il ne peut s'étendre au - delà d'un sixième, ou d'un cinquième de cercle au plus, sans que les ligamens de la colonne épinière n'éprouvent une forte distension, & que la moëlle que renserme cette colonne n'en soit satiguée.

La connoissance de tous ces mouvemens devroit nous engager, 1°. à ramener


<sup>(</sup>a) On s'appercevra fans doute que nous ne parlons ici que de la charpente offeuse du tronc, comme nous n'avons parlé que de celle de la tête.

Principes 132


les extrémités inférieures sur le devant du tronc, & à recourber celui - ci vers sai partie antérieure, toutes les fois que: nous sommes obligés de retourner l'enfant, & de l'extraire par les pieds; 2°. à ne jamais porter les mouvemens de: rotations nécessaires en quelques cas, audelà d'un quart de cercle, fans s'affurer auparavant si la tête, qui est retenue dans: la matrice, exécute le même mouvement, &c. Nous développerons ces règles: de pratique ailleurs.

D. Doit-on avoir les mêmes égards aux mouvemens que peuvent exécuter les extré-mités tant supérieures qu'inférieures?

R. Il faut y donner la même attention qu'aux mouvemens de la tête & du tronc, quandil est question de dégager les pieds & de les amener du fond de la matrice au dehors; ainsi que dans l'abaissement des bras, lorsque les épaules sont parvenues à la vulve, pour ne pas l'uxer ou fracturer ces extrémités. Nous ne décrirons pas ces mouvemens; il suffira de les saire remarquer une seule fois à la Sage-semme, pour lui en donner une bonne idée; & de lui faire saire l'application de ces connoissances à la pratique des accouchemens, pour lui en faire sentir toute l'importance.



D



## EXPLICATION

# DE LA PLANCHE VI.

#### FIGURE L

Cette figure représente la tête du fœtus séparée du corps.

A. Le menton.

B. L'extrémité occipitale.

A B. Diamètre oblique de la tête, & le le plus grand de tous ses diamètres.

CC. Diamètre antéro-postérieur, appellé dans la suite de l'ouvrage grand diamètre.

DD. Diamètre perpendiculaire, qui va du sommet à la base du crâne.

#### FIGURE II.

Cette figure représente le sommet de la tête.

A. Le haut du front.

B. Le haut de l'occiput.

CC. Diamètre antéro-postérieur.

DD. Diamètre transversal, ou petit diamètre.

E. La fontanelle antérieure,

F34 Principes

F. La fontanelle postérieure.

G. La future fagittale. HH. La future coronale.

I. La suture qui descend de la sontanelle: antérieure à la racine du nez.

KK. La suture lambdoïde.

the one framework for the contract of the cont

# CHAPITRE V.

Du placenta, du cordon ombilical, des membranes du fœtus & des eaux.

## SECTION PREMIÈRE.

## Du placenta.

D. Qu'est-ce que le placenta?

R. Le placenta, qu'on connoît également sous le nom de délivre ou d'arrière-faix, est un corps spongieux & vasculeux, assez semblable, par sa forme, à un gâteau un peu applati, de six à huit pouces de largeur, & d'un pouce d'épais-

seur ou environ dans son milieu (a).

<sup>(</sup>a) Nous avons vu un placenta dont la figure ressembloit à celle d'un croissant : plusieurs sois nous en avons trouvé deux, mais beaucoup pluspetits, pour un seul ensant : ils étoiens à quelque distance l'un de l'autre.

Sur l'Art des Accouchemens. 135 D. Faites-nous la description du placenta.

R. On considère deux faces au placenta, une externe, par laquelle il est lié à la matrice, & une interne, qui regarde l'enfant.

La face externe est convexe, & assez unie, quand le placenta n'a été ni tiraillé ni déchiré; mais on y découvre des sillons prosonds, & des espèces de lobes assez gros, lorsque ce corps a été détaché & extrait avec essort. Ces lobes sont liés entre eux dans l'état naturel, & les sillons qui les séparent extérieurement sont très-superficiels, & recouverts d'une membrane sort mince.

On découvre à la furface externe du placenta des ouvertures qui correspondent à l'embouchure des sinus utérins; & l'on remarque, en séparant ce corps de la matrice, qu'il n'y est attaché qu'au moyen

d'un tissu cellulaire très fin.

La face interne du placenta est concave & recouverte des membranes; on y
voit un grand nombre d'artères & de
veines, qui s'étendent en manière de rayons
d'un point de cette surface vers ceux de
la circonférence: ce sont les branches des
vaisseaux ombilicaux. Ces artères & ces
veines, en se distribuant ainsi, jettent çà
& là des ramissications très-déliées, qui
se plongent dans la substance même du
placenta; où elles yont elles mêmes se ter-

miner, après s'être subdivisées à l'infini; D. A quelle partie de la matrice s'attache

le plus communément le placenta?

R. Plusieurs Auteurs pensent qu'il s'attache presque toujours au fond de ce viscère; quoiqu'il le fasse bien plus souvent à la partie antérieure, à la partie postérieure, ou à l'un des côtés; tantôt plus près du fond, & tantôt plus près du col. Îl peut s'attacher indistinctement à toutes les régions de la furface interne de la matrice; même sur le col & de manière qu'il en recouvre l'orifice, ce qui est alors constamment fâcheux pour la mère & pour l'enfant.

D. Peut-on juger, d'après quelques signes extérieurs, du lieu où est attaché le placenta?

R. Non; si ce n'est lorsque le placenta

adhère à la partie antérieure de la matrice, ou quand il se trouve attaché sur le col, & qu'il en recouvre l'orifice. On le reconnoît dans le premier cas, en palpant le ventre de la femme; & dans le fecond, en introduisant le doigt dans l'orifice de la matrice : mais on ne peut en juger dans tous les autres.

D. Peut-on déterminer, en examinant le placenta, le lieu qu'il occupoit dans la ma-

trice?

R. Si l'on ne peut déterminer au juste, dans tous les cas, la région que le placenta occupoit, du moins peut - on évaluer à fur l'Art des Accouchemens. 137 quelle distance il étoit du col de la matrice.

On peut assurer qu'il étoit attaché au fond de ce viscère, quand l'ouverture qui s'est faite aux membranes pour la sortie des eaux & de l'enfant, se trouve directement vis-à-vis le milieu de cette masse, & également éloignée de tous les points de son bord.

Quand cette ouverture se trouve près le bord du placenta, on peut assurer de même qu'il étoit attaché dans le voisi-

nage de l'orifice de la matrice, &c.

## SECTION II.

Du cordon ombilical,

D. FAITES-NOUS la description du cordon ombilical.

R. Le cordon ombilical est cette espèce de corde qui s'étend de l'ombilic de l'enfant à la surface interne du placenta.

Il est formé de deux artères, & d'une veine assez grosse, qu'on nomme ombilicales. Ces trois vaisseaux rampent les uns autour des autres, à-peu-près comme les brins d'osser qui forment l'anse d'un panier; & ils sont enveloppés étroitement par les membranes du sœtus, qui servent comme de tégumens au cordon.

D. Dites-nous quelle est l'origine des vais-

138 Principes

feaux qui forment le cordon, & où ils vonce
fe terminer.

R. Les artères ombilicales font la constinuation des artères iliaques du fœtus, c'est-à-dire, de ces deux artères qui résultent de la bisurcation de l'aorte inférieure. Elles montent dans le tissu cellulaire du péritoine, derrière & à côté de la vessie, jusqu'à l'ombilic, où elles se joignent & s'adossent l'une à l'autre, ainsi qu'avec la veine. Parvenues au placenta, ces artères se divisent en plusieurs branches, & celles ci en de beaucoup plus petites, qui vont se perdre dans les cellules du placentamême. On assure cependant qu'une partie de ces vaisseaux traverse cette masse, pour se rendre dans les sinus de la matrice.

La veine ombilicale femble prendres naissance dans le placenta même, par un nombre infini de ramifications; d'où elles se porte vers l'enfant. Ayant traversé l'ome bilic, elle s'écarte des deux artères, & va se rendre dans le sinus de la veine-

porte, au-dessous du foie.

D. La veine ombilicale va-t-elle toujours!

se rendre en entier dans le sinus de la veine-

porte?

R. Non: il arrive quelquesois qu'elle se divise en deux branches, dont l'une se rend dans le sinus de la veine-porte, & l'autre dans la veine-cave inférieure; cette dernière branche s'appelle canal veineux,

fur l'Art des Accouchemens. 139 Le plus souvent ce canal naît du sinus de la veine-porte même, & va se terminer la veine-cave.

D. Ne trouve-t-on que ces trois vaisseaux

Mans le cordon ombilical?

R. On ne trouve réellement que ces trois vaisseaux dans le cordon du sœtus humain; nais dans la plupart des brutes, il en est un quatrième, qu'on appelle ouraque. Ce lernier, chez l'homme, n'est qu'une espèce de ligament qui monte du sommet le la vessie jusqu'à l'ombilic, où il se ermine.

D. Quelle est la longueur & la grosseur

lu cordon ombilical?

R. La longueur du cordon est ordinaiement de vingt à vingt-quatre pouces; Le sa grosseur à-peu-pres semblable à celle lu petit doigt; mais l'une & l'autre préentent souvent de grandes différences.

On a vu des cordons qui n'étoient que de huit à dix pouces de longueur, d'autres de quarante, quarante huit pouces à au-delà. Il en est de très-grêles, & de peaucoup plus gros; mais on remarque que cette grosseur extraordinaire n'est pas a même dans toute la longueur du cordon, & qu'elle provient d'une humeur glaireuse infiltrée dans le tissu cellulaire.

D. Que peut-il réfulter de toutes ces variétés, tant dans la longueur, que dans la

grosseur du cordon?

R. Le cordon qui a beaucoup de longueur, peut s'entortiller sur le col de l'enfant, & y former plusieurs circulaires; ainsi que sur l'une ou l'autre des extrémités. Ce cordon peut encore se nouer, même plusieurs sois (a); mais il ne saut pas consondre ces nœuds avec certains replis que décrit souvent la veine ombilicale, & dont le nombre, dans l'opinion du commun des semmes, fait connoître celui des ensans qu'elles doivent avoir.

Le cordon qui est très-court ne sauroit: se nouer, ni se contourner sur le coll de l'enfant comme le précédent; mais ill peut être tiraillé & distendu à mesure: que l'enfant se dégage de la matrice, pendant l'accouchement; ce qui donne lieu alors au décollement du placenta. Le cordon qui est très-grêle, de même que celui qui est très-gros & infiltré, ne peuvent supporter communément les efforts qu'on exerce dessus pour opérer la déli-

<sup>(</sup>a) Nous conservons un cordon noué jusqu'à trois sois sur lui-même, & dans le même endroit. Ces trois nœuds sorment une espèce de natte ou d'entrelacement difficile à expliquer. Le cordon sormoit de plus deux circulaires sur le col de l'ensant: cet ensant étoit robuste & des nueux portant.

fur l'Art des Accouchemens. 141 vrance; & il ne faut s'en fervir alors

qu'avec ménagement.

D. L'entortillement du cordon sur le col de l'enfant & les nœuds dont vous venez de parler peuvent-ils influer sur sa vie ou sur

la facilité de l'accouchement?

R. Tant que l'enfant est dans le sein de sa mère, il n'a rien à redouter des circulaires que forme le cordon autour du col; & ces circulaires ne sauroient s'opposer davantage à la sortie de la tête, ni la rendre plus difficile, quoique la plupart des Accoucheurs l'aient publié. Mais lorsque la tête est dehors, ces circulaires peuvent se serrer assez pour donner lieu à la boussissiure & à la lividité de la face; sur tout lorsqu'on tire dessus la tête pour extraire le corps. Il faut alors désaire une de ces circulaires, ou couper le cordon, comme nous le dirons dans la suite.

Quant aux nœuds qui se forment au cordon, ils ne peuvent porter aucune atteinte à la vie de l'enfant, ni pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement. Si l'on a remarqué ces nœuds sur le cordon d'un enfant qui est venu mort, cet accident dépendoit d'une autre cause. D. Le cordon ambilical s'include.

D. Le cordon ombilical s'insère-t-il toujours au milieu de la face interne du placenta?

R. Non: s'il paroît s'inférer le plus fouvent au milieu du placenta, quelquefois il femble fortir du bord de cette masse, La forme du placenta ressemblant alors et quelque sorte à celle d'une raquette, or le nomme placenta en raquette.

## SECTION III.

Des membranes du foctus.

D. QUELLES sont les membranes qui enve-

loppent le fœtus?

R. Le fœtus n'est enveloppé que de deux membranes, dont l'une se nomme chorion, & l'autre amnios.

D. Qu'est-ce que le chorion?

R. C'est une membrane assez épaisse & molle, composée de plusieurs lames des tissu cellulaire, appliquées étroitement les unes sur les autres, si ce n'est vers le borde du placenta, où cette membrane paroît plus celluleuse.

Le chorion est adhérent à la matrice dans toute son étendue, excepté dans le

lieu où est attaché le placenta.

L'adhérence de cette membrane à la matrice se détruit aisément; mais elle est si intimément liée au placenta, dont elle recouvre la face interne, qu'on ne sauroit l'en séparer.

D. Qu'est-ce que l'amnios?

R. C'est une seconde membrane pluss mince & plus transparente que le chorion, à laquelle elle sert comme de dou-

sur l'Art des Accouchemens. 143 blure, qui y est liée par un tissu cellulaire très-fin.

Ces deux membranes forment une efpèce de fac, ou de coque ovoide, qui contient les eaux & le fœtus.

D. Les membranes du fœtus ne sont-elles

qu'au nombre de deux?

R. On peut assurer qu'il n'y a que le chorion & l'amnios dans l'espèce humaine; & que la troisième membrane appellée allantoïde, qui se trouve dans presque tous les animaux, n'existe pas chez l'homme, quoique plusieurs Anatomistes disent l'avoir préparée quelquefois.

D. Le chorion & l'amnios sont-ils toujours d'un tissu également fort & également

Gerré?

R. Non: ces membranes font quelquefois si denses & si serrées, qu'elles réfiftent long - temps aux efforts naturels de l'accouchement. D'autres fois elles sont fi minces & fi délicates, qu'elles fe déchirent dès les premières douleurs, & laissent échapper de trop bonne heure les leaux qu'elles contiennent.

Si elles résistent trop aux contractions de la matrice dans le premier cas, le travail de accouchement en devient plus long, & la sortie de l'enfant en est retardée, même

empêchée.

Si elles se déchirent de trop bonne heure alans le dernier cas, & laissent échapper les eaux avant que l'orifice de la matrice ne soit bien ouvert, les progrès du travail en font encore retardés, & il em devient également plus long & plus douloureux; c'est alors qu'on a coutume de dire que l'accouchement se fait à sec.

Lorsque les membranes sont aussi minces, non-seulement elles ne peuvent réfister aux premières contractions de la matrice, & elles se déchirent dès les premières douleurs de l'accouchement; mais encores il arrive fouvent qu'elles s'ouvrent avant la fin de la grossesse, sans qu'aucun effort de . la femme ait pu y contribuer, de sorte que l'accouchement en est la suite & se faitt prématurément.

# SECTION IV.

Des eaux de l'amnios.

D. QUELLE est la nature des eaux que: contiennent les membranes?

R. Ces eaux sont communément assezclaires, un peu grasses au toucher, &: d'une odeur un peu fade, ou nauséabonde.

Quelquefois elles sont d'une couleur pâle, d'autres fois verdâtre ou jaunâtre, tantôt roussâtre ou blanchâtre, mêmes comme bourbeuse, & d'une odeur tétide.

Jur l'Art des Accouchemens. 145. D. Quelle est la quantité de ces eaux?

R. Le volume d'eau que contiennent les membranes n'est pas le même chez toutes les semmes. Souvent il n'en existe pas une chopine (une livre); & d'autres fois il s'en trouve une pinte (deux livres);

& même plus.

La quantité de ce fluide, relativement au volume de l'enfant, est toujours bien plus grande dans les deux ou trois premiers mois de la grossesse, que vers la fin: ce qui fait que les mouvemens de l'enfant sont bien moins libres dans ces derniers temps qu'au commencement.

D. Quelle est la source des eaux de

l'amnios?

R. Ces eaux découlent en manière de rosée, de la surface interne de l'amnios, & paroissent venir des vaisseaux de la matrice & de ceux du placenta. On est aussi dans l'opinion qu'elles transudent de la surface de l'enfant; mais cette opinion n'est pas vraisemblable.

D. Les eaux qui s'écoulent pendant le travail de l'accouchement ne viennent-elles que

du sac que forme l'amnios?

R. Plusieurs auteurs ont pensé qu'indépendamment des eaux qui viennent de l'amnios même, il pouvoit en exister dans la duplicature des membranes, c'est-à-dire entre le chorion & l'amnios: ils ont donné à ces dernières le nom de fausses eaux;

6

146 Principes


& ils ont appellé vraies éaux; celles qui for contenues dans l'amnios, & qui mouillem la furface même de l'enfant.

S'il s'est trouvé des eaux amassées entre le chorion & l'amnios, on peut assure:

que ce cas est infiniment rare.

D. Quels sont les usages des eaux de l'amnios?

R. On pense assez généralement 1° qu'une partie de ces eaux est employée à la nourriture du sœtus, & sur-tout dans les premiers temps de sa formation, oi il ne paroît se nourrir que par l'absorp tion du fluide dans lequel il nage en quel que sorte; 2°. que ces eaux sont un des ins trumens que la nature emploie pour opére: la dilatation de la matrice ; 3° qu'elles rendent les mouvemens de l'enfant moin fatiguans pour la mère, en diminuant l'impression qu'il exerceroit alors su la matrice; 4° qu'elles favorisent ce mêmes mouvemens, & modèrent l'effedes coups qui pourroient affecter l'enfant! 5°. qu'elles servent à la dilatation de l'ori fice de la matrice dans le moment de l'accouchement, ainsi qu'à humecter & à lubri sier les parties qui constituent le passage.





# EXPLICATION

# DE LA PLANCHE VII.

#### FIGURE I.

Cette Figure représente l'arrière-faix;

AA. Le placenta.

BBB. Les vaisseaux du placenta, ou les divisions des artères & de la veine ombilicales.

.CCC. Les membranes du fœtus.

DD. Le cordon ombilical.

#### FIGURE IL

Cette figure représente l'arrière-faix, tel qu'on le trouve le plus souvent dans le cas où .. il y a deux enfans.

AA. Le placenta.

BBB. Les membranes.

CC. La cloison formée par la membrane amnios de l'un & l'autre enfans: cette cloison est reployée sur ellemême.

DD. Les cordons ombilicaux.

E. L'espèce 'de nœud que le cordon forme quelquefois quand il est très-long,

G ij

### SECTION V.

De la nutrition du fœtus & de ses dépendances.

D. DE quelle nature sont les fluides qui servent au développement, à la nutrition & à la perfection du fœtus?

R. Ces fluides ne sont pas d'une nature: différente de ceux qui servent journellement à réparer les pertes qu'éprouvents chacune des parties de l'ensant après sai naissance, & qui sont employés à l'accroissement & à la persection de ces mêmess parties : ce sont des sucs lymphatiques, convenablement élaborés par les organess de la mère.

D. Comment ces sucs parviennent - ils à: L'enfant?

R. Les opinions sont encore bien partagées sur ce point. Quelques Auteurs prétendent que le sœtus absorbe une partie de ces sucs par tous les points de sa surface; d'autres, qu'il les reçoit par la bouche & les avale, comme nous usons des alimens. Mais la plupart soutiennent que ces sucs sont puisés dans les vaisseaux de la matrice par les nombreuses ramissications de la veine ombilicale, ou dans le placenta même, dans lequel ces vaisseaux utérins

sur l'Art des Accouchemens. 149 versent beaucoup de sang, ce qui est bien mieux démontré.

D. Les veines du placenta ne puisent elles dans le sang de la mère que des sucs blancs & lymphatiques?

R. On pourroit croire qu'elles n'absorbent que de pareils fucs dans les premières femaines de la grossesse, parce que ces veines font alors excessivement petites, & que le germe ne présente encore que des fluides de cette espèce; mais dans la fuite elles puisent le sang même qui contient ces sucs nutritifs, de sorte qu'il s'en fait alors une circulation de la mère au fœtus, & du fœtus à la mère.

D. Indiquez - nous comment se sait cette circulation.

Si

es :

110

160 ie,

011-

que

1119

R. Une partie du sang de la mère étant versée par les finus de la matrice dans les petites cavités du placenta qui y correspondent, y est puisée par les nombreuses ramifications de la veine ombilicale, & transmise dans la veine-porte du fœtus. Ce fang, chargé de parties nutritives mêlé dans le finus de la veine-porte avec celui que cette veine reçoit d'ailleurs passe dans la veine - cave inférieure, au moyen du canal veineux & des veines de p hépatiques, pour être transporté, conjointement avec le sang qui revient de tout le bas-ventre & des extrémités inférieures,

dans l'oreillette gauche du cœur (a); tandis que la veine-cave supérieure verse dans l'oreillette droite celui qu'elle rapporte de la tête & des extrémités supérieures.

Le sang de l'oreillette droite du cœur passe aussi-tôt dans le ventricule du même côté, qui le chasse à son tour dans l'artère pulmonaire; dont la principale branche, connue sous le nom de canal artériel, se rend dans l'aorte inférieure. Une partie de ce sang distribué dans le poumon par l'action du ventricule droit, se rend à l'oreillette gauche du cœur par les veines pulmonaires; & l'autre partie, qui est la plus considérable, est transmise dans l'aorte inférieure, où il se mêle à celui qui y est pousse par l'action du ventricule gauche.

poussé par l'action du ventricule gauche. L'oreillette gauche, qui reçoit le sang de la veine-cave inférieure & des veines; pulmonaires, le transmet dans le ventrique gauche, dont la fonction est de les distribuer, sans exception, à toutes les parties du corps, même au poumon; tant au moyen de l'aorte supérieure, qu'aux

moyen de l'aorte inférieure.

Le sang de l'aorte inférieure, dans le:

<sup>(</sup>o) Ce fang pénètre dans l'oreillette gauches au moyen du trou de Botal: ouverture qui se remarque à la cloison qui sépare cette oreillette d'avec la droite.

fœtus, se distribue bien au-delà du cercle qu'il décrit dans l'homme. Une grande partie est transmise par les artères ombilicales, jusques dans les cavités du placenta, qui sont aurant de sinus, où il se mêle de nouveau avec le sang de la mère, pour réparer les pertes qu'il a faites, y puiser d'autres sucs nutritis, & subir de nouvelles préparations.

D. La circulation du sang, chez l'enfant; éprouve-t-elle quelques changemens remarqua-bles, soit pendant le travail de l'accouchement, soit à l'instant de la naissance?

1

1

•

29

315

R. Il feroit trop long d'expliquer tout ce qui se passe à cet égard dans le cours du travail de l'accouchement, même le plus ordinaire; nous nous contenterons d'en déduire par la suite quelques règles de pratique, foit relativement aux pertes de sang chez la femme, soit relativement aux premiers secours que nous devons à l'enfant, suivant l'état où il se trouve en naissant. Nous remarquerons seulementici le plus frappant de tous les phénomènes que nous passons sous silence. Dès que l'enfant est né, & qu'il respire librement, la circulation cesse dans les vaisseaux ombilicaux; & les artères coupées à quelques travers de doigt du ventre de l'enfant, ne laissent échapper que quelques gouttes de fang de loin en loin après le premier jet qui suit leur section. Quand la respi-

G iv

Principes Principes

ration s'établit difficilement, ou quandi elle ne peut s'établir à l'instant de la naiffance, le sang continue de passer dans less artères du cordon; elles en versent beaucoup, si on coupe ce cordon, & l'ensant! pourroit en perdre assez pour mourir, sii on ne le lioit exactement.

## CHAPITRE VI.

De l'accouchement naturel en générall & de ses différences.

D. Qu'EST-CE que l'accouchement naturel? R. L'accouchement naturel est celuil qui s'opère par les seules sorces de la femme, quelle que soit la manière dont l'en fant se présente à l'orifice de la matrice.

D. Quelles sont les différences que présente cette espèce générale d'accouchement?

R. Ces différences se déduisent de la partie que l'ensant présente à l'orisice de la matrice; de la manière dont cette: même partie se présente; & des obstacles; qui s'opposent à la sortie de l'ensant, out qui la rendent plus ou moins difficile.

D. Indiquez - nous les conditions requises: pour que l'accouchement se sasse naturellement.

R. Pour que l'accouchement se fasse: naturellement, il est nécessaire, 1° que la

femme ait des forces suffisantes; 2° qu'elle n'éprouve aucun des accidens dont nous parlerons dans la suite, comme perte abondante, convulsions, &c.; 3° que le bassin soit bien conformé, & d'une grandeur relative à la grosseur de l'ensant; 4° que les parties molles qui forment le passage puissent se développer & se dilater convenablement; 5° que l'obliquité de la matrice, si elle existe, ne soit pas excessive; 6° que l'ensant présente le sommet de la tête, les pieds, les genoux, ou les sesses à l'orisice de la matrice; ensin, que la grosseur de cet ensant n'excède pas la largeur du bassin.

D. A quels signes reconnoîtra-t-on, des les premiers temps du travail, que l'accouchement qui doit s'opérer par les seules forces de la semme, se sera facilement ou avec

difficulté?

R. L'accouchement naturel se fera aisément & en peu de temps, 1°. si les douleurs se succèdent rapidement & avec sorces; 2°. si le col de la matrice est souple au toucher, s'il est humide, s'il a peu d'épaisseur, & s'il se dilate facilement; 3°. si le bassin est bien conformé, si les parties extérieures de la génération sont dans un état aussi favorable à la dilatation que l'orisice même de la matrice; ensin, si le sommet de la tête se présente dans une bonne position.

G W

154 Principes

L'accouchement, quoique naturel, sera plus long & plus difficile, si quelques-unes des conditions énoncées viennent à manquer.

D. Quel est en général le temps que la na-

ture emploie pour opérer l'accouchement?

R. On ne peut fixer d'une manière précise la durée du travail nécessaire pour l'accouchement. Il est des semmes chez lesquelles ce travail se soutient au plus une heure; tandis que chez d'autres il se prolonge au-delà de vingt-quatre heures : en général, sa durée n'est guère moins des

cing à six heures.

Nous observerons, toutes choses étant: égales du côté de la conformation du bassin de la femme, de la position & de la grosseur de l'ensant, que le premier accouchement est plus long & plus dissincile que les accouchemens subséquens : ce qui vient de ce que le col de la matrice & les parties extérieures de la génération se développent plus dissicilement alors, que dans la suite.



## SECTION PREMIÈRE.

Des causes de l'accouchement en général, & particuliérement de l'accouchement naturel.

D. Quelles sont les causes de l'accou-

R. Tout ce qui peut exciter la contraction de la matrice, entretenir cette action, & provoquer la fortie de l'enfant, doit être regardé comme cause de l'accouchement.

D. Quelles sont les causes qui peuvent exciter la matrice à se contracter & à redoubler

ses efforts pour expulser l'enfant?

R. Les causes qui peuvent exciter la matrice à exercer de pareils efforts, font en grand nombre : on pourroit en distinguer de naturelles & d'accidentelles. Les premières paroissent agir constamment de la même manière, & au même terme de la grossesse, ou à quelques jours près: elles entrent dans le plan de la nature. Les autres peuvent agir indistinctement dans tous les temps de la groffesse, & provoquer l'avortement. On peut rapporter à ces causes accidentelles les grandes. passions de l'ame, certaines maladies de la matrice, ou de fes dépendances, les coups, les chûtes, &c. comme nous l'expliquerons en traitant de l'avortement. 156 Principes

D. Quelles sont les causes qui excitent st. constamment les essonts de l'accouchement, ou les contractions de la matrice, vers la sin

du neuvième mois de la grossesse?

R. L'opinion des auteurs a été long-temps partagée sur ce point, & l'est en-core. Les uns ont pensé que l'ensant nes pouvoit séjourner au-delà de neus moiss dans le sein de sa mère sans y manquer: de nourriture, ou fans y éprouver le besoin de respirer; & que dans l'état de: gêne où il se trouvoit à cet égard, ill sollicitoit vivement la matrice à se contracter & à l'expulser; comme le poulet: au terme de sa maturité rompt la coque! de l'œuf pour s'en dégager. D'autres ont imaginé que le poids du méconium qui remplit les gros intestins à ce terme, &:
l'irritation qu'il exerce alors sur ces intestins, invitoient l'enfant à faire de plus grands mouvemens, & à exciter les contractions de la matrice.... Mais ces diverses opinions ne sont nullement fondées; car la matrice n'est pas moins sollicitée à expulser l'enfant qui est mort depuis quelque temps, que celui qui est vivant, quoiqu'aucune de ces causes ne puissent agir fur lui.

On doit rechercher la cause déterminante des contractions de la matrice, ou du travail de l'accouchement, dans l'état où est la matrice même vers la fin du neuvième mois de la groffesse. Ces essorts paroissent une suite naturelle du développement complet de toutes les parties de la matrice, & notamment de son col, qui devient alors la partie la plus soible; de la distension & du tiraillement qu'éprouvent toutes les sibres de ce viscère; de la sensibilité & de l'irritabilité dont elles jouissent éminemment dans cet état de distension, &c. Ce sentiment, quoique bien mieux sondé que le précédent, n'est pas encore sans replique; on peut de même lui opposer de grandes objections.

D. Quelles sont les puissances qui opèrent

l'accouchement?

R. Dans l'ordre naturel, ce sont la matrice, les muscles abdominaux, & le diaphragme; ainsi que d'autres muscles, dont on ne pourroit expliquer ici la manière d'agir, sans entrer dans de grands détails. Dans les accouchemens contre nature, & dans ceux qu'on appelle laborieux, la main de l'Accoucheur, tantôt seule, tantôt armée d'instrument, est la puissance qui opère & qui devient la plus nécessaire.

D. Comment la matrice peut - elle opérer

l'expulsion de l'enfant?

R. Pour expliquer cet effet, il faudroit fe rappeller ici la structure & la situation de la matrice au temps de l'accouchement, ainsi que tout ce qui a été dit ailleurs de l'action dont elle jouit alors. Dans cette

action, qu'on appelle contraction, sa matrice se resserre, diminue de capacité, & presse de toutes parts l'ensant & ses dépendances. Le col de la matrice, plus soible que les autres parties de ce viscère, supporte alors non-seulement presque tout l'essort qu'elle exerce, mais encore celui des autres puissances dont nous parserons bientôt. L'orisice s'entre-ouvre de plus en plus à chaque essort, & les membranes chargées des eaux s'y engageant dans la suite en manière de coin, achèvent de le dilater.

La tête de l'enfant, après l'écoulement des eaux, succédant à cette espèce de coin, s'avance de même dans l'orifice de la matrice, & le traverse à mesure que les efforts de l'accouchement se multiplient. Ces efforts ensin ne discontinuent qu'autant que la matrice a complétement évacué ce qu'elle contenoit; car après la sortie de l'enfant, le même travail recommence pour l'expulsion du placenta & du sang.

La matrice, en se contractant, se vuide à la manière d'une bourse qu'on presseroit extérieurement de toutes parts, en dirigeant l'essort de son sond à son ou-

verture.

D. La matrice scule, par ses contractions redoublées, peut-elle opérer l'accouchement?

R. On ne trouveroit peut-être pas un exemple bien constaté, qui tende à prouver que l'accouchement puisse s'opérer par

l'action seule de la matrice; & la nécessité de quelques puissances accessoires se maniseste tous les jours, même dans l'accouchement le plus facile. Est - il une seule semme, en estet, qui ne pousse fortement en en bas, comme si elle vouloit aller à la garde-robe, dès qu'elle se sent vivement affectée par la douleur de l'accouchement? Ces essorts, le plus souvent involontaires vers la fin du travail, dénotent évidemment une action étrangère à la matrice.

D. D'où proviennent ces efforts, que vous regardez comme étrangers à l'action de la ma-

trice?

R. Ils dépendent de la contraction de tous les muscles qui forment l'enceinte du bas-ventre, du diaphragme, de quelquesuns des muscles de la respiration, même des extrémités tant supérieures qu'insérieures.

D. Comment toutes ces puissances contri-

buent-elles à l'accouchement?

R. Les unes, comme les muscles de la respiration & ceux des extrémités à n'y contribuent qu'indirectement, & en prêtant, pour ainsi dire, un point d'appui aux autres puissances, soit en fixant la poitrine, & en la maintenant dans un état de dilatation, soit en retenant le bassin, & en l'empêchant d'obéir à l'actions des muscles du bas-ventre. Ces derniers productions des muscles du bas-ventre.

ainsi que le diaphragme, agissent en resferrant la cavité du ventre de toutes parts, en pressant sortement les viscères qu'elle renserme; & notamment la matrice, qui osser alors le plus de volume & le pluss de surface, & sur laquelle ils agissent presque par-tout immédiatement.

D. Qu'observe-t-on pendant ces efforts?

R. On observe alors chez la femme, les mêmes effets qu'on éprouve soi - même en allant à la garde-robe, dans l'étati de constipation; & de plus ce qui est relatif à l'accouchement. Pendant ces efforts, les vaisseaux du visage & du coll fe gonflent, les joues se colorent, & la femme ressent une pesanteur douloureuses à la tête; elle rend contre fa volonté fess urines & fes excrémens, quand la vessie & les gros intestins en contiennent; enfini l'enfant s'engage & s'avance bien plus que si la femme n'exerçoit aucun de ces efforts.. Lui recommander de faire valoir ses douleurs, c'est l'exciter à ces efforts; lui reprocher de perdre ses douleurs, c'est iui faire: sentir la nécessité de ces mêmes efforts, & l'engager à les foutenir.

D. D'après cette théorie, l'enfant ne pavoîtroit contribuer en rien à l'accouchement; ne feroit-il, de son côté, aucun effort pour

fortir?

R. Si le peuple se persuade que l'ensant de s'aide dans l'accouchement; & y contribue

par ses efforts, l'Accouchemens. 16 a adopter cette opinion. L'enfant est passif dans cette opération, & ne peut pas plus accélérer sa sortie, que ne le feroit un corps solide inanimé, & du même volume, qui seroit rensermé dans la matrice.

La sortie d'un enfant mort, celle du placenta, ou d'une môle, s'opère de la même manière que la sortie d'un enfant vivant & bien portant; quoique ces corps

n'exercent aucuns efforts.

D. C'est donc à tort que tant de semmes redoutent d'accoucher d'un enfant mors, ou

d'une môle, &c.?

R. La crainte, où elles sont à cette occasion, n'est nullement sondée; elle naît de cette sausse opinion que nous venons de résuter; c'est-à-dire, de la persuasion où sont ces semmes, que les efforts de l'ensant sont nécessaires à l'accouchement.

## SECTION II.

Des signes de l'accouchement.

D. QUELS sont les signes qui annoncent que le travail de l'accouchement commence?

R. Les femmes ne reconnoissent d'autres signes du travail de l'accouchement, que la douleur qu'elles éprouvent avec tension, dureté & ressertement de tout le bas-ventre.

162 Principes

Cette douleur commence le plus fouvent vers les reins, & semble se propagers en devant en manière de ceinture, pour: se terminer tantôt vers le pubis, & tantôt vers un autre point. Quelquefois elle paroît affecter le devant du bas-ventre, &: va se perdre du côté des reins, ou audessus du fondement.

Toutes ces douleurs dépendent des contractions de la matrice; elles se répètents à chacune de ces mêmes contractions; elles laissent des intervalles marqués; elles font si foibles dans les premiers temps, que: les femmes y font peu d'attention, qu'elles: ne les regardent que comme autant de: douleurs préparantes à l'accouchement, &: ne les défignent que sous le nom de mou. ches. Elles deviennent plus fréquentes, plus longues & plus fortes dans la suite, & se font sentir spécialement au - dessus. du fondement.

La femme préfère ces dernières douleurs à celles qui se perdent vers les lom. bes, & qu'elles appellent douleurs de reins. Si elles sont plus longues, elles laissent à leur suite un calme plus parfait, & elles accélèrent davantage l'accouchement. Les douleurs de reins sont plus fatiguantes, & elles avancent moins le travail.

D. Devons-nous prononcer que la semme est en travail, toutes les fois qu'elle éprouve

de pareilles douleurs?

fur l'Art des Accouchemens. 163 R. Nous ne le pouvons faire d'après

R. Nous ne le pouvons faire d'après l'exposé de la femme, sans craindre de nous tromper; parce qu'elle peut éprouver des douleurs étrangères à l'accouchement.

Ce n'est que d'après le toucher que nous devons prononcer; & dans ce cas, comme en bien d'autres, l'Accoucheur ne sauroit avoir de guide plus certain.

Quand les douleurs font celles de l'enfantement, on remarque que le bord de
l'orifice de la matrice se durcit pendant
qu'elles ont lieu, que les membranes se
tendent, & que la tête de l'enfant, si c'est
elle quise présente, semble s'éloigner. Lorsque ces douleurs cessent, le col de la matrice se relâche, les membranes deviennent slasques, & la tête de l'enfant se
rapproche. Le corps de la matrice éprouve
les mêmes changemens; il se durcit pendant la douleur, & redevient aussi souple
ensuite qu'il l'étoit auparavant.

On n'observe aucun de ces symptomes lorsque les douleurs sont étrangères à l'accouchement; le col de la matrice, & les membranes qui sont sur l'orifice, ne passent point alternativement de cet état de tenssion, au relâchement dont nous avons parlé.

D. Peut-on assurer, d'après les signes que vous venez de décrire, que la semme est vénitablement en travail, & que l'accouchement en sera la suite?

R. Le travail de l'enfantement a lieu

toutes les fois que de pareils symptomes proviennent des douleurs; parce qu'i ne consiste que dans la récidive des contractions de la matrice, & que ces symptomes les dénotent exclusivement Mais ce même travail peut être prématuré, il peut être l'effet d'une cause acci dentelle, & il pourra cesser, si on administre à la semme les soins qu'il exige avant de prononcer que l'accouchement en sera la suite, on doit faire attention au terme de la grossesse, & à tout ce qua précédé les douleurs (a).

D. Quels sont les signes qui dénotent les

progrès du travail?

R. Dans les progrès du travail, les douleurs deviennent plus fortes, plus longues & plus fréquentes; l'orifice de la matrice s'élargit, & son bord s'émincit; les humeurs muqueuses qui humectent le vagin prennent souvent une teinte rougeâtre, que la semme regarde comme un signe favorable; les membranes se tendent davantage pendant la douleur, & sorment à l'orifice de la matrice une sorte de tumeur proportionnée à sa dilatation; elles s'engagent dans la suite à travers cet orifice, & s'avancent dans le vagin, jusqu'à

<sup>(</sup>a) Voyez à l'article du toucher, les fignes caractéristiques des derniers temps de la grossesse, & couxs qui annoncent les approches de l'accouchement,

fur l'Art des Accouchemens. 165 ce qu'elles se déchirent, & que les eaux s'évacuent.

On est dans l'usage de dire que la poche des eaux est bien formée, quand les membranes tortement tendues pendant la douleur, décrivent à travers l'orifice de la matrice une tumeur semblable à la moitié d'une boule.

D. Les membranes forment - elles toujours

une tumeur de cette espèce?

R. Non: la tumeur qu'elles forment n'est telle qu'on vient de la décrire, qu'autant qu'elles sont d'une texture ordinaire, & que l'orifice de la matrice est largement ouvert. Quand ces membranes sont d'une texture lâche, elles s'engagent de meilleure heure à travers cet orifice, & s'avancent dans le vagin, sous la forme d'un boyau: quelques Accoucheurs ont pensé que la poche des eaux prenoit constamment cette sorme quand l'ensant présentoit une des extrémités, mais leur sentiment n'est nullement d'accord avec l'observation.

D. La poche des eaux s'ouvre-t-elle tou-

jours au même terme du travail?

R. Ce n'est qu'au moment de la plus grande sorce du travail que la poche des eaux se déchire chez la plupart des semmes, & que ce sluide s'évacue; mais elle peut résister au-delà de ce temps, ou s'ou-vrir beaucoup plutôt, selon que les mem;

branes sont d'un tissu plus soible ou plus robuste; ce qui n'en est pas plus avantageux.

D. Expliquez-nous pourquoi il n'est passi indifférent que les membranes se déchirent à l tel ou tel temps du travail de l'accouchement.

chirent qu'au moment où le travail est dans sa plus grande sorce, la matrice alors vivement irritée, continue d'agir & de se contracter comme auparavant, malgré l'évacuation de la majeure partie des eaux; & l'accouchement ne tarde pas à se terminer.

Quand elles résistent plus long-temps qu'elles ne doivent aux contractions de la matrice & aux efforts de la semme, l'accouchement en est retardé; & il le seroit souvent alors de plusieurs heures, si l'onne prenoit le parti de déchirer ces membranes; parce qu'il ne peut se terminer qu'elles ne soient ouvertes, ou qu'il ne se sait que très-difficilement (a).

Lorsque les membranes se déchirent de les premières douleurs de l'accouchement; & avant que l'orifice de la matrice ne soit bien dilaté, les eaux s'écoulent comme surtivement & en petite quantité à la fois; elles coulent de cette manière pen dant plusieurs heures, & quelquesois pen

<sup>(</sup>a) On a vu quelquesois l'ensant sortir enve loppé de ses membranes au terme de neus mois comme on le voit bien souvent dans l'avortemen

sur l'Art des Accouchemens. 167 dant plusieurs jours, avant que de fortes douleurs ne se fassent sentir, & que le travail ne fasse de grands progrès. Comme l'évacuation des eaux précède alors de beaucoup l'époque des bonnes douleurs, & qu'il ne s'en écoule plus pendant ces douleurs, on a coutume de dire que l'accouchement se fait à sec.

La crainte d'un travail pénible & long, qu'inspire à toutes les femmes cet écoule-ment prématuré des eaux, n'est fondée, qu'autant que le col de la matrice est encore dur & épais à l'instant où ce fluide cesse de couler : le travail n'en devient pas plus fatigant, lorsque le col de la matrice est souple & esfacé.

D. La poche des eaux s'ouvre-t-elle constamment au milieu de l'orifice de la matrice?

R. Non: si elle s'ouvre le plus souvent au milieu de cet orifice, quelquefois la déchirure s'en fait au-dessus du bord de celui-ci; & les phénomènes qui fuivent

présentent quelques différences.

Quand elle s'ouvre au milieu, les eaux s'écoulent à grands flots, & l'on touche à nud la partie que l'enfant présente. Lorsqu'elle s'ouvre au-dessus du bord de l'orifice de la matrice, il s'échappe peu d'eau à la fois; ce n'est qu'au commencement & fur le déclin de chaque douleur, que ce fluide coule; & dans le fort de ces mêmes douleurs, les membranes se tendent, & la poche des eaux se forme &:

se durcit, comme avant sa rupture.

La tête de l'enfant, en s'engageant, dans ce dernier cas, fait refluer les eaux qui sont au-dessous d'elle, vers la crevasse des membranes; elle vient s'appliquer à ces mêmess membranes, & les pousse au-devant d'elle, de sorte qu'elle en paroît comme coëffée: c'est cette espèce de coëffe, que bien des gens conservent, & regardent comme un présage de prospérité pour l'enfant.

D. Quels sont les symptomes que présente. le travail de l'accouchement après la déchirure

des membranes?

R.On a déjà remarqué que ces symptomes étoient différens dans les premiers momens, felon qu'il s'écouloit alors plus ou moins d'eau. Quand il s'en évacue peu à la fois, comme dans le cas où les membranes se déchirent au dessus du bord de l'orifice de la matrice, le travail n'augmente pas austi rapidement; & quelquetois même il paroît se rallentir pour un temps. Lorsque la matrice se décharge subitement s d'une grande quantité de ce fluide, la femme n éprouve à l'instant même un calme qui lui étoit inconnu, mais dont la durée est fort courte. A peine a-t-elle goûté ce calme pendant quelques minutes, que de nouvelless douleurs se sont sentir, & qu'elles acquièrent plus de sorce qu'auparavant. Lorsque c'est la tête de l'enfant qui se presente, elle

fur l'Art des Accouchemens. 169 elle s'engage alors dans l'orifice de la matrice, & s'avance en le poussant un peu au - devant d'elle, jusqu'à ce que sa plus grande épaisseur l'ait traversé. Le bord de l'orifice assez près de l'entrée du vagin, à l'instant où commence la douleur, disparoît à la fin de cette même douleur, & devient inaccessible au toucher; parce qu'il se retire alors vers le haut du col de l'ensant. L'instant où la tête de l'ensant traverse l'orifice de la matrice est un des plus douloureux du travail, pour la plupart des semmes; & c'est à ce même instant qu'elles commencent à sentir vivement le besoin de pousser de toutes leurs forces.

C'est encore à ce même temps du travail que quelques semmes éprouvent une sorte d'envie d'aller à la garde-robe, & demandent à descendre du lit pour y satisfaire: ce qu'on ne doit jamais leur permettre, dans la crainte qu'elles n'accouchent debout, ou qu'elles ne le fassent dans une attitude peu convenable; comme sur leur chaise percée, &c.

C'est aussi lorsque la tête de l'enfant occupe le fond du bassin, que le travail acquiert le plus de force; que le pouls de la semme s'anime le plus, & que la chaleur devient plus grande dans toute l'habitude du corps; que la face rougit, que la tête s'appesantit, qu'il se manifeste

Н

quelques envies de vomir, & que certaines femmes sont le plus souvent tourmentées de crampes douloureuses dans le derrière de l'une ou l'autre cuisse.

D. Quels sont les symptomes du dernier

temps du travail?

R. Ce temps, qui est celui où la tête de l'ensant se dégage du bassin & traverse la vulve, est ordinairement sort court pour les semmes qui ont eu précédemment quelques ensans; car il ne saut alors que peu de douleurs pour terminer l'accouchement: mais il est plus long & plus satigant pour celles qui accouchent de leur premier.

Chez ces dernières, la tête de l'ensant

Chez ces dernières, la tête de l'enfant fe dégage plus lentement, parce que la vulve est plus étroite; & que les parties qui la forment résistent davantage, & se

développent plus difficilement.

A chaque douleur, si la femme la fait bien valoir, la tête de l'enfant s'avance un peu en poussant au dehors le périnée, & en lui faisant décrire une convexité plus ou moins marquée; mais après la douleur, la tête remonte, elle semble rentrer, & le périnée s'assaisse. Elle avance un peu plus à la douleur suivante, & s'éloigne de même dès que cette douleur est passée; ce qui continue de cette manière jusqu'à ce que sa plus grande largeur soit descendue au-dessous de la partie antérieure.

fur l'Art des Accouchemens. 171 des tubérosités ischiatiques. Dans ce temps, la tête ne rentre plus après la douleur, & le périnée, qui la recouvre encore dans une grande étendue, forme une tumeur considérable.

Lorsque la tête est éngagée à ce point, il est dissicile que la semme suspende ses efforts. La pesanteur & le tiraillement qu'elle éprouve vers la vulve & le sondement l'excitent à pousser sans relâche. Si elle ne modère pas alors ces mêmes efforts, le périnée court le plus grand danger de se déchirer; & les soins de l'Accoucheur ne sauroient toujours l'en préferver.

La tête de l'enfant étant parvenue au point de ne plus remonter après la dou-leur, s'engage de plus en plus à chaque effort & franchit la vulve, mais fouvent en déchirant plus ou moins la fourchette. Bientôt après les épaules paroissent, & le corps se dégage.

Les grandes douleurs cessent alors jusqu'au moment du travail de la délivrance, où de nouvelles, mais plus foibles, se sont sentir. Après ce temps, s'il ne survient pas quelques tranchées, la semme n'éprouve que des cuissons vers la vulve, & un peu de lassitude dans toute l'habitude du corps.

## SECTION III.

De l'accouchement dans lequel l'enfant présente le sommet de la tête à l'orifice de la matrice.

D. A quels signes reconnoît-on que l'enfant

présente le sommet de la tête?

- R. Il est aisé de reconnoître la tête de l'enfant à sa rondeur, à son volume & à sa solidité; mais on ne juge de la région qu'elle présente que par des signes particuliers: ceux qui caractérisent le sommet, sont la suture sagittale, la sontanelle antérieure & la sontanelle postérieure. Ces signes se manifestent clairement au toucher, dès qu'on peut introduire le doigt dans l'oristice de la matrice; soit qu'on touche la tête à nud, soit qu'on ne la touche qu'à travers les membranes, pourvu qu'on sasse ces recherches dans l'intervalle des douleurs.
- D. Quelle ind.ction doit on tirer de la présence du sonmet de la tête à l'orifice de la matrice?
  - R. L'enfant ne peut se présenter d'une manière plus savorable, soit qu'on le considère relativement à lui-même, soit qu'on le considère relativement à la nière. Le sommet de la tête est, de toutes les parties qui.

fur l'Art des Accouchemens. 173 peuvent se présenter, celle qui se présente le plus constamment.

D. De combien de manières le sommet de la tête peut-il se présenter à l'orifice de la matrice?

R. On peut rapporter à fix positions principales toutes celles que cette région est susceptible de prendre à l'orifice de la matrice.

Dans la première, l'occiput répond à la cavité cotyloïde gauche, & le front à la jonction facro-iliaque droite (a).

Dans la deuxième, l'occiput est tourné vers la cavité cotyloïde droite, & le front vers la symphise facro-iliaque gauche.

vers la fymphise sacro-iliaque gauche.

Dans la troisième, l'occiput répond à la symphise du pubis, & le front à la faillie du sacrum.

Dans la quatrième, l'occiput est placé vis-à-vis la jonction sacro-iliaque droite, & le front derrière la cavité cotyloïde gauche.

Dans la cinquième, l'occiput regarde la fymphise facro-iliaque gauche, & le front le derrière de la cavité cotyloïde droite.

Dans la sixième ensin, l'occiput est vis-à-vis la saillie du sacrum, & le front derrière la symphise du pubis.

D. Ces six positions se rencontrent - elles aussi fréquemment les unes que les autres dans

<sup>(</sup>a) Voyez la Planche VIII.

174 Principes

la pratique, & sont-elles également savorables à l'accouchement?

R. Non: il en est même qui sont excessivement rares, & quelques-unes moins favorables que les autres. La première est la plus ordinaire & la meilleure. La seconde paroît également avantageuse, mais on ne l'observe pas aussi souvent; elle peut avoir lieu une sois, sur sept ou huit que la première se rencontrera. La quatrième & la cinquième se remarquent une sois ou deux sur quatre-vingts, ou environ; mais la troisième & la sixième sont singulièrement rares. La troisième est assez savorable encore, & la sixième pour l'ordinaire, très-peu avantageuse, comme on le verra ci-après.

D. Pourquoi dites-vous que la position la plus ordinaire & la plus savorable est celle où l'occiput répond à la cavité cotyloïde gauche; tandis que la plupart des Auteurs prennent pour telle, la position où l'occiput regarde le pubis, & la face le sacrum?

R. L'observation confirme à chaque instant ce que nous avançons à ce sujet. Les auteurs qui ont assuré que la position la plus ordinaire & la plus avantageuse étoit celle où l'occiput répondoit au pubis, n'ont fait attention, sans doute, à la manière dont la tête se présente, qu'à l'instant où elle paroît à la vulve; car dans ce moment, en esset, sa position est presque

fur l'Art des Accouchemens. 175 toujours telle que la face regarde le facrum, & l'occiput le pubis : il ne peut y avoir de meilleure position par rapport au détroit insérieur (a).

D. D'où vient cette position est-elle moins avantageuse à l'égard du détroit supérieur,

que du détroit inférieur?

R. Si la tête se présentoit ainsi dans le premier temps du travail, son grand diamètre se trouvant dans la direction du plus petit diamètre du détroit supérieur, elle ne traverseroit ce détroit que bien plus difficilement qu'elle ne le fait dans les autres positions, excepté dans la sixième. Il n'en est pas de même dans le dernier temps; parce que le grand diamètre du détroit inférieur est celui qui va du pubis à la pointe du coccix.

D. Pourquoi cette position si ordinaire dans le dernier temps du travail, est-elle si rare à

l'égard du détroit supérieur?

R. On verra dans la suite comment la tête est forcée de prendre cette position au détroit insérieur; il faut exposer le mécanisme de l'accouchement pour le bien comprendre. Si l'occiput se trouve si rarement vers le pubis dans le premier temps du travail de l'accouchement, il faut l'attribuer à la sorme du détroit supérieur, & à celle de la tête même, à la rondeur

<sup>(</sup>a) Voyez lá Planche IX,

176 Principes

du front, à la convexité de la colonne lombaire & à la faillie de la base du facrum, sur lesquelles il paroît difficile que le front reste deux instans de suite, par rapport à la mobilité de la tête, & de l'enfant même dans la matrice.

On peut expliquer de même pourquois la fixième position est aussi rare que nous l'avons annoncée. L'occiput, encore plus; arrondi que le front, ne pouvant rester plus long-temps que celui-ci appuyé sur la faillie du sacrum & la convexité de la colonne lombaire.

D. Pourquoi les trois premières positions du sommet de la tête sont - elles plus favorables à l'accouchement que les trois dernières?

R. Les deux premières sont plus favorables que les autres, en ce que le grand. diamètre de la tête répond à l'un des plus: grands du détroit supérieur, & que dans la suite du travail, l'occiput se porte sous l'arcade des os pubis, comme on le verra ci-après. La troisième position est également avantageuse, quand le détroit supérieur est d'une largeur ordinaire; 1°. parce que le petit diamètre de ce détroit est alors de quatre pouces & quelques lignes, & que le grand diamètre de la tête n'est pas plus étendu; 2° parce que l'occiput se présente dans la suite à l'arcade des os pubis. La quatrième & la cinquième positions ne sont pas aussi favorables, quoique le

fur l'Art des Accouchemens. 177 grand diamètre de la tête corresponde à l'un des plus grands du détroit; parce que la face vient se présenter à l'arcade du pubis dans le dernier temps du travail : ce qui rend l'accouchement plus difficile que dans les autres cas, & même impossible sans les secours de l'art, quand le bassin n'est pas très-spacieux relativement à la grosseur de la tête.

D. L'accouchement peut-il s'opérer par les seules forces de la femme, toutes les fois que la tête se présente dans l'une des meilleures

positions que vous venez d'assigner?

R. Non; il peut devenir encore très-difficile, quoique le bassin de la semme soit bien conformé. L'accouchement se fera naturellement, & pour l'ordinaire avec facilité, si la tête s'avance en présentant de plus en plus la région de la sontanelle postérieure; mais il se fera difficilement, si elle s'engage en présentant la sontanelle antérieure, ou le haut du front, & comme en se renversant sur le dos de l'ensant.

D. Comment peut-on juger de la positione du sommet de la tête à l'égard du détroit su-

périeur?

R. C'est la direction de la suture sagittale, & la situation des sontanelles, respectivement au bassin même, qui nous en instruisent. Trouve-t-on la sontanelle postérieure vers la cavité cotyloïde gauche, & l'antérieure au-devant de la symphise

Hy

178 Principes

facro-iliaque droite; c'est la première po-

sition qui a lieu: ainsi des autres.

D. Quelle est la marche que suit la tête de l'enfant en traversant le bassin, lorsqu'elle se présente dans la première & dans la seconde

positions?

R. Dans l'une & l'autre de ces positions, à mesure que la tête s'avance, elle présente de plus en plus son extrémité occipitale, & la sontanelle possérieure en devient plus accessible au toucher. Cette sontanelle, dans le premier cas, paroît se dégager de dessous la cavité cotyloïde gauche, & descendre derrière le trou ovalaire, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue vers le milieu de la branche de l'ischium: elle en fait autant vers le côté droit du bassin, dans la seconde position.

Lorsque la tête a franchi le détroit supérieur, elle tourne comme sur son axe au milieu de l'excavation du bassin, de manière que l'occiput vient se placer sous l'arcade du pubis (a); & s'y engage ensuite en s'avançant dans la vulve, & en s'élevant du côté du ventre de la semme, tandis que la face se dégage vers le bas de

la vulve (b).

Austitôt que la tête est sortie, la face se tourne un peu vers l'une ou l'autre

<sup>(</sup>a) Voyez la Planche IX. (b) Voyez la Planche IX.

cuisse de la femme; une épaule paroît audessous du pubis, & l'autre au-devant du facrum, pour se dégager au premier effort, ainsi que le reste du corps.

D. Quelle est la marche que décrit la tête dans la troissème position?

R. Dans cette position, la région occipitale descend le long de la symphise du pubis. A mesure que la tête s'engage, la fontanelle postérieure se rapproche du bord inférieur de cette symphise, & paroît ensuite vers le milieu de l'arcade. L'occiput alors s'avance dans la vulve en manière de coin, & continue de fortir en se relevant, comme à la suite des deux premières positions. Une des épaules se présente au-dessous du pubis & l'autre vers le bas de la vulve ; & elles fe dégagent de la même manière que dans les cas précédens.

D. En quoi consistent les grands avantages de la marche que vous faites suivre à la tête dans ces trois premières positions?

R. Ceux qui observeront cette marche pas à pas, remarqueront sans peine qu'elle est telle que, dans tous les instans du travail, la tête ne présente que ses plus petits diamètres, tant au détroit supérieur qu'au détroit inférieur, & qu'elle ne peut traverser le bassin d'une manière plus favorable : elle est tellement conforme au rapport des parties, que la tête ne fauroit s'en écarter sans que l'acconchement n'en devienne difficile. C'est cette marchés même que nous devons lui saire suivre, quand les circonstances nous déterminent à opérer l'accouchement.

D. Expliquez - nous en quoi la tête peut's'écarter de cette marche, & comment l'accou-

chement peut en devenir difficile.

R. Il arrive quelquesois que la tête de: l'ensant, en s'engageant dans le bassin, se renverse vers le dos, & que le menton, qui doit rester sur le haut de la poitrine: jusqu'à l'instant où l'occiput paroît à l'arveade du pubis, s'en écarte dès le premier pas que la tête fait en avant; ce qui ne peut avoir lieu qu'elle ne présente son plus grand diamètre de front à l'un de ceux du bassin, & le plus souvent au plus petit du détroit insérieur (a), & que l'accouchement n'en soit plus dissicile (b).

Pour répandre plus de jour sur ce point de doctrine, prenons pour exemple la

première position de la tête.

Lorsqu'elle s'engage de la manière dont nous parlons, la fontanelle postérieure semble s'éloigner, en remontant vers la cavité cotyloïde gauche; & la fontanelle antérieure se découvre de plus en plus vers le

<sup>(</sup>a) On entend ici le diamètre qui traverse la tête depuis le menton jusqu'à la sontanelle postérieure.

<sup>(</sup>b) Voyez la Planche X.

bas de la symphise sacro-iliaque droite, en se rapprochant du milieu du détroit insérieur, où elle se présente dans la suite. Le plus grand de tous les diamètres de la tête correspond alors à celui du bassin, qui va du trou ovalaire gauche à l'échancrure ischiatique droite; une épaule vient s'appuyer sur l'os pubis gauche, près la symphise, & l'autre s'arrête sur le côté gauche de la faillie du facrum; de sorte que le corps de l'ensant paroît renversé & couché sur la sosse l'aque de ce même côté.

L'accouchement ne peut alors se faire naturellement, qu'autant que le bassin est trèsgrand, & la tête très-petite; & malgré ces conditions avantageuses, il est toujours extrêmement pénible pour la semme & pour l'ensant. Lorsque ces deux conditions ne se rencontrent pas, l'accou-

chement ne peut fe terminer.

D. Ne peut-on pas s'opposer à cette marche désavantageuse de la tête, & la déterminer à suivre celle qui est la plus naturelle?

R. Oui, & il est même très-facile d'y parvenir, quand on s'apperçoit de bonne heure que la tête s'engage en se renverfant vers le dos; il sussit presque toujours de faire coucher la semme sur le côté opposé à l'obliquité de la matrice. Quand cette précaution ne sussit pas pour ramener la tête à sa marche ordinaire, on soutient & on repousse le front de l'ensant

182 Principes

au moyen d'un doigt, même de deux appliqués sur le haut de cette partie.

D. Peut-on encore ramener la tête à sa marche : naturelle, quand elle s'est engagée profondé-

ment en se renversant vers le dos?

R. On le peut encore, & souvent on y trouve peu de dissiculté. La première position nous servira d'exemple une seconde fois, pour rendre le procédé plus clair. La tête de l'enfant, dans cette position, ne suit ordinairement la marche désavorable dont il s'agit, qu'autant que la matrice est inclinée vers le côté gauche. Pour ramener alors la tête à sa marche naturelle, on fera coucher la femme sur le côté droit, afin que le fond de la matrice se porte & s'incline de ce côté; puis au moyen de deux doigts de la main gauche introduits dans le vagin, on soutiendra, & on repoussera même le front de l'enfant, jusqu'à ce que la fontanelle postérieure soit beaucoup plus basse que la fontanelle antérieure, & qu'elle réponde au trou ovalaire gauche. On observera de ne repousser ainsi le front de l'enfant que pendant la douleur, & chaque fois que cette douleur se répétera. On se conduira suivant les mêmes principes dans tous les autres cas : on fera coucher la femme sur le côté opposé à l'obliquité de la matrice, & on repoussera le front de l'enfant comme on vient de le prescrire.

fur l'Art des Accouchemens. 18; D. Indiquez - nous la marche que suit la

tête de l'enfant dans les quatrième & cin-

quième positions. R. L'occiput, placé vis-à-vis l'une des fymphises sacro-iliaques, descend le long de ces mêmes symphises, jusqu'à ce que la tête soit parvenue dans l'excavation du bassin; puis il se tourne, pour l'ordinaire, vers le milieu du facrum, tandis que le front se place derrière le pubis. La tête continuant d'avancer à chaque douleur, l'occiput suit le plan incliné que décrit la partie inférieure du facrum avec le coccix & le périnée; de manière que la fontanelle postérieure vient se manifester au bas de la vulve. La tête de l'enfant franchit enfuite cette ouverture, en se renversant vers l'anus de la femme (a); pendant que le front & la face se dégagent de dessous la symphise du pubis, pour se tourner aussi tôt un peu obliquement vers l'une des cuisses. Les épaules se présentent au détroit inférieur, comme dans les autres

D. La tête suit-elle toujours cette marche lorsqu'elle se présente dans les quatrième &

cas, & le traversent de même.

cinquième positions?

R. Non: il arrive quelquefois que l'occiput, au lieu de se tourner vers le sacrum, revient insensiblement vers le trou

<sup>(</sup>a) Voyez la Planche XI.

ovalaire, & se rapproche de l'arcade du pubis, sous laquelle il se place dans la suite; de sorte que tout se passe alors comme dans les meilleures positions du sommet de la tête. Nous observerons qu'il n'est pas sort difficile de faire suivre cetter direction avantageuse à l'occiput, toutes les sois qu'il se présente vers l'une des symphises sacro-iliaques: le doigt appliqué convenablement à la tête de l'enfant pouvant la diriger ainsi.

D. Comment la tête de l'enfant traverse-teelle le bassin lorsqu'elle se présente dans la

sixième position?

R. L'occiput descend alors le long du sacrum, du coccix & du périnée, jusqu'à ce que la fontanelle postérieure soit parvenue au bas de la vulve; & à mesure qu'il franchit celle-ci, il se renverse vers l'anus de la semme, tandis que le front & la face se dégagent de dessous le pubis, comme à la suite des quatrième & cinquième positions (a).

<sup>(</sup>a) Nous rappellerons que l'accouchement est constainment plus difficile dans ces trois dernières positions, où la face se présente sous le pubis vers la sin du travail, que dans les trois premières. Nous ajouterons, pour donner plus de force à ce que nous avançons à ce sujet, qu'une tête qui ne trouveroit, de la part du détroit inférieur, que les dimensions requises pour son passage, dans le cas où l'occiput se présente à



Challi del .

Duhamel . Sculp




Plax.


pag.184.



· del

Do for Jalo.









Challi. del

Devifse . Soulp



# EXPLICATION

DES PLANCHES VIII, IX, X & XI.

La Planche VIII représente l'enfant dans l'attitude la plus ordinaire, offrant le sommet de la tête à l'orifice de la matrice, l'occiput tourné vers la cavité cotyloïde gauche.

La Planche IX représente l'enfant offrant la tête au détroit inférieur, & dans la position la plus ordinaire, vers les derniers temps du travail de l'accouchement,

l'occiput étant placé sous le pubis.

Le trait de la tête, qui est au dehors, indique de quelle manière & à quel point l'occiput s'élève au-devant du pubis de

la femme, à mesure que la tête se dégage. La Planche X offre l'attitude de l'enfant, lorsque sa tête se renverse sur le dos, à mesure qu'elle s'engage dans le bassin.

larcade du pubis, ne pourroit nullement traverser ce détroit sans les secours de l'Art, si la face étoit en dessus.

Les parties extérieures de la génération doi-vent éprouver également plus de distension; & le périnée court bien plus de risque de se des chirer.

La Planche XI représente spécialement la position que prend la tête à l'égard d' détroit inférieur, à la suite des quatrième cinquième & sixième positions, décrite dans le texte.

Le trait de la tête qui est au dehors, ind que à quel point elle se renverse vers l'anu de la semme, en se dégageant complétemen

### SECTION IV.

De l'accouchement dans lequel l'enfant pres sente les pieds, considéré comme natures.

D. PEUT-ON ranger parmi les accouches mens naturels, celui où l'enfant présente le

pieds à l'orifice de la matrice?

R. On peut le considérer comme tell puisque l'enfant dont les pieds se présentent à l'orifice de la matrice peut naître aussi naturellement que s'il venoit par l'tête; ce que l'observation a prouvé millifois. Nous remarquerons seulement que l'enfant peut être alors exposé à quelque inconvéniens de plus que dans l'accourchement ordinaire.

D. Dans quels cas peut-on livrer aux soins de la nature l'accouchement où l'enfant pre

sente les pieds?

R. On le peut, & on le doit même toutes les fois que la femme n'éprouve aucun accident fâcheux, que son bassin est

fur l'Art des Accouchemens. 187 bien conformé, que les autres parties qui servent à l'accouchement sont bien disposées, & que les pieds se présentent dans une bonne position.

D. A quels signes reconnoît-on que les vieds se présentent, & de combien de manières

veuvent-ils se présenter?

R. Les douleurs de l'accouchement suivant la même marche que dans tous les autres cas, l'orifice de la matrice se diatant de même, & la poche des eaux ne prenant pas une sorme différente, on ne peut être sûr que ce sont les pieds qui se présentent, que quand on les a touchés.

Ils peuvent se présenter de manière que es talons regardent le côté gauche du passin, & les orteils le côté droit : c'est

a position la plus ordinaire.

Les talons peuvent répondre au côté droit du bassin, & les orteils au côté gauche; c'est la position la plus fréquente

iprès la première.

Les talons regardent quelquesois le pupis, & les orteils le facrum; ou bien ils répondent au facrum, & les orteils au pubis: mais ces deux positions sont on ne peut plus rares.

D. Est-il bien nécessaire de s'assurer de la vosition des pieds à l'égard de l'orifice de la

natrice?

R. Cette précaution n'est pas des plus técessaires, les pieds pouvant se dégager

également dans toutes les positions pots sibles. Mais il est important d'observe la position dans laquelle les fesses, le épaules & la tête de l'enfant se préssenteront dans la suite au détroit supérieur; parce qu'il n'est pas indifférent pour la facilité de l'accouchement, que ces parties se présentent de telle ou telle manière; comme on a dû le remarquer quand la tête même s'avance la première.

D. Quelles sont les positions des pieds qui vous paroissent les meilleures, & pour

quoi les regardez-vous comme telles?

R. Les deux premières positions que nous venons d'afsigner sont non-seules ment les plus ordinaires, mais encore les plus avantageuses; parce que la plus grande largeur des sesses, celle des épaules, & la longueur de la tête, répondront dans la suite à l'un des plus grands diamètre du détroit supérieur; le dos & l'occipus descendant alors derrière l'une ou l'autre des cavités cotyloïdes, la poitrine & la face vis-à-vis l'une des symphises sacros iliaques.

D. Faites - nous connoître de quelle mas nière l'enfant se dégage, quand les pieds s

présentent dans la première position.

R. Dans ce cas, comme dans tous les autres, si l'on ne dégage pas les pieds à l'instant où les caux s'évacuent, ils ne peuvent descendre qu'autant que les sesses.

sur l'Art des Accouchemens. 189 le l'enfant sur lesquelles ils sont appuyés, l'avancent dans le bassin; ce qui ne se fait pas toujours fans quelques difficulrés. Les pieds étant sortis, le tronc le dégage facilement jusqu'à ce que les uffelles touchent au détroit supérieur; mais a marche alors fe ralentit un peu, par apport à la largeur des épaules, & à ce que les bras sont comme sorcés dans ce moment de se relever vers le col & la âte. On remarque, dans la première position, que les fesses de l'enfant se présentent obliquement au détroit inférieur, de manière qu'une des hanches répond à la jambe droite de l'arcade des os pubis, & l'autre à l'échancrure ischiatique gauche; le dos étant situé sous la cavité cotyloide & le trou ovalaire de ce dernier côté.

Les épaules traversent le détroit supérieur dans la même direction; & la base du crâne vient s'y présenter, de saçon que l'occiput répond au-dessus de la cavité cotyloïde gauche, & la face vis-àvis la symphise sacro-iliaque droite.

La tête poussée par de nouveaux efforts s'engage en présentant le menton de plus en plus vers le bas de la symphise facro-iliaque & l'échancrure ischiatique droite. La face se porte ensuite dans la courbure du facrum, & la nuque, ou le derrière du col, vient sous la symphise du pubis.

Après ce mouvement de rotation de la part de la tête, on observe, à chaque douleur, que le menton, & successivement la bouche, le nez, le front & le sonmet de la tête se rapprochent du bas de la vulve; tandis que la nuque semble rouler sur le bord inférieur de la symphise du pubis. C'est l'occiput qui se dégage le dernier dans cet accouchement.

A l'instant où la tête occupe la cavité du bassin, on s'apperçoit que les bras sont relevés sur les côtés du col & la face. Ces extrémités se dégagent à mesure que la tête s'avance dans le détroit insé.

rieur (a).

D. Expliquez - nous comment s'opère la fortie de l'enfant dans la seconde position des

pieds.

R. La sortie de l'enfant se fait dans ce cas comme dans le précédent; le tronc & la tête exécutent les mêmes mouvemens, mais dans un sens dissérent. Le dos descend le long de la partie latérale droite & antérieure du bassin, & la poitrine vis-à-vis la symphise sacro-iliaque gauche. La face, dans la suite, répond à cette symphise, & se tourne dans la courbure du sacrum, dès que la tête a

<sup>(</sup>a) On remarque la même chose à la suite des trois autres positions des pieds.

fur l'Art des Accouchemens. 191° anchi le détroit supérieur; après quoi reste s'exécute comme on l'a remarqué ans la première position.

D. Comment s'opère la sortie de l'enfant ins la troisième position des pieds?

R. Dans cette position, il est rare que le os de l'ensant, qui répond à la partie antéeure de la matrice, ne se détourne pas de essous la symphise du pubis, à mesure que s fesses descendent; & que celles-ci ne tennent pas se présenter obliquement au étroit insérieur, comme dans la presière, ou dans la seconde position, pour ortir de même.

Soit que le tronc de l'enfant prenne ette position en descendant, ou qu'il ne la renne pas, lorsque la base du crâne approche du détroit supérieur, la face ui semble appuyée sur la convexité que écrivent les dernières vertèbres sombaires en détourne, & se porte vers l'un ou autre côté; de sorte que le menton réond dans la suite à l'une des symphises sa-to-iliaques, & l'occiput à la cavité cotyride opposée. Au moyen de ce changement e direction, la tête traverse encore le basen, comme elle le fait dans la première, u dans la seconde position des pieds.

D. Il nous semble que la marche que vous tites suivre à la tête de l'ensant dans la oisième position des pieds, n'est pas celle que la plupart des Auteurs lui ont assignée

en pareil cas?

R. Il est vrai que ces Auteurs ont annoncé que la face de l'enfant descendoit alors directement en dessous; qu'elle devoit descendre constamment dans cette direction, & qu'il falloit la tourner ainsi toutes les sois qu'elle se présentoit disséremment; mais ils paroissent n'avoir observé la position de la tête qu'à l'instant où elle franchissoit le détroit insérieur & la vulve. Quelques-uns des modernes, plus exacts, ont remarqué que la tête se présentoit disséremment au détroit supérieur. & que la face se tournoit alors vers l'un des côtés de la faillie du facrum; de sorte que la plus grande longueur de la base du crâne répondoit à l'un des diamètres obliques de ce détroit.

Si la face descendoit vis-à-vis la colonne lombaire, la tête, dans bien des cas, ne pourroit franchir le détroit supérieur; parce qu'elle présenteroit alors sor grand diamètre au plus petit de ce détroit & que le menton pourroit s'arrêter à la faillie du facrum, comme on est dans l'opinion qu'il s'accroche quelquesois au rebord des os pubis, dans la position de

pieds où la face vient en dessus.

D. Dites-nous comment s'opère la sorti de l'enfant dans la position des pieds où le esteils répondent au pubis. Sur l'Art des Accouchemens. 193
R. Quand on observe la marche de l'accouchement dans cette position des pieds, on remarque que la poitrine de l'enfant se détourne un peu de dessous la symphise du pubis, à mesure que le tronc s'engage; que les fesses se présentent obliquement au détroit inférieur, & le traversent ainsi; que dans la suite le menton se détourne également de dessus la symphise du pubis, en se portant vers l'une des cavités cotyloïdes, & que l'occiput en fait autant à l'égard de la saillie lu sacrum, de sorte que la longueur de a base du crâne répond encore à l'un les diamètres obliques du détroit supé-ieur.

C'est dans cette nouvelle position que a tête s'engage; la face descend derrière cavité cotyloïde & le trou ovalaire de un ou de l'autre côté, pour se tourner ous le pubis; tandis que l'occiput se orte de même dans la courbure du sarum.

Après ce temps, le menton commence paroître au haut de la vulve, & la face dégage insensiblement de dessous le pus; pendant que la nuque, ou la partie offérieure du col, semble tourner sur la ommissure insérieure de la vulve, & le la tête se renverse vers l'anus de la mme.

D. La tête se dégage-t-elle avec autant

194 Principes

de facilité dans ce cas, que dans celui ou!

la fice répond au facrum?

R. Non: pour quelle traverse ainsi le détroit inférieur, il faut qu'elle soit d'une grosseur médiocre relativement à ce détroit; elle ne pourroit le franchir dans cette position, s'il n'avoit que les dimensions absolument requises pour son passage, dans le cas où la face répond au facrum.

D. La face de l'enfant se détourne-t-elle de dessus la symphise du pubis, comme vous venez de le décrire, toutes les sois que les pieds se présentent dans la quatrième position?

R. Il arrive quelquefois, mais rarement: que la tête ne change pas de position en s'approchant du détroit supérieur; & la sace alors s'engage derrière la symphise du pubis même, l'occiput étant vis-à-vir la faillie du sacrum: mais la tête s'arrête bientôt, & cesse d'avancer, si le détroi supérieur n'est pas très-large de d'evan en arrière.

C'est le cas où l'on a cru que le mentor de l'enfant s'accrochoit au rebord du pu bis; & quand il s'accroche ainsi, les se cours de l'art deviennent nécessaires.

D. La connoissance du mécanisme de l'au se couchement où l'ensant présente les pieds est elle d'une grande importance dans la pratique

R. La connoissance de ce mécanismes est très importante, puisque nous devor Fimiter dans tous les cas où il convier

fur l'Art des Accouchemens.

de retourner l'enfant, & de l'extraire par les pieds. C'est cette marche naturelle que nous venons de décrire, qu'il faut faire suivre à l'enfant dans tous ces cas: or, comment la lui faire observer, si on ne la connoît pas exactement?

#### SECTION V.

Des accouchemens où l'enfant présente les, genoux & les fesses.

D. L'ACCOUCHEMENT où l'enfant préfente les genoux peut-il être encore regardé comme naturel?

R. On peut le regarder comme tel; lorsque l'ensant présente les deux genoux, puisqu'il peut alors s'opérer par les seules forces de la semme, presque avec autant d'avantages & de facilité, que celui où les pieds se sont engagés les premiers. Mais il est excessivement rare que les genoux se présentent ensemble, & l'un d'eux, pour l'ordinaire, reste appuyé sur la marge du bassin, tandis que l'autre s'avance un peu dans le col de la matrice: ce qui rearde de beaucoup les progrès de l'accouchement, & s'y oppose même quelquesois le manière à exiger les secours de l'art. On exposera dans la suite ce que nous levons saire dans ce ças.

Principes 196

D. Quelle est la marche que suit l'enfant! en se dégageant du sein de sa mère, dans tous: les cas où les genoux se présentent?

R. Il s'en dégage alors, en exécutant:

les mêmes mouvemens que s'il eût pré-

senté les pieds.

D. Quel jugement doit-on porter de l'accouchement où l'enfant présente les fesses à l'orifice de la matrice?

- R. On peut encore admettre cet accouchement au nombre de ceux que nous avons appellé naturels: car l'observations a prouvé mille & mille fois qu'il pouvoit s'opérer sans les secours de l'art.
- D. Dans quels cas peut-on confier aux: soins de la nature l'accouchement où l'enfant présente les fesses?
- R. On doit le faire toutes les fois que la femme n'éprouve pas d'accidens graves,, & n'en est pas menacée; toutes les fois que le bassin est bien conformé, que l'ensant n'est que d'une grosseur médiocre, que less fesses sont placées convenablement à l'égard du détroit supérieur, & qu'elles s'engagent aisément après l'ouverture de la poche des eaux. La femme, dans tous ces cas, peut se passer de nos secours; & si nous prescrivons dans la suite de lui en accorder: quelques-uns, on ne doit pas les regarder: comme d'une nécessité indispensable.

D. Peut on aisément reconnoître que ce

sur l'Art des Accouchemens. 197 Sont les fesses de l'enfant qui se présentent à

l'orifice de la matrice?

R. Il est souvent bien difficile d'en acquérir la connoissance avant l'ouverture de la poche des eaux; mais on le fait aisément après l'écoulement de ce sluide. On trouve alors sur l'orifice de la matrice, une partie volumineuse, assez arrondie, assez souple au toucher, & divisée par un sillon d'une prosondeur remarquable, dans lequel se trouve l'anus & les parties sexuelles. La sortie du méconium est un autre indice de la présence des sesses de l'ensant à l'orifice de la matrice.

D. De quelles manières les fesses peuvent-

R. Elles peuvent s'y présenter de quatre manières différentes. Dans la position, qui est la plus ordinaire, le dos de l'ensant répond à la partie antérieure & latérale gauche de la matrice, au - dessus de la cavité cotyloïde; & la poitrine, ainsi que la face, sont au-dessus de la symphise sacro-iliaque droite.

Dans la deuxième position, le dos se trouve sous la partie antérieure & latérale droite de la matrice, au-dessus de la cavité cotyloïde, & la poitrine répond à la partie postérieure & latérale gauche.

Dans la troisième, le dos est situé sous la partie antérieure de la matrice, audessus de la symphise du pubis, & la

I ii

poitrine, ainsi que la face, regardent la

partie postérieure de ce viscère.

Dans la quatrième, la poitrine & la face sont au-dessus du pubis, & le doss répond à la partie postérieure de la matrice.

D. Ces quatre positions sont-elles également:

favorables à l'accouchement?

R. Non: la première & la seconde sont: les meilleures, mais la troisième, & surtout la quatrième, ne peuvent passer pour: être très favorables.

D. Indiquez - nous succinctement commentes s'opère l'accouchement où l'enfant présente les fesses dans l'une des deux premières post-

tions.

R. Dans l'un & l'autre cæ, les sessesse de l'ensant s'engagent en offrant leur plus; grande largeur à l'un des diamètres obliques du détroit supérieur, & elles vienment se présenter au détroit insérieur, de manière qu'une des hanches passe sous la symphise du pubis, & l'autre vers le bas de la vulve. En sortant dans cette direction, elles se relèvent vers le mont de Vénus, & le tronc de l'ensant semble se recourber en manière d'arc au-devant du pubis de la mère.

A mesure que les sesses s'avancent ainsi, les cuisses de l'enfant s'appliquent étroitement sur son ventre, & les jambes s'alongent vers le devant de sa poirrine, sur

sur l'Art des Accouchemens. 199 laquelle les pieds se trouvent appuyés dans la suite; de sorte qu'ils ne se dégagent que lorique le corps est presque entiérement dehors. Après ce temps, le reste de l'accouchement s'opère comme nous l'avons décrit en parlant de la première & de la seconde positions des pieds.

D. Dites - nous de quelle manière se fait la sortie de l'enfant dans les troisième &

quatrième positions des sesses.

R. Dans l'une de ces positions, le dos de l'enfant descend assez ordinairement derrière le pubis de la mère, de manière que les fesses viennent présenter leur plus grande largeur à l'arcade de ces mêmes os: ce qui rend leur passage à travers le détroit inférieur plus difficile que dans les

positions précédentes.

Dans la quatrième position, ce sont les cuisses & les jambes de l'enfant, appuyées sur le ventre & sur la poitrine, qui descendent le long du pubis de la mère; & les sesses éprouvent encore plus de difficultés à fe dégager complétement que dans le troisième cas. Après la fortie du tronc, l'accouchement s'opère comme on l'a décrit à l'occasion des troisième & quatrième positions des pieds.

# CHAPITRE VII.

Des soins qu'on doit donner à la femme pendant l'accouchement, & de ceux qu'exige l'enfant immédiatement après sa naissance.

D. QUELS sont les soins qu'on doit avoir pour la semme pendant le travail de

L'enfantement?

R. La nature des secours qu'on doit porter à la femme pendant le travail ne peut être déterminée que par les circonstances que présente ce même travail. On observera d'abord pendant quelques instans, la marche des douleurs, & on pratiquera le toucher; 1°. pour s'assurer si ces douleurs sont celles de l'accouchement, ou si elles ne proviendroient pas d'une autre cause; 2° pour apprécier le temps de la groffesse, la semme ayant pu se tromper sur ce temps, & se croire à terme, lorsqu'elle en est encore éloignée; 3°. pour reconnoître le degré d'ouverture & la situation du col de la matrice, ainsi que la conformation du bassin, & la manière dont l'enfant se présente. Ce n'est qu'au moyen de ces connoissances qu'on peut se tracer un plan de conduite raisonné. S'il est des fur l'Art des Accouchemens. 201 cas où la nature fe sussile pour opérer l'accouchement sans aucun aide, & dans lesquels la principale fonction de l'Accoucheur ne consiste, rigoureusement parlant, qu'à soutenir le courage de la semme; il en est aussi où l'on peut procurer une délivrance plus prompte, plus facile & plus heureuse; d'autres ensin où, sans nos secours, la mère & l'ensant succomberoient aux essorts impuissans de la nature: le toucher seul peut nous faire distinguer tous ces cas.

### SECTION PREMIÈRE.

Des choses auxquelles l'Accoucheur doit donner toute son attention dès le commencement du travail de l'accouchement.

D. A QUE L'S signes distinguera-t-on les vraies douleurs de l'enfantement de celles qui lui sont étrangères?

R. Ces signes ayant été exposés ci-devant, nous ne ferons que les retracer ici.

Pendant la durée de chaque douleur qui appartient à l'accouchement, le bord le l'orifice de la matrice se roidit & se durcit; les membranes du sœtus soumisses ut toucher se tendent, & sont poussées égérement en avant; & après la douleur, toutes ces parties se relâchent, &

reviennent à leur premier état. On découvre, au moyen d'une main placée fur le ventre de la femme, que le corps de la matrice se durcit de même pendant la dou-leur, & redevient plus souple après.

Les douleurs qui sont étrangères à l'accouchement ne produisent aucun de ces changemens dans l'état de la matrice.

D. Est - il bien nécessaire de s'assurer du serme de la grossesse, lorsqu'on est certain. que les douleurs sont celles de l'accouchement?

R. Il est très-nécessaire de s'en assurer, parce que le travail a pu s'établir prématurément, qu'il peut être l'effet d'une cause. accidentelle, qu'il est alors possible de le. calmer, & de mettre la femme dans le. cas de parcourir heureusement les der-niers périodes de la grossesse; comme on l'a souvent observé. Quels reproches l'accoucheur n'auroit-il pas à se faire, s'il cherchoit à favoriser les progrès d'un pareil travail, au lieu de s'occuper des moyens de rétablir le calme! Sa conduite. ne seroit-elle pas une sorte d'attentat contre la vie de l'enfant, d'autant plus chancelante encore, que cet enfant est alors plus éloigné du terme de sa maturité (a)?

<sup>(</sup>a) Nous parlerons de ces espèces de saux-tra-

fur l'Art des Accouchemens. 203.

D. A quels signes reconnoîtrons-nous donc que la grossesse est à son terme, & que le

R. La grossesse peut être à son terme, quoique souvent éloignée du neuvième mois, & le travail qui subsiste alors est selon le vœu de la nature, toutes les sois que le col de la matrice est complétement développé, que l'orifice est dilaté & que le bord en est souple & mince: quelque chose que l'on fasse alors, on ne pourra point arrêter les progrès du travail, se n'est peut - être momentanément, & l'accouchement aura lieu.

D. Pourquoi est - il si nécessaire de faire attention à la situation du col de la matrice, à l'état de son orisice, à la conformation du bassin, & à la manière dont l'ensanze se présente dès les premiers temps du travail de

R. On doit observer, 1° quelle est la struction du col de la matrice, asin de prescrire de bonne heure à la semme la position qui lui convient, celle qui peut la mettre dans le cas de tirer le plus d'avantage de ses douleurs; car cette position pe doit pas être la même dans tous les cas (a).

On doit observer, 2° quel est l'état

<sup>(</sup>a) Voyez l'article où l'on parle de la positione de la femme qui est en travail.

de l'orifice, s'il se dilate facilement, si son bord est souple & mince, si les douleurs sont fréquentes & sortes, si le bassini est bien conformé, & comment l'ensantisse présente, asin d'asseoir son jugements sur la durée du travail nécessaire à l'accouchement, & sur la manière dont il se terminera; car il doit s'opérer d'autantisplus promptement & plus facilement, que toutes ces choses se présenteront plus favorablement.

### SECTION II.

Du régime & des remèdes généraux qu'il. convient de prescrire dans le cours du travail.

D. INDIQUEZ-NOUS le régime qu'on doit. faire observer à la semme pendant le cours de.

son travail.

R. Ce régime doit être différent, selon que le travail est plus ou moins violent, & qu'il doit se soutenir plus ou moins de temps pour opérer l'accouchement. On ne permettra aucune espèce d'alimens, lorsque le travail sera de grands progrès, & que l'accouchement sera au moment de se terminer; mais on soutiendra les sorces de la semme par quelques tasses de bouillon, même par de légers potages, si

Jur l'Art des Accouchemens. 205 les douleurs ne font que commencer, si elles se répètent rarement & avec peu de violence; en un mot, si le travail doit

être long sans être pénible.

On ne permettra dans aucun cas l'usage des liqueurs spiritueuses, telles que l'eaude-vie, l'eau des Carmes, &c. même du vin chaud avec la cannelle; comme on en donne si tréquemment encore aux semmes du peuple, à dessein de les fortisser, & d'animer leur travail. Ces liqueurs raréfient le sang, augmentent son mouvement, développent la chaleur, disposent la femme à l'hémorrhagie, ainsi qu'à d'autres accidens. Cet usage ne sauroit être toléré qu'à l'égard d'un très-petit nombre de semmes, qui ont besoin de légers cordiaux: alors on doit préférer quelques cuillerées de bon vin rouge.

La boisson ordinaire des semmes en travail doit être tempérante & ratraîchissante. Ce sera de l'eau de chiendent, de l'eau commune avec du sucre, ou avec quelques syrops, tels que celui de limon, de verjus, de groseilles, &c. Le vin avec de l'eau convient moins que ces boissons; parce qu'il s'aigrit dans l'estomac, & excite le vomissement, auquel la violence du travail n'expose que trop certaines

femmes.

On observera qu'il n'y ait dans la chambre de la semme que les personnes absolument nécessaires; pour qu'il s'y fasse moins de bruit, que l'air n'en soit pas trop rarésié & trop chargé de vapeurs animales. On y sera peu de seu, même en hiver, pour prévenir les mêmes inconvéniens; & on ouvrira une croisée, ou la porte, de temps en temps, pour que l'air puisse se remouveller.

D. Quels sont les remèdes généraux qu'on doit employer dans le cours du travail de

l'accouchement?

R. Il est presque toujours utile de faire administrer un lavement dans le commencement du travail, & même deux, si la femme n'a pas été à la selle depuis quelque temps; afin d'évacuer les matières durcies & amoncelées dans les gros intestins. On emploiera à cet esset l'eau commune, la décoction de graine de lin, ou celle des herbes émollientes.

Il n'est pas moins salutaire de répéter les lavemens, quand le travail dure longtemps; pour calmer la chaleur & l'irritation qu'éprouvent alors les entrailles.

La saignée du bras paroît indispensable, en certains cas, même celle du pied ou de la gorge. On la sera faire du bras toutes les sois que le travail sera long, que les douleurs se succéderont avec sorce & sans beaucoup de succès, que le ventre de la semme sera douloureux au toucher, qu'elle éprouvera beaucoup de chaleur vers less

fur l'Art des Accouchemens. 207:
reins; que les parties seront sèches, sensibles & chaudes; que le pouls sera plein,
robuste & accéléré; que la face sera rouge
& animée, la tête pesante & douloureuse;
qu'il y aura de l'engourdissement dans les
membres, & une grande propension au
sommeil dans l'intervalle des douleurs,
sans qu'on puisse l'attribuer au besoin réel
de dormir. Si tous ces symptomes ne cèdent
pas à une première saignée, il conviendra
de la réitérer quelque temps après.
La saignée du pied & celle de la gorge

La faignee du pied & celle de la gorge ne doivent être prescrites que par des personnes éclairées, & d'après des circonstances plus graves que celles dont nous venons de parler; telles que des convulsions avec perte de connoissance, l'apo-

plexie, &c.

Les bains, en bien des cas, ne sont pas moins utiles que la saignée; mais ont ne doit les employer qu'après celle-ci, dans quelques-unes des circonstances énoncées. Ils conviennent sur tout aux semmes qui sont d'une constitution sèche & irritable; à celles dont les parties naturelles sont étroites, rigides & peu humestées; à celles dont le ventre est sensible au toucher, & chez lesquelles les douleurs sont aiguës & fréquentes, sans avancer beaucoup la besogne. Les demi-bains & les bains de sauteuil, peuvent tenir lieu de bains entiers dans presque tous ces cas.

208 Principes

Comme les femmes de la campagne ont rarement les moyens de se baigner, & qu'elles sont privées de cette ressource, on y suppléera par des somentations émollientes, tant sur le bas-ventre que sur les parties naturelles, ainsi que par des injections dans le vagin. Ces somentations & ces injections se feront avec la décoction de graine de lin, ou de racine de guimauve, si on ne peut se procurer les plantes suivantes.

Mauves,
Guimauves,
Pariétaire,
Mercuriale,
Bouillon blanc,

de chacune une poignée; qu'on fera bouillir pendant un quart-d'heure dans quelques pintes d'eau.

Indépendamment des fomentations & des injections prescrites, on peut user de cette décoction de la manière suivante. On la mettra dans un bassin dont l'entrée sera très - large, & la semme s'asseyera dessus, pour en recevoir la vapeur. Il vaudroit mieux encore qu'elle soit assis sur ce' bassin, de manière que les parties trempent dans la liqueur même.



### SECTION III.

Du lit & des choses nécessaires pour l'accouchement.

D. QUELLES sont les choses qui peuvent être utiles pendant, ou immédiatement après l'accouchement, & qu'il convient de se pro-curer avant?

R. Il convient d'avoir, pour ainsi dire sous la main, 1°. les linges nécessaires, tant pour la mère que pour l'enfant, ce que l'on appelle communément layette; 2°. de quoi construire le lit de travail, & du linge suffisamment pour y tenir la femme proprement; 3°. des ciseaux pour couper le cordon ombilical, & des cordonnets de fils, longs de sept à huit pouces, pour le lier; 4°. de la pommade douce, de l'huile ou du beurre, pour oindre le doigt , toutes les fois qu'il fera nécessaire de toucher, ainsi que les parties de la femme, quand elles seront sèches & rigides; 5°. de. l'eau commune pour ondoyer l'enfant au cas de danger éminent; de l'eau-de-vie, du vin ou du vinaigre, pour le ranimer, s'il venoit dans un état de foiblesse, &c.; de même que pour la mère, s'il lui furvenoit des défaillances ou une perte.

D. Ne pourroit-on pas se dispenser de ce.

que vous appellez lit de travail?

R. On peut à la rigueur, s'en difpenser, puisqu'il n'est en usage encorer que chez peu de Nations, & qu'en Francer même on ne s'en sert, pour ainsi dire, que dans les Villes. Parmi les semmes de la campagne, les unes accouchent debout, se faitant soutenir par un homme assez robuste; les autres étant assises sur le bord d'une chaise, ayant le corps un peu renversé sur le dos de celle-ci, ou bien étants agenouillées sur un carreau ou coussin, s'appuyant des coudes sur une chaise ordinaire.

Chez quelques Nations, on a des chaifes; plus compliquées, qui ne font destinées; qu'aux accouchemens. Mais on ne trouve; dans aucune de ces positions, ni la commodité, ni les avantages que procure le petit lit; & il seroit à souhaiter que son usage devînt plus général. La semme est plus commodément sur ce lit; elle peut y faire valoir ses douleurs plus essicacement & plus sûrement; la position qu'elle garde alors l'expose à moins d'inconvéniens que les autres, & l'application des secours de l'art s'en fait plus facilement.

D. Comment prépare-t-on ce lit?

R. On préfère un lit-de-sangle à tout autre, & à son désaut, une couchette ordinaire. On y place deux matelas; le

fur l'Art des Accouchemens. 211
premier dans toute sa longueur, & le second plié de manière qu'il ne descende qu'à la moitié de ce lis. On le garnit de plusieurs alaises, ou draps pliés en quarrés longs; on y ajoute un traversin, des draps, une couverture & un oreiller, comme pour un lit ordinaire; & plusieurs attachent à son extrémité une traverse de bois pour appuyer les pieds de la femme.

Lorsqu'on prépare ce lit différemment, & qu'on ne replie pas le second matelas comme nous venons de le recommander, il faut placer fous ce matelas & au milieu du lit, un coussin épais & solide, pour le rendre plus serme & le relever en cet endroit, de manière que les sesses de la femme ne puissent s'y enfoncer profon-dément; ce qui nuiroit à la sortie de l'enfant, & rendroit d'une application plus difficile les secours qu'il convient souvent d'administrer dans ce dernier temps du travail.

Les femmes indigentes, comme le font la plupart de celles de la campagne', ne peuvent se procurer toutes ces commodités : mais elles ont toutes des paillasses & un lit. On les accouchera sur le bord de celui-ci, disposé & garni de manière qu'elles ne soient pas obligées d'en descendre après leur délivrance pour le refaire.

D. Quel est le temps du travail où it

R. La plupart ne se mettront sur ce lit qu'autant que les douleurs seront fréquentes & fortes, & que le travail sera prêt à se terminer; à moins qu'elles ne desirent s'y, placer plutôt, pour leur plus grande commodité.

Les femmes délicates & foibles; celles qui font menacées d'accidens, comme perte de fang, descente de matrice, &c., doivent être couchées pendant tout le travail.

Celles dont la matrice est située très-obliquement se placeront aussi de meilleure heure sur le lit; & elles y garderont une position dissérente, selon l'espèce d'obliquité que présentera la matrice. Elles se tiendront couchées sur le dos, quand la matrice sera inclinée en devant, & que le ventre tombera sur les cuisses; elles se coucheront sur le côté gauche, lorsque l'obliquité sera du côté droit; & sur le côté droit, quand l'obliquité sera du côté gauche. Toutes ces semmes se mettront sur le dos dans le dernier moment de l'accouchement, & elles observeront de se tenir le siège un peu élevé.

Elles feront couvertes au moins d'un drap, quand il fera chaud; & de plus d'une bonne couverture, si c'est en hiver. La

fur l'Art des Accouchemens. 213 décence exige qu'on les accouche ainsi à couvert.

On leur recommandera de relever les genoux, & de les écarter médiocrement pendant chaque douleur; & lorsqu'elles seront obligées de pousser en en bas, ou de faire des essorts, deux personnes, ou une seule, sixeront les pieds, & appuieront les genoux, tandis que la semme s'accrochera des mains au bord des matelas, pour y trouver un autre point d'appui. La semme ne doit avoir aucune ligature sur le corps, ni jarretières, ni collier, dans le temps où elle est obligée de se livrer à de grands essorts.

D. Doit-on approuver l'usage trop général encore, de faire marcher la femme, de la tenir debout, de la traîner en quelque sorte, en la tenant sous les bras, jusqu'au dernier moment du travail?

R. Non: on ne doit point approuver cet usage. On permettra à la semme de se promener dans la chambre autant qu'elle le desire, quand les circonstances n'exigent pas qu'elle reste au lit; mais il y a autant d'inhumanité que d'ignorance, à la traîner par la chambre & à la faire marcher jusqu'au dernier moment, uniquement dans la vue d'augmenter ses douleurs & d'accélérer l'accouchement.

## SECTION IV.

Des secours dont la semme peut avoir besoin dans les derniers temps de l'accouchement.

D. QUELS sont les secours qui peuven être nécessaires dans les derniers temps di travail?

R. Ces secours se réduisent encore : très-peu de chose, lorsque tout se passe de la manière la plus ordinaire & la plu. avantageuse. On touchera la semme de temps à autre seulement, pour juger de progrès du travail, & de la marche de la tête de l'enfant. On évitera de le faire trop souvent, & sur-tout de ne jamai. porter plusieurs doigts sans nécessité dan le vagin. Ces attouchemens fréquens & Sans méthode, sont non-seulement inu tiles, mais encore nuisibles; ils irritent & dessechent les parties, en les dépouillan des mucosités destinées à les lubrifier; il. rendent ces parties douloureuses, les dif posent à l'inflammation, & retardent l'accouchement. Il faut toucher avec soin & ne jamais porter le doigt, qu'on n l'ait bien enduit de beurre, ou de tou autre corps gras.

D. N'est-on pas quelquesois obligé d'ouvri

la poche des eaux?

fur l'Art des Accouchemens.

R. Il est des cas, en effet, où les membranes sont si denses & si fortes, qu'elles ne peuvent s'ouvrir d'elles - mêmes, & qu'en résistant trop long-temps aux esforts de l'accouchement, elles le retardent singuliérement. On doit les déchirer dans ces sortes de cas, & faire écouler les eaux; mais il faut choisir le moment favorable. Il y aura toujours moins d'inconvéniens à dissérer l'ouverture de la poche des eaux, que de le faire prématurément.

D. Quel est donc l'instant où l'on doit

ouvrir la poche des eaux?

R. On ne le fera qu'autant que les douleurs se soutiendront avec sorce, & se répéteront souvent; que l'orifice de la matrice sera bien dilaté, & son bord d'ailleurs assez souple pour qu'il puisse se dilater encore davantage, si les circonstances l'exigent. En procurant alors une issue aux leaux, les douleurs en deviendront plus expulsives, & l'accouchement se terminera plutôt.

Ce n'est que dans un cas de perte abondante, qu'il est permis d'ouvrir la poche des eaux avant le temps que nous venons d'assigner; comme nous l'observerons dans

la fuite.

D. Comment doit-on ouvrir la poche des

R. On introduit le doigt dans l'orifice de la matrice jusqu'aux membranes; on attend

qu'elles soient sortement distendues, ce qu n'a lieu que dans la violence de la douleur & on les crève, ou bien on les déchire, en appuyant de l'extrémité de ce doigt.

Lorsqu'on ne peut les déchirer dans une première douleur, on en attend une seconde, puis une troissème, pour faire de nouvelles tentatives, jusqu'à ce que l'or y soit parvenu.

D. Est-il toujours possible d'ouvrir la pocht

des eaux de cette manière?

R. Non: il y a des cas où l'on ne peut y parvenir, soit parce que les membranes sont trop épaisses, trop denses ou trop celluleuses, soit parce qu'elles ne se distendent pas assez pour se crever contre le bout du doigt qu'on leur opposes

Dans le cas où les membranes sont épaisses, celluleuses, & ne se distendent pas assez dans la violence de la douvleur, pour qu'on puisse les déchirer comme on vient de le recommander, on doit les assoillir en les raclant du bout de l'ongle; & après avoir diminué leur épaisseur, on les crève à l'ordinaire.

Quand elles sont si dures & si compactes, qu'elles résistent au doigt comme aux essonts de l'accouchement, quelques bonnes semmes sont dans l'usage de les ouvrir avec un grain de sel adapté, nous ne savons comment, à l'extrémité du doigt; ou bien avec une pièce de monnoie;

fur l'Art des Accouchemens. 217
noie, connue sous le nom de six liards;
d'autres se servent de la pointe de leurs
riseaux.

Si les membranes étoient assez dures pour qu'on ne puisse les percer avec le doigt dirigé convenablement, on attendroit que la poche des eaux se sût engagée jusqu'à l'entrée du vagin, ce qui arrive toujours un peu plutôt ou un peu plus tard; & si l'on ne pouvoit alors la pincer de l'extrémité du pouce & de l'index pour la déchirer, on l'ouvriroit avec la pointe des ciseaux.

Ceux qui ont souvent employé le grain de sel, la pièce de monnoie ou les ciseaux, pour ouvrir les membranes, ont manqué de méthode dans les tentatives qu'ils avoient saites au moyen du doigt seul; car il est bien rare qu'on ne puisse

y parvenir de cette manière.

D. En admettant qu'il y ait des cas oùt il faille se servir d'instrumens pour ouvrir les membranes, qu'elles sont les précautions qu'il faut prendre pour ne pas blesser la semme

ou l'enfant?

R. Il faut bien prendre garde, dans ces sortes de cas, de ne porter l'instrument que sur les membranes. Des personnes peu instruites pourroient, en quelques occasions, le porter sur l'enfant même, ou sur quelques parties de la mère, si elles

K,

n'y faisoient pas la plus grande attention ?

voici quelles sont ces occasions.

nêmes dans le cours du travail, laissent quelquesois échapper si peu d'eau, qu'on a peine à se persuader qu'elles se soient ouvertes. Si la tête de l'enfant s'engage dissicilement alors, le cuir chevelu se tumésie, dépasse bientôt du côté du vagin le bord de l'orifice de la matrice, & forme une tumeur lisse, tendue & élastique, qui a quelque ressemblance avec la poche des eaux, & sur laquelle on pourroit agir du bout de l'ongle, ou de la pointe des ciseaux, si l'on n'y prenoit pas garde.

2°. D'autres fois la tête de l'enfant engagée dans le bassin s'y trouve comme enveloppée par la partie antérieure & inférieure de la matrice, qu'elle a poussée au-devant d'elle; tandis que l'orisice est resté fort en arrière du côté du sacrum, & qu'on ne peut y atteindre que dissicilement. Des personnes peu attentives peuvent encore prendre cette espèce de coeffe pour les membranes, & s'essorcer de la déchirer, soit au moyen de l'ongle, soit autrement.

Pour se mettre à couvert de pareilles fautes, il est important de bien s'assurer de l'état du col de la matrice, & de promener le doigt sous le bord de l'orisice,

Jur l'Art des Accouchemens. 219 avant d'essayer de percer ou de déchirer les membranes.

D. Que faut-il faire lorsque les douleurs se ralentissent & s'affoiblissent dans le cours du travail, au lieu d'augmenter graduellement; soit avant, soit après l'ouverture de

la poche des eaux?

R. Le parti le plus fage & le plus conforme au vœu de la nature, est d'attendre que le travail se ranime de lui-même. La femme a besoin de repos, il faut lui en accorder; la matrice est lasse d'agir, il convient qu'elle répare ses forces. Nous avons déjà proscrit l'usage des liqueurs spiritueuses, & des élixirs, qu'on donne aux femmes pour animer leur travail nous condamnerons de même toutes efpèces de potions médicinales; ainsi que les lavemens irritans, composés d'eau & de vinaigre, d'une dissolution de sel marin, d'urine pure, ou de décoction de fené, qu'on administre encore si souvent. Des frictions légères, faites avec la main sur le ventre de la femme, & des serviettes chaudes appliquées sur cette partie; voilà tout ce qu'il est permis de faire pour ranimer les douleurs languissantes, après que l'on a accordé le repos nécessaire.

D. Quelle est la conduite que doit tenir l'Accoucheur après l'ouverture de la poche des eaux, quand le travail se soutient avec

force ?

R. On touchera la femme de nouveau; pour s'affurer de la position de l'enfant; & de la direction selon laquelle la tête s'engage, si c'est elle qui se présente. Quand les choses sont bien disposées, on laisse agir la nature, on encourage la semme, & on l'excite à faire quelques efforts pendant les douleurs. Lorsque l'enfant se présente disséremment, on prosite de l'instant où les eaux s'écoulent, pour le retourner comme il convient.

D. Doit - on exciter toutes les femmes à faire valoir leurs douleurs, c'est-à-dire, à faire des efforts dans le moment dont il s'agit?

R. Non: si la plupart des semmes peuvent alors exercer ces essorts sans inconvéniens; si elles peuvent les proportionner à l'état de leurs forces, & au desir qu'elles ont de se délivrer; il en est quelques-unes auxquelles on doit interdire ces essorts, ou du moins recommander de les modérer, parce qu'ils pourroient leur devenir nuisibles.

D. Quelles sont les semmes qui ne peuvent, sans inconvéniens, exercer de pareils efforts, ou qui seroient bien de les modérer?

R. Ce sont celles qui ont des descentes habituelles, soit de l'ombilic, soit des aînes; celles dont le col de la matrice pourroit être poussé au - dehors avec la tête de l'enfant; celles qui sont sujettes

au crachement ou au vomissement de fang; celles en qui on soupçonne des anévrismes cachés; celles qui se plaignent d'avoir la tête lourde & douloureule, & qui sont menacées de coup de sang ; parce que d'aussi violens efforts dans tous ces cas, peuvent avoir des suites sâcheuses. Il seroit même avantageux que les semmes dont nous venons de faire mention n'en exerçassent aucun; mais comme elles ne peuvent s'en abstenir, elles ne doivent en faire que de légers : elles se délivreront plus lentement, mais elles le feront plus sûrement.

D. Que faut-il faire quand il existe une de ces descentes dont vous parlez, de même que dans le cas où la femme est menacée de celle de la matrice, dans le cours du travailde l'accouchement?

R. Il faut réduire la descente, quand elle peut être réduite, & appliquer sur l'endroit même une petite pelote de linge, qu'on soutiendra de plusieurs doigts pendant les efforts de la femme, pour que la descente ne reparoisse pas. Quand on ne peut réduire la descente, on recommande à la femme de ne faire que de légers efforts, pour que la tumeur ne s'augmente pas.

Lorsqu'on s'apperçoit que le col de la matrice est poussé très en avant par la

tête de l'enfant, on le soutient de plusieurs doigts introduits à l'entrée du vagin, & convenablement écartés, jusqu'à ce que la tête l'ait traversé.

- D. Quelles font les attentions qu'on doit avoir quand la tête de l'enfant est parvenue dans le fond du bassin?
- R. On s'occupe spécialement en ce moment, de ce que l'on appelle vulgairement la préparation des parties. On porte souvent des corps gras à l'entrée du vagin, & on en enduit extérieurement le périnée, ainsi que les bords de la vulve. On peut encore appuyer d'un doigt bien graissé, introduit à l'entrée du vagin, sur la commissure inférieure des grandes lèvres, comme pour élargir le passage; mais on ne le fera qu'avec ménagement, & seulement, dans l'intervalle des douleurs, ou des essonts qu'exerce la femme.

On recommande à la femme de ne faire ces efforts qu'en soulevant un peu les sesses, et en les écartant du lit, dans l'épaisseur duquel elles sont presque tou-jours ensoncées, de manière que la vulve ne sauroit s'ouvrir au passage de la tête de l'ensant. Si la semme n'est pas assez sorte, ou assez courageuse pour se soulever d'elle même dans le temps de la douleur, deux personnes la souleveront un peu au moyen d'une serviette plice.

fur l'Art des Acçouchemens. 223 en long, & placée fous les lombes (a).

D. Que doit - on faire quand la tête de l'enfant commence à s'engager dans la vulve?

R. Souvent on a peu de chose à faire dans ce moment. Lorsque les parties de dans ce moment. Lorsque les parties de la femme sont souples, humides & bien disposées au passage de l'enfant, on borne ses soins à soutenir légérement le périnée au moyen de la main, pour que la tête ne passe pas trop précipitamment, & ne sasse passe de déchirure. Non seulement on soutient le périnée avec la même attention, toutes les sois que la douleur se sait semme de modérer ses efforts inscrib ca femme de modérer ses efforts, jusqu'à ce que l'extrémité occipitale de la tête de l'enfant puisse s'avancer librement dans la vulve : alors on lui permet de faire valoir un peu plus ses douleurs, tandis que de la main appuyée contre le périnée, on favorise la sortie de la tête, en la relevant vers le pubis, jusqu'à ce que la face soit complétement dégagée.

D. Dans quels cas la tête de l'enfant; poussée en avant pendant la douleur, au point

K iv

<sup>(</sup>a) On accorde le même secours à la semme; quand elle éprouve des douleurs satigantes du côté des reins; & ce secours la soulage beaucoup.

de paroître à la vulve, remonte-t-elle, où

femble-t-elle rentrer après cette douleur?

R. La tête s'avance & remonte ainfit alternativement, toutes les fois que les parties extérieures de la femme sont peut disposées à lui donner issue; cet effet se remarque spécialement lors d'un premier accouchement, & se répète à l'égard de quelques semmes, pendant des heures; entières.

D. A quoi doit-on attribuer cette rentrée: de la tête après chaque douleur; & que doit:

faire l'Accoucheur en pareil cas?

R. La plupart des Praticiens l'attribuent: aux circulaires que le cordon ombilicall forme sur le col de l'ensant. Dans leur opinion, c'est le cordon distendu & tirraillé pendant la douleur, qui pousse la tête en avant, qui retire cette tête vers le dedans du bassin, dès que cette douleur discontinue. Mais on ne doit attribuer cet: effet qu'à la réaction des parties extérieures de la semme, & sur-tout du périnée.

La rentrée de la tête de l'enfant, ou son éloignement après chaque douleur des derniers temps du travail, ne prescrit rien, si ce n'est d'humecter & de relâcher les parties de la semme, asin d'en diminuer la résistance. Mais on ne doit alors recourir à aucun des moyens proposés par les Auteurs, pour empêcher la tête de s'éloigner. L'entortillement du cordon.

fur l'Art des Accouchemens. 225 ombilical sur le col de l'enfant n'exige d'attention qu'après la sortie de la tête même.

D. Quelles sont les précautions qu'exige alors cette disposition du cordon?

R. Quand le cordon ombilical est ainsi disposé sur le col de l'ensant, les circulaires qu'il décrit peuvent se ferrer assez après la sortie de la tête, pour étrangler les vaisseaux du col, & donner lieu à l'engorgement du cerveau, au gonslement & à la lividité de la face; ou bien le cordon conserve alors si peu de longueur, que le placenta peut en être tiraillé & détaché, ou qu'il peut entraîner le sond de la matrice, à mesure que le tronc de l'ensant se dégage.

Pour éviter ces inconvéniens, on développera le cordon, en faisant passer un des circulaires sur la tête de l'enfant, & le conduisant de l'occiput vers la face, toutes les sois qu'on le pourra, à l'instant de la sortie de cette tête; autrement on coupera ce cordon, avant d'essayer de dégager les épaules, & d'extraire le corps.

D. Doit-on extraire le tronc de l'enfanc en tirant sur la tête, dès qu'elle est au-dehors?

R. Quoique l'expulsion du tronc de l'enfant puisse s'opérer par les seuls essorts de la nature, comme se fait l'expulsion de la tête, on est dans l'usage de l'ex-

traire; & on épargne quelques douleurs. à la femme au moyen de cette précaution.

Pour extraire le corps, on commence par tourner la face de l'enfant vers l'une des cuisses de la femme, & toujours vers celle où elle semble se diriger naturellement. On saisit la tête au moyen des deux mains placées sur ses côtés, & ontire légérement dessus, en la portant d'abord un peu en en bas, puis en la relevant, pour saire descendre les épaules successivement. Mais avant d'exercer de pareils efforts sur la tête, on examinera si l'une des épaules se trouve sous le pubis, & l'autre vers le facrum; & on leur donnera cette position, si elle n'avoit pas lieu; car c'est dans cette direction qu'elles doivent traverser le détroit insérieur & la vulve.

On ne s'efforcera jamais de faire prendre cette position aux épaules, en roulant la tête, qui est au-dehors; parce qu'on pourroit faire éprouver au col de l'enfant une torsion dangereuse, avant de les déplacer d'une seule ligne. C'est au moyen du doigt introduit à l'entrée du vagin, & appliqué successivement à l'une & à l'autre épaules, qu'on doit les placer convenablement.

On ne doit jamais se permettre de tires

sur l'Art des Accouchemens. 227
avec force sur la tête de l'ensant, pour extraire le tronc, à moins qu'on n'ait déjà la certitude de sa mort; parce qu'on le feroit mourir, s'il étoit vivant, en se conduisant de cette manière. Pendant qu'on tirera avec ménagement sur la tête de l'ensant, on engagera la semme à pousser de toutes ses sorces; & lorsque les épaules ne descendront pas au moyen de ces essorts combinés, on introduira l'index de l'une & l'autre main sous les aisselles, pour s'en servir en manière de crochets.

Nous observerons qu'on rencontre rarement autant de difficulté à extraire les épaules.

#### SECTION V.

Des soins qu'on doit à l'enfant immédiatement, après sa naissance.

D. QUELS sont les premiers soins qu'on doit à l'enfant à l'instant de sa naissance?

R. On doit le coucher transversalement sur l'un de ses côtés entre les jambes de sa mère, de manière qu'il ait le dos tourné vers la vulve, & que le cordon ombilical ne soit pas tiraillé. On lui donne cette position, pour que les eaux & le

KV

228 Principes

fang qui découlent de la matrice ne luit tombent pas dans la bouche, qu'il puisse; rendre plus facilement les humeurs muqueuses & glaireuses qui remplissent souvent cette cavité à l'instant où il paroît; & que sa face ne baigne pas dans les eaux. & autres sluides qui inondent le lit. On liera & on coupera le cordon ombilical, & on éloignera l'ensant de sa mère, pour être plus à même de lui donner les secours que son état pourroit exiger.

D. Combien fait-on de ligatures au cordon;

& quelle en est la nécessité?

On est dans l'usage d'en faire deux, & de couper le cordon entre elles; de sorte qu'une de ces ligatures se trouve à la portion de cordon qui reste à l'enfant, & la seconde sur le bout qui répond au placenta. Par la première, on se propose d'empêcher le sang de l'ensant de sortir par les artères ombilicales; & par la seconde, de prévenir l'issue de celui de la mère par la veine du cordon.

D. Ces ligatures sont-elles absolument né-

cessaires?

R. Celle qu'on place sur le cordon du côté du placenta est absolument inutile; parce que le sang de la mère ne peut se perdre par cette voie; si ce n'est peut-être en quelques cas excessivement rares, & dans lesquels cette ligature ne convien-

fur l'Art des Accouchemens. 229
besit pas encore (a). Elle paroît en général plus nuisible que nécessaire; en ce que s'opposant au dégorgement des vaisseaux du placenta, ce corps en conserve plus de volume, & doit éprouver plus de difficulté à sortir.

La ligature qui se fait du côté de l'enfant, sans être essentiellement nécessaire
dans le premier moment de la naissance,
peut le devenir tellement dans la suite,
qu'il y auroit de l'impéritie à l'omettre,
comme à ne pas la faire avec toute l'attention possible. Mais le moment de pratiquer cette ligature n'est pas indisserent,
& ne sauroit être le même à l'égard de
tous les ensans.

D. Quel est donc le moment où l'on doit

lier le cordon?

R. Lorque l'enfant respire librement en naissant, qu'il s'agire & remue avec aisance, on peut lier le cordon aussi-tôt. Dans ce même cas, on peut également couper le cordon, & ne le lier qu'un instant après; l'ensant perdra peu de sang, si la respiration continue de se faire aisément.

Lorsque l'enfant a été long-temps exposé à l'action de la matrice après l'évacuation des eaux de l'amnios, parce qu'il

la matrice: on ne peut les exposer ici.

Principes . 230

a rencontré beaucoup d'obstacles à traverse; le bassin; lorsqu'il vient avec la face tuméfiée, brune ou livide, il faut couper le cordon, & ne le lier que quand il en sera sorti au moins deux cuillerées de fang. La ligature avant ce moment, seroit nuisible à l'enfant, & ne feroit qu'entretenir, même aggraver l'état dans lequel il est né.

Lorsque l'enfant vient au monde foible; décoloré, & qu'il respire avec peine, il faut conserver le cordon entier pendant quelques instans, si les pulsations y sont fortes & fréquentes; & ne le lier & le couper, que quand la respiration sera plus facile.

D. A quelle distance de l'ombilic doit-on! lier le cordon, & quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour bien faire cette!

ligature?

R. Il est assez indifférent de lier le: cordon plus près ou plus loin du ventre,, puisque ce n'est jamais dans le lieu de la ligature qu'il se détache de l'ensant, &: qu'il le sait constamment sous les tégumens même de l'ombilic. Comme le vulgaire est dans l'opinion que l'ombilic est: plus faillant ou plus enfoncé, après la chûte du cordon, selon qu'on a lie celuici très loin ou très-près du ventre; comme il attribue à la même cause les ulcérations & les hernies de cette partie, &.

fur l'Art des Accouchemens. 231, nous taxe à cet égard d'inattention ou d'impéritie, nous lierons le cordon à deux ou trois travers de doigt du ventre de l'enfant, pour prévenir toutes espèces de reproches.

Quant aux précautions que nous devons observer, elles consistent à serrer suffifamment la ligature pour s'opposer au passage du sang, dans le cas où il seroit forcé de répandre son cours vers les vais-

feaux ombilicaux.

Quelques Accoucheurs ont recommandé de blanchir le cordon avant de le lier, c'est-à-dire, d'en exprimer le sang, ainsi que le peu d'humeur muqueuse & glaireuse qui en infiltre le tissu. Plusieurs se font fait illusion au point de croire qu'on extirperoit, par ce moyen, le germe de la petite-vérole; d'autres, qu'on préviendroit l'espèce de jaunisse qui survient aux enfans nouveaux - nés dès les premiers jours; ainsi que les gales humides qui couvrent dans la suite le visage de quelques-uns. Quelque ridicules que soient ces opinions, nous nous y conformerons en exprimant le cordon avant de le lier, si les parens de l'enfant le demandent; & nous en ferons fortir le fang & l'humeur glaireuse autant que nous le pourrons, en le pressant avec les doigts garnis de linge.

D. Comment se fait la ligature du cordon 🎅

232 Principes

R. On prépare avant l'accouchement deux ou trois cordonnets composés de plusieurs fils de moyenne grosseur, & longs de sept à huit pouces; & avec l'un de ces cordonnets on lie le cordon avant de retirer l'enfant de dessus le petit lit.

Quand on a donné peu d'attention à cette première ligature, il convient de s'assurer, avant d'emmailloter l'ensant, selle est bien saite, & si elle est assez serrée; souvent il est prudent de la resaire alors.

On fera d'abord un circulaire avec le cordonnet de fil, qu'on ne fixera qu'au moyen d'un nœud fimple, puis un fecond circulaire foutenu d'un double nœud. On pressera le cordon en allant de l'ombilic vers cette ligature, pour voir si elle est assez serrée, & propre à supporter l'effort du fang.

Dans la crainte que cette première ligature, quoique serrée, n'oblitère pas encore complétement les vaisseaux, & ne s'oppose pas assez fortement au passage du sang, quand le cordon est très-gros & infiltré, on en sera une seconde, un peu au dessous, & on la serrera également.

Quoique le sang cesse le plus souvent de couler dans les vaisseaux ombilicaux avant qu'on ne fasse la ligature, quoique ces vaisseaux n'en répandent pas sous nos yeux, quand on les a liés avec peu de soins, on ne sauroit négliger les préfur l'Art des Accouchemens. 233 cautions que nous venons de prescrire, & répéter trop souvent aux Sages-semmes, que nombre d'enfans sont morts d'hémor-rhagie par le cordon; les uns quelques heures après leur naissance, & les autres un peu plus tard.

D. Les premiers soins qu'on doit à l'enfant se bornent-ils à ceux que vous venez

d'indiquer?

R. Ces premiers foins suffisent pour l'instant, quand l'enfant se porte bien; mais il en exige de plus importans, lorsqu'il vient dans un état de soiblesse considérable, ou dans une sorte d'apoplexie, donnant à peine quelques signes de vie, & souvent même n'en manifestant aucun; de manière qu'après l'avoir bien examiné, l'on ne sait s'il est vivant ou mort.

D. Quels sont les secours qu'on doit donner

à l'enfant dans ces divers états?

R. Quand il vient au monde foible, décoloré, ayant les membres flasques, & ne pouvant respirer; en un mot, dans un état de mort apparente, qu'on désigne sous le nom d'asphixie, quelques Praticiens veulent qu'on le tienne chaudement entre les jambes de sa mère, & qu'on ne lie point le cordon ombilical avant qu'il ne se soit ranimé. Si le placenta vient à sortir avant ce moment, quelques Accoucheurs sont dans l'usage de le mettre dans de l'eau chaude, dans du vin, ou bien

fur de la cendre échauffée, pendant qu'or administre à l'enfant les secours convenables. Mais toutes ces précautions sont inutiles, dès qu'il n'y a plus de battemens au cordon. On doit le couper alors à le distance ordinaire de l'ombilic, & le lier si on le juge à propos; la ligature n'étant pas nécessaire dans ce premier moment. Dans ces sortes de cas, on élois gnera l'enfant de sa mère, on le placera sur un oreiller, dans un lieu où l'air plus pur que celui qui règne sous les couvertures du petit lit, ne sera ni trop froie ni trop chaud; & là, on lui administrera les secours suivans.

Une personne saine, adaptant sa bouche à celle de l'ensant y soussilera avec ménagement; pour insinuer de l'air dans le poumon, & l'en sera sortir aussi-tôt, en pressant légérement la poitrine & le basventre au moyen d'une main; ce qu'on répétera plusieurs sois de suite, comme pour imiter la respiration (a). On irritera ensuite l'intérieur du nez au moyen de la barbe d'une plume; ainsi que le dedans de la bouche & du gosier, après en avoir retiré les glaires & les mucosités qui les

<sup>(</sup>a) Il y auroit beaucoup d'observations à saire sur cette respiration artificielle, qui n'est pas aussi essicace qu'on se le persuade, & qui pourroit quelquesois avoir des inconvéniens.

fur l'Art des Accouchemens. 235 remplissent souvent. On frottera les tempes de l'enfant & la région de la colonne épinière, avec un linge trempé dans le vinaigre, ou quelques liqueurs spiritueuses, comme l'eau-de-vie, l'eau de mélisse, l'eau de Cologne, &c. ou bien dans l'eau commune, à laquelle on ajoutera quelques gouttes d'alkali volatil.

Si l'on a sur soi un flacon de cet alkali, on le présentera à diverses reprises sous le nez de l'enfant; & à son désaut, on se servira d'oignons ou d'ail écrasés.

On brossera légérement la plante des pieds, le dedans des mains de l'enfant, & le dos depuis le haut du col jusqu'aux

fesses.

Si ces secours sont inutiles, on infinuera dans l'anus, an moyen d'un instrument convenable, de la sumée de cartes, même celle de tabac. Ensin, on plongera le corps de l'ensant jusqu'aux aisselles, dans un bain chaud animé de vin ou d'eau-devie, &c. & on le tiendra dans ce bain

pendant quelque temps.

On n'épargnera pas ces secours à l'enfant; on les continuera pendant une demi-heure, & au - delà, s'il le faut; car ce n'est qu'après ce temps que bien des enfans ont donné les premiers signes de vie. On en a vu qui ont été plus long-temps encore dans cet état d'asphixie, & qu'on avoit déjà abandonnés comme morts, lorsqu'ils

ont annoncé leur existence par des criplaintifs. La moindre négligence envei ces enfans est une faute impardonnable.

Les fecours qui conviennent à l'enfantt dont la face est gonslée, livide ou noi râtre, sont les mêmes : mais il faut commencer par couper le cordon ombilical & le faire saigner. Si le sang ne coull pas de lui-même, on le fera sortir en l'exprimant en quelque sorte au moyen de doigts, & en pressant le ventre mollement & à diverses reprises : souvent can'est qu'en tenant le corps de l'ensant dans l'eau chaude animée de vin ou d'eau de vie, qu'on obtient du cordon le dégorgement nécessaire (a). Quand cette saignée a fait disparoître la lividité de la sace, on administre les autres secours à l'ensant

D. Indiquez-nous comment on doit prendre l'enfant pour le retirer de dessus le petit lit,

& le transporter ailleurs.

R. On passera une main sous les épaules de l'enfant, de manière que les doigts écartés embrassent l'un des bras près l'aisselle, & les côtés du col; & de l'autre main, on saisira les cuisses, de sorte qu'un doigt soit placé entre elles : le tenant de

<sup>(</sup>a) Nous pourrions confirmer, par de nombreuses observations, l'utilité de tous ces secours, & spécialement du dernier.

sur l'Art des Accouchemens. 237 cette manière, on le porte aussi sûrement

que commodément (a).

D. Lorsque l'état de l'enfant exige cette suite de secours dont vous venez de parler, est-il prudent de passer tout ce temps éloigné de la mère?

R. Non: il feroit même quelquefois dangereux de ne pas s'en occuper de préférence à l'enfant. On se rapprochera de temps à autre de son lit, on s'assurera de l'état de la matrice au moyen d'une main appliquée sur le ventre; on examinera si le sang ne coule pas en trop grande quantité; on épiera, en un mot, le moment de procéder à la délivrance; & on opérera celle-ci, pendant qu'une personne intelligente prendra soin de l'enfant.

<sup>(</sup>a) C'est avec indignation qu'on doit voir certaines personnes saisir l'ensant par un bras ou par une jambe, le soulever ainsi, & le transporter de dessus le petit lit en un autre lieu, ou seulement pour le placer sur un oreiller voisin, ou dans le tablier d'une semme; parce qu'on peut le blesser, & lui luxer cette extrémité.



# CHAPITRE VIII.

## De la délivrance.

D. Qu'ENTENDEZ-VOUS par délivrances
R. On exprime par ce mot la sortis
du placenta & des membranes, comm
on désigne la sortie de l'enfant par le mo
accouchement.

D. Comment s'opère la délivrance?

R. La délivrance, chez la plupart des femmes, s'opéreroit de la même manière que l'accouchement, si on laissoit agir l'anature. Les contractions de la matrice soutenues de quelques efforts ménagés di la part de la femme, suffiroient pour détacher le placenta & l'expulser, ainsi que les membranes.

D. Dans quels cas la femme pourroit-eli

se délivrer seule?

R. La femme pourroit se délivrer seule toutes les sois que l'accouchement n'es suivi d'aucun accident., & que la matrice conserve la faculté de se contracter. Si nous l'aidons à se délivrer, ce n'est que pour lui épargner quelques douleurs, tou jours plus supportables que celles de l'accouchement même, & pour la mettre à même de jouir plutôt du calme auquel elle

aspire: nos secours ne sont pas alors d'une nécessité indispensable. Nous ajouterons même que l'empressement que bien des Sages-semmes apportent encore à extraire le placenta indistinctement dans tous les cas, est plus condamnable que la sécurité de celles qui attendent patiemment l'expulsion de ce corps; parce qu'il y a plus de semmes qui jouiroient de l'avantage de se délivrer seules, qu'il n'en est à qui nos secours sont absolument nécessaires: une délivrance trop précipitée peut avoir d'ailleurs des suites sâcheuses.

D. Exposez quels sont les inconveniens qu'il y auroit à délivrer trop promptement.

R. Par ces mots délivrer promptement, nous n'entendons pas extraire brusquement & rapidement le placenta; mais l'extraire avant le temps marqué par la nature.

Quand on entreprend de délivrer la femme avant ce moment, dans l'opinion où l'on est qu'elle ne sauroit l'être trop tôt, les esforts de la nature n'ayant pas encore détaché le placenta, & l'orifice de la matrice n'étant pas alors des mieux disposés à lui donner issue, on est obligé d'exercer plus de sorces en tirant sur le cordon ombilical, soit pour détacher cette masse, soit pour l'entraîner. Le cordon trop grêle en quelques circonstances pour supporter de pareils essorts se casse, &

l'Accoucheur se croit dans la nécessité des porter la main dans la matrice pour acheverr son opération: ce qui la rend au moins douloureuse, s'il n'en résulte pas d'autres inconvéniens.

Si le cordon résiste à ces efforts, & si l'on entraîne ainsi le placenta, la matrice n'ayant pas eu le temps de se resterrer assez sur elle-même, il peut en résulter une perte de sang plus ou moins abondante, & souvent inquiétante.

Le renversement de la matrice peut être également la suite de ces efforts préma-

turés.

D. Exposez de même les inconvéniens qu'il y auroit à ne pas aider la femme à se délivrer.

R. Nous avons déjà dit qu'il n'y en auroit aucun à l'égard de la plupart des femmes: les contractions de la matrice, après un délai pour l'ordinaire fort court, n'ayant besoin d'être soutenues que de quelques efforts de la semme même, pour détacher & mettre dehors le placenta. Ce n'est qu'autant que l'accouchement est accompagné ou suivi d'accidens, & seulement dans quelques circonstances particulières, qui seront détaillées ci-après, que nous sommes indispensablement obligés de délivrer la semme.

### SECTION PREMIÈRE.

Du temps où il convient d'aider la femme à se délivrer duns les cas les plus ordi-, naires, & de la manière de le faire.

D. QUEL est l'instant où il convient de

proceder à la délivrance?

R. On ne doit entreprendre d'extraire le placenta que lorsque la matrice est bien contractée sur elle-même, qu'elle est réduite à la sorme d'une boule, un peu ferme au toucher, & qu'on la distingue ainsi en palpant au - dessus du pubis; ce n'est ensin qu'autant que la femme éprouve de nouvelles douleurs qui annoncent que la nature s'occupe de la délivrance.

D. Comment doit-on procéder à la déli-

yrance?

R. On prend le cordon ombilical d'une main garnie de linge sec, & l'on tire dessus avec ménagement, en baissant un peu d'abord & en allant alternativement de l'une à l'autre cuisse de la semme, jusqu'à ce que le placenta paroisse à l'entrée du vagin: alors on relève la main en tirant obliquement en en haut. Dans le moment où le placenta franchit la vulve, on le reçoit d'une main placée au-dessous de cette partie, & on le saissit de l'autre pour

Principes

242 achever de le dégager, en le roulant plusieurs fois sur lui - même & sur la main qui le soutient; afin de ramasser les membranes qui le suivent, & de les tordre de manière à leur donner la forme d'une corde. Quand le placenta n'obéit pas aux efforts qu'on exerce sur le cordon, quoique poussé d'ailleurs par ceux de la femme,, il faut attendre & solliciter la matrice: à se contracter plus fortement, en faisant: des frictions sur le ventre au moyen d'une: main.

Quelquesois le placenta se trouve si volumineux, qu'il traverse difficilement le: col de la matrice, malgré les efforts combinés dont on vient de parler, & beaucoup) d'Accoucheurs le supposant alors adhérent,, quoiqu'il soit entiérement détaché, vontt le chercher en portant la main dans les vagin; tandis que les obstacles qui s'op-posent à sa sortie n'exigent que de simpless précautions & un peu de patience.

Dans ce même cas, pendant qu'un aide continuera de faire sur le ventre de la femme les frictions dont nous venons de parler, l'Accoucheur tirera d'une main sur le cordon, & avec plus ou moins de force, selon qu'il sera plus ou moins en état de supporter ces efforts; & de deux doigts de l'autre main introduits à l'orifice de la matrice & derrière la symphise

du pubis, il abaissera le placenta & en

dégagera le bord en premier lieu.

Si l'on s'apperçoit que le cordon ombilical se déchire, se casse & se sépare du placenta, dans le cas dont il s'agit, comme dans tout autre, il saut cesser de tirer dessus, asin de ne pas le déchirer complétement; quoique ce sût plutôt un léger désagrément pour l'Accoucheur qu'un accident pour la semme.

D. Que faudrou-il faire si le cordon ombilical avoit été arraché, où s'il étoit assez foible pour qu'il ne puisse supporter le moindre effort?

R. Ceux qui se sont une loi de délivrer la semme dans tous les cas, ne manquent pas alors de porter la main dans
la matrice pour en extraire le placenta.
Mais le Praticien instruit que la plupart
des semmes peuvent se délivrer, seules,
attend patiemment que les efforts de la
nature aient poussé l'arrière-faix jusques
dans le vagin, & qu'il puisse l'accrocher
de quelques doigts pour le dégager. On
ne doit aller le prendre dans la matrice,
qu'autant qu'il y, a des accidens qui se
demandent; & ce seroit ignorance ou témérité, si l'on n'y étoit pas autorisé par
ces accidens.

### SECTION II.

Des cas qui rendent la délivrance plus difficile, ou qui exigent quelques précautions particulières, relativement au temps & à la manière d'y procéder.

D. QUELS sont les cas dans lesquels on doit s'écarter des règles que nous venons de

prescrire relativement à la délivrance?

R. On doit s'écarter de ces règles toutes les fois que la femme éprouve des accidens à l'instant de l'accouchement, comme lorsqu'il y a une perte, des convulsions, des syncopes ou défaillances; lorsque la matrice tombe dans l'inertie à l'instant de la sortie de l'ensant; lorsque son orifice se contracte trop fortement & se referme en quelque sorte subitement; lorsque le placenta est très-adhérent, qu'il se trouve enkisté ou chatonné, ou bien attaché sur le col de la matrice, & qu'il se présente à l'orifice; ensin, à la suite de l'avortement, & après l'accouchement de pluseurs ensans.

D. Quel est celui de tous ces accidens qui

exige les secours les plus prompts?

R. De tous les accidens qui peuvent: se manisester à l'instant de l'accouchement, auçun ne demande des secours plus; prompts que la perte de fang; parce que la femme peut en être la victime en trèspeu de temps. Comme cet accident provient toujours de ce que le placenta est détaché, soit en totalité soit en partie, & qu'il ne cesse le plus souvent, qu'après la sortie de ce corps, il faut la procurer le plutôt possible.

D. Comment doit on procéder à la délivrance dans un cas d'une perte inquiétante? R. On opérera la délivrance comme

R. On opérera la délivrance comme dans les cas les plus ordinaires, si le cordon ombilical est assez solide pour supporter les efforts nécessaires. On portera la main dans la matrice pour en extraire le placenta, si le cordon est trop soible pour supporter ces mêmes efforts, ou s'il a été arraché.

Dans l'un & l'autre cas, on commencera par faire des frictions un peu fortes avec la main, sur la région hypogastrique de la femme; on y jettera de l'eau bien froide, on y appliquera, ainsi que sur le haut des cuisses, des serviettes mouillées de vinaigre, qu'on renouvellera pendant la délivrance, & même après si la perte continue; asin de ranimer l'action assoiblie de la matrice, & de dissiper l'inertie dont ce viscère est alors assecté.

D. Indiquez-nous les précautions qu'il faut observer, quand on est obligé de porter la main dans la matrice pour opérer la délivrance.

L iij

R. L'introduction de la main se faisant aisément dans le cas dont il s'agit, exige peu de soins; mais la délivrance en demande quelques-uns. Quand le placenta est entiérement détaché, on le saisst convenablement de l'extrémité de tous les doigts, & on l'entraîne en retirant la main. Lorsqu'il n'est détaché qu'en partie, on insinue les doigts derrière la portion qui est libre, & en les avançant ainsi, de manière que le dos de la main regarde la matrice, on détache le reste; après quoi on en sait l'extraction.

Cette manière de détacher le placenta ressemble assez à ce que l'on opère tous les jours pour séparer deux seuilles de papier appliquées l'une à l'autre ; on insinue la main entre elles, pour les désunir sans les déchirer.

Dans le cas de perte, comme en bien d'autres où l'on est également obligé de porter la main dans la matrice, il faut détacher la totalité du placenta avant de chercher à l'extraire; car en tirant sur la portion qu'on trouve en quelque sorte flottante, on pourroit la déchirer, l'amener seule, & laisser le reste : ce qui mettroit dans l'obligation de réintroduire la main, & souvent à plusieurs reprises encore, pour opérer entiérement la délivrance.

D. Quelles sont les précautions qu'exigenç

Jur l'Art des Accouchemens. 247 les convulsions, relativement à la délivrance?

R. Le plus fouvent ce genre d'accidens n'en exige aucunes; parce qu'il ne dépend pas de la rétention du placenta, & qu'il ne peut s'opposer à la sortie de ce corps. Les convulsions ne peuvent retarder la délivrance, que quand elles affectent la matrice comme les autres parties; parce que l'orifice de ce viscère se trouve alors fortement contracté dans ce cas, on attend que la convulsion soit dissipée, que l'orifice de la matrice puisse s'ouvrir librement, & on procède à l'extraction du placenta, comme dans l'état ordinaire.

D. Les syncopes, ou défaillances, qui surviennent quelquesois à l'instant de l'accouchement, prescrivent-elles des indications particulières à l'égard de la délivrance?

R. Quand elles ne sont accompagnées d'aucun autre accident, on dissère la délivrance jusqu'à ce que les sorces de la semme se soient ranimées; & l'on n'administre, en attendant, que les secours qu'on donne dans tous les cas de syncopes. On laisse la semme couchée à plat, on lui frotte les tempes avec un linge trempé dans le vinaigre, ou imbibé d'une liqueur spiritueuse quelconque; on lui fait inspirer de ces liqueurs par le nez; & ae plus, on comprime le bas-ventre avec ménagement au moyen des deux mains.

D. Qu'entendez-vous par inertie de la. matrice; & quelles sont les précautions

qu'exige cet état?

R. L'inertie est un état de soiblesse, ou de diminution d'action, telle que la matrice ne sauroit se contracter sur elle-même, se resserre & se durcir après la sortie de l'ensant, comme elle le sait chez la plupart des semmes. La matrice affectée d'inertie, resse molle & slasque, au lieu de sormer au-dessus du pubis cette espèce de boule solide dont nous avons parlé plus haut.

La matrice est menacée de tomber dans cet état d'inertie, sur-tout après l'accouchement qui se fait précipitamment, sans beaucoup de douleur, & dans lequel l'enfant s'écoule, pour ainsi dire, avec

les eaux de l'amnios.

On ne doit jamais entreprendre d'extraire le placenta avant que l'inertie de la matrice ne se soit dissipée; parce qu'on exposeroit ce viscère à se renverser, ou qu'une perte abondante pourroit suivre la délivrance. On attendra donc que la matrice se soit contractée, & qu'elle sorme dans le sond du bas-ventre ce globe solide, dont il a été question ci-dessus. Le délai, pour l'ordinaire, n'est pas sort long, si l'on fait des frictions au-dessus du pubis, comme elles ont été recommandées.

Quand l'inertie de la matrice est ac-

fur l'Art des Accouchemens. 249 compagnée d'une grande effusion de sang, on délivre la semme en suivant les règles prescrites à l'occasion de la perte.

D. Quelles sont les précautions qu'exige le ressertement extraordinaire de l'orifice de la matrice, relativement à la délivrance?

R. Oe resserrement extraordinaire du col de la matrice s'observe rarement à la suite d'un accouchement à terme, mais assez fréquemment dans les avortemens qui ont lieu dès les premiers mois de la grossesse. Quand il existe après un accouchement à terme, il ne peut durer que peu de temps; & il n'exige d'autres précautions que celles de disserre la délivrance, jusqu'à ce que l'orifice paroisse disposé à s'ouvrir de nouveau.

D. Comment peut-on s'assurer que le placenta est fortement attaché à la matrice?

R. On ne juge assez souvent des adhérences du placenta que d'après les dissipultés qu'on éprouve à l'extraire, en tirant sur le cordon ombilical; & l'on ne s'apperçoit pas que ces dissicultés ne dépendent presque toujours que de la contraction & du resserrement du col de la matrice : car ces adhérences extraordinaires sont excessivement rares. On ne peut les reconnoître & les apprécier qu'en portant la main dans la matrice.

D. Que faut-il faire quand on a reconnis

que ces adhérences ont lieu?

R. Lorsqu'on ne peut opérer la délivrance en tirant méthodiquement sur les cordon, & qu'on est certain que les dissicultés ne proviennent pas du resserrements du col de la matrice, on introduit la maint avec soin, on examine si le placenta y est: encore attaché, soit dans sa totalité out dans une partie seulement; & l'on essaie: de le détacher & de l'extraire.

Quand le placenta est encore lié de toutes parts à la matrice, on fait ensorte de l'en séparer dans un point quelconque de son bord; on insinue les doigts derrière la portion qu'on a détachée, en prenant garde de ne pas blesser la matrice, & l'on continue de le séparer ainsi dans son entier.

Quand le placenta est détaché d'un côté, avant qu'on ne porte la main dans la matrice, la délivrance présente moins de difficultés.

Il arrive quelquefois qu'il est adhérent étroitement dans toute l'étendue de son bord, & que le milieu en a été d'étaché par les esforts de la nature, de concert avec ceux que l'Accoucheur a exercés sur le cordon ombilical. Si la portion détachée forme une saillie assez considérable pour qu'on puisse la pincer du bout des doigts, on tire dessus pour essayer de détacher le reste; & quand on ne peut y par-

fur l'Art des Accouchemens. 25 16 venir de cette manière, il faut encore chercher à séparer le bord du placenta d'un côté, pour insinuer ensuite la main ou les doigts seulement, derrière cette masse, comme on vient de le recommander.

Dans tous les cas, nous le répéterons, on ne doit entreprendre de l'extraire qu'après l'avoir détaché entiérement; afin de ne pas s'exposer à en laisser quelques lain-

beaux dans la matrice.

D. Existe-t-il des cas où il soit impossible de détacher le placenta, même au moyen de la main introduite dans la matrice; & s'il en existe, comment l'Accoucheur doit - il se

comporter?

R. Ces cas doivent être excessivement rares: mais il en est qui offrent tant de difficultés, qu'ils exigent toute la sagacité d'un Praticien consommé. On ne sauroit trop inviter les Sages-femmes à ne

point s'en charger seules.

Dans ces cas où le placenta est lié si étroitement à la matrice qu'on ne peut entreprendre de l'en détacher, sans craindre d'en laisser quelques lambeaux, ou de déchirer la matrice même, il vaut mieux l'abandonner aux foins de la nature pendant quelque temps, que de s'efforcer de l'extraire dès le premier moment. Nous en excepterons cependant le cas où la femme éprouve une perte abondante; mais s'il faut alors opérer la délivrance, on

LY

252 Principes
on n'y trouve plus autant d'obstacles ;
puisqu'une partie du placenta est détachée.

D. N'est-il pas plus sage, en quelques circonstances, de laisser une portion de placenta dans la matrice, que de s'efforcer da. l'extraire en entier?

R. Oui : il existe quelques - uns de ces cas, mais ils sont très-rares. Lorsqu'une portion du placenta est dure, squirreuse, & si intimément attachée à la matrice, qu'on ne peut l'en féparer sans. craindre de déchirer ce viscère; il vaut mieux la laisser, que d'exposer la semme aux suites d'une pareille déchirure.

D. Que deviendra cette portion de placenta, qu'on ne peut extraire? Que deviendra le placenta lui-même dans les cas où de fortes adhérences s'opposent à la délivrance?

R. La nature s'en délivrera dans l'un & l'autre cas, & souvent sans qu'il en résulte de grands inconvéniens pour la femme. L'espèce de sonte putride que le placenta, ou la portion qu'on a laissée, ne tarde pas à éprouver, en relâchera les adhérences, & les détruira même; l'action de la matrice poussera ce corps en avant, & souvent même les expulsera; mais elle le fera plutôt ou plus tard, selon les circonstances.

D. Quelle conduite doit-on tenir envers la femme dans ces sortes de cas?

R. Les femmes qu'on ne peut délivrer

immédiatement après l'accouchement, se croyant menacées d'une soule d'accidens plus fâcheux les uns que les autres, nos premiers soins doivent consister à les rassurer contre de pareilles craintes, & à leur faire comprendre qu'il y auroit bien plus de danger à les délivrer à quelque prix que ce sût: du reste on règle la conduite qu'on doit tenir d'après les circonstances qui se présentent. Lorsque le ventre se tend & devient douloureux, on emploie les bains & les somentations émollientes; on prescrit des boissons délayantes & adoucissantes, telles que l'eau de veau, de poulet, de graine de lin, de pariétaire, &c. & l'on administre des lavemens de même espèce.

Lorsque le placenta se putrésie, & que les lochies deviennent bourbeuses, noirâtres & sœtides, on fait des injections, plusieurs sois le jour, dans la matrice même; on injecte de la décoction d'orge, de camomille romaine, de quinquina, ou de toutes autres substances anti-putrides. On attend que le placenta soit détaché, qu'il se présente à l'orifice de la matrice, & l'on en fait l'extraction. On continue les injections jusqu'à ce que les vuidanges soient d'une bonne qualité, &c. On administre intérieurement les anti-putrides, & l'on prescrit le régime le plus propre à en seconder les essets.

Principes

On ne doit donner aucune de ces boiffons, & de ces potions échauffantes, auxquelles on accorde la propriété de chasser le délivre; parce qu'elles ne feroient qu'augmenter les accidens.

D. Qu'entendez-vous par placenta chatonné ou enkissé; & comment doit-on alors opérer la délivrance?

R. Le placenta est chatonné ou enkisté; toutes les fois qu'au moment de la déli-vrance, on le trouve comme renfermé dans une espèce de poche distincte de la cavité principale de la matrice, dont elle fait cependant partie & avec laquelle

elle communique.

Pour avoir une juste idée du chatonnement du placenta, il faut supposer que la contraction de la matrice, aussitôt après la fortie de l'enfant, est tellement irrégulière, que la cavité de ce viscère en est partagée comme en deux parties ; dont l'une est située tantôt à côté de l'autre, & tantôt au-dessus: le placenta doit alors se rencontrer dans l'une de ces cavités.

On procède à la délivrance dans ce cas comme dans les autres, c'est à-dire, en tirant méthodiquement fur le cordon ombilical; & quand on ne peut extraire le placenta par ce moyen, on introduit la main dans la matrice. Lorsque le placenta est chatonné, la main se trouve

d'abord dans une cavité assez peu spacieuse, à l'un des côtés de laquelle se remarque une ouverture plus ou moins grande, que traverse le cordon ombilical, si on ne l'a point arraché. On insinue les doigts successivement dans cette ouverture, en la dilatant convenablement, & on les avance jusqu'au placenta, pour le détacher & l'extraire comme dans la plupart des autres circonstances.

Après la délivrance, on reporte la main dans la matrice & l'on introduit les doigts de nouveau dans l'entrée de la bourse qui contenoit le placenta; on tient l'entrée de cette bourse très-ouverte, afin que la matrice se contracte réguliérement & ne forme ensuite qu'une seule cavité, comme elle le fait après l'accouchement le plus

ordinaire.

D. A quels signes reconnoît-on que le placenta est attaché sur le col de la matrice,

de manière qu'il en recouvre l'orifice?

R. Le toucher seul peut nous faire distinguer ce cas de tous les autres. Au lieu de membranes lisses & unies que touche le doigt introduit à l'orifice de la matrice, c'est alors un corps mollasse & spongieux, d'où le sang découle abondamment. Une perte abondante, d'ailleurs, précède toujours le moment de l'accouchement, quand le placenta est attaché sur le col de la matrice.

256 Principes

D. A quel terme de la grossesse la perte se manifeste-t-elle dans ce cas?

- R. Elle s'annonce quelquefois du fixième au feptième mois, plus fouvent dans le cours du huitième, & chez certaines femmes, ce n'est que vers les dernières femaines de la grossesse feulement: mais aucune n'accouche sans éprouver cet accident.
- D. La perte qui survient à cette occasion est-elle toujours fort inquiétante?
- R. Quand elle s'annonce de bonne heure, comme du sixième au septième mois de la grossesse, elle est d'abord peu considérable, & elle peut subsister pendant quelques semaines sans affoiblir la femme. Elle peut même s'arrêter comme d'elle-même; mais elle reparoît bientôt avec plus de force, & devient d'autant plus abondante, que la grossesse se rapproche davantage de son terme. Elle augmente encore dans les premiers temps du travail, à mesure que le col de la matrice s'essace, & que l'orisse se dilate.
- D. La perte de sang est-elle toujours un symptome de la présence du placenta sur l'orifice de la matrice?
  - R. Non: elle peut également avoir lieu, quoique le placenta occupe toute autre région que le col de la matrice; mais elle est alors accidentelle, & la

sur l'Art des Accouchemens. 257

grossesses auroit pu parvenir à fon terme, sans être troublée par cet accident.

D. Quelle est la destinée de la mère & de l'enfant, quand le placenta est attaché sur le col de la matrice, & en recouvre

l'orifice?

R. Cette circonstance est ordinairement aussi fâcheuse pour l'un que pour l'autre; & la mère ainsi que l'enfant, succomberoient le plus souvent à l'hémorrhagie,

si l'on ne venoit à leur secours.

Lorsque c'est le bord du placenta qui recouvre l'orifice de la matrice, la perte est moins considérable; la femme peut y résister plus long temps, & accoucher seule, après avoir répandu beaucoup de sang. Mais la circonstance est des plus fâcheuses, quand le milieu du placenta répond à cet orifice; la conservation de la mère & celle de l'enfant ne dépendent alors que des secours qu'on leur donne.

D. En quoi consistent ces secours?

R. Quand la perte de sang ne fait que

commencer, & qu'elle est peu abondante, si le pouls de la femme est robuste & si les vaisseaux sont pleins, on a recours à la saignée du bras. On recommande à la femme de garder le lit, d'y être couchée à plat sur le dos, de ne faire aucun mouvement, & de modérer ceux de l'ame autant que ceux du corps. On ne lui permet que des alimens de facile digestion, 258 Principes

& en petite quantité à la fois; on lui fait boire de la limonnade, de l'eau de riz avec le fyrop de vinaigre, de limon, &c. ou de la tisanne de racine de grande confoude avec ces mêmes fyrops; on lui interdit l'usage du vin, du casé & des liqueurs spiritueuses.

Lorsque la perte est très-abondante; on n'a d'autre ressource que dans l'accouchement, & il faut l'opérer fouvent,

quoique la nature n'y soit pas encore disposée, & que la semme n'éprouve aucune douleur pour accoucher.

D. Peut-on opérer l'accouchement, sans délai, toutes les sois que la parte est assez grave pour exposer la vie de la mère & de

l'enfant?

R. Non: on ne peut toujours l'opérer aussi-tôt; parce que le col de la matrice conferve encore quelquefois beaucoup de longueur, qu'il a peu de souplesse, & qu'il peut à peine admettre un seul doigt; comme on le remarque souvent quand la perte se déclare au septième mois de la grossesse. On ne pourroit entreprendre l'accouchement en pareil cas, sans aggraver le danger dont la femme est déjà menacée.

D. Que faut-il donc faire dans ce cas?

R. On infistera sur les moyens proposés ci-devant, on appliquera des serviettes imbibées de vinaigre sur le ventre & le haut des cuisses de la femme; on entre-

fur l'Art des Accouchemens. 259 tiendra le moins de chaleur possible dans la chambre; on remplira le vagin de lambeaux de linge fin trempés dans l'eau & le vinaigre, ou bien avec de la charpie, de la filasse fine, de l'agaric ou de l'amadou, afin de s'opposer à l'écoulement du sang. On n'ôtera ce tampon que le plutard pos-sible, s'il ne s'oppose pas à la sortie des urines; & on le renouvellera si les circonstances l'exigent (a).

D. Comment doit-on proceder à l'accouchement, lorsque les choses y paroissent mieux

disposées?

R. Quelques Praticiens ont conseillé de percer le placenta qui recouvre l'orifice de la matrice, & de passer la main à travers pour aller prendre les pieds de l'enfant: mais ce procédé ne devroit pas être admis, parce qu'il entraîne de nouveaux inconvéniens. On ne peut trouer ainsi le placenta, & passer la main à travers, sans le détacher en totalité; & l'entraîner avec l'enfant, qu'on force de descendre également à travers cette masse : ce qui augmente la perte, tant du côté de la mère que du côté de l'enfant, &c.

<sup>(</sup>a) On a prescrit dans ce même cas, de percer le placenta du bout du doigt, pour donner issue aux eaux de l'amnios; mais cette pratique est désectueuse & bien moins recommandable que l'usage du tampon dont nous venons de parler,

Il vaut mieux détacher le placenta dui côté où son bord paroît le plus voisin de: l'orifice de la matrice, & déchirer less membranes au - dessus de ce point; ce: qui est plus sûr & plus facile à exécuter. Ayant ouvert les membranes de cette: manière, on plonge la main jusqu'aux pieds de l'enfant; on les dégage aussité, & l'on termine l'accouchement en suivant les préceptes qui seront dictés par la suite.

Quant à la délivrance proprement dite; ou à l'extraction du placenta, on y procède à l'ordinaire; après avoir donné le temps à la matrice de se contracter & de se resserrer. Nous observerons seulement qu'il est alors dissicile d'entraîner la totalité des membranes, si l'on n'y donne pas un soin particulier; parce que les ayant déchirées d'un côté au bord du placenta, elles achèvent de s'en séparer circulairement, au moindre tiraillement.

D. La délivrance est - elle plus facile ou plus difficile à la suite de l'avortement, qu'après un accouchement à terme; & exige-

t-elle d'autres soins?

R. Si l'on n'entend par le mot délivrance que la sortie de l'arrière-faix, elle pourra paroître d'autant plus difficile, que la grosfesse sera moins avancée à l'époque où se fera l'avortement; parce que dans les premiers mois, il ne nous reste aucune des

ressources connues jusqu'ici, pour extraire le placenta; nous ne pouvons tirer sur le cordon ombilical pour entraîner cette masse, ni porter la main dans la matrice pour l'en délivrer, & il faut en outre beaucoup plus d'efforts pour l'expusser. Plus la grossesse s'éloigne du troissème mois, & se rapproche de son terme, plus la délivrance devient facile.

D. Que faut - il donc faire dans le cas d'avortement, quand l'arrière - faix ne vient

pas avec le fœtus?

R. Il faut en attendre l'expulsion, si le cordon trop soible encore ne peut servir à l'extraire. L'Accoucheur doit borner ses soins à solliciter les contractions de la matrice, en faisant quelques frictions sur la région hypogastrique de la semme; & quand l'arrière-saix sera descendu complétement dans le vagin, il l'accrochera du doigt recourbé, si les efforts de la semme ne peuvent l'expulser.

D. La sortie du placenta suit-elle de bien près la sortie du sætus dans tous ces cas?

R. Quelquesois le tout semble venir en même temps; d'autres sois ce n'est que plusieurs heures, même plusieurs jours après la sortie du sœtus; que la nature rejette le délivre.

D. Le placenta vient - il toujours entier

dans ces sortes de cas?

R. Quand on laisse agir la nature, le

plus souvent elle le rejette en entier; mais quelquesois, elle ne l'expulse que par lambeaux.

D. Ne pourroit-on pas épargner tant d'effortss à la nature, en pinçant le placenta du bout de deux doigts, dès qu'il est engagé dans le col de la matrice, & qu'une portion en at

déjà franchi l'orifice?

R. Si l'on a extrait le placenta danss quelques cas, en tirant sur cette portions engagée dans le col de la matrice, c'est que les choses étoient disposées de manières que la délivrance ne devoit pas tarder à se terminer spontanément. Bien plus souvent l'Accoucheur déchireroit la portion de placenta qu'il auroit pincée de cettes façon, & rendroit la sortie du restes plus dissicile. Il vaut donc mieux abandonner les choses à elles-mêmes.

D. Le placenta du fœtus abortif peut il! séjourner quelque temps dans la matrice, sans

que la femme en éprouve des accidens?

R. Elle en a bien moins à craindre dans; ces fortes d'occasions, qu'à la suite d'un accouchement à terme. D'un côté, l'écoulement du sang sera moins abondant qu'après; celui-ci; & de l'autre, la putrésaction du placenta apportera moins de trouble dans; des souctions.

D. Que faudroit-il faire si la rétention du placenta, après l'avortement, entretenoit une

perte abondante?

fur l'Art des Accouchemens. 263

R. Il faudroit modérer cette perte, même l'arrêter par des moyens convenables; car on ne peut extraire le placenta, fi le col de la matrice n'est pas disposé

à lui donner issue.

On appliquera des serviettes imbibées de vinaigre, ou d'eau froide, sur le ventre & sur les cuisses de la semme; & si ce moyen ne sussit pas, on tamponnera le vagin, en le remplissant de lambeaux de linge sin, de silasse, &c. comme on l'a prescrit plus haut: on portera même une partie de ce tampon dans le col de la matrice, si on le peut. Ce moyen est bien plus essicace dans le cas dont il s'agit, que dans celui pour lequel nous l'avons déjà recommandé.

D. Que deviendra l'arrière-faix, si vous vous opposez de cette manière à sa sortie?

R. Son expulsion n'en sera que plus prompte. Le tampon, le caillot qui se sormera au-dessus jusques dans la matrice même, & le placenta seront expulsés en même temps, dès que les contractions de la matrice auront acquis affez de forces pour surmonter les obstacles qui s'opposoient à la délivrance. D'ailleurs, on ôtera le tampon, quand les efforts se soutiendront assez pour en espérer l'expulsion du délivre.

L'ignorance seule pourra se récrier contre l'usage du tampon que nous pres-

crivons; mais l'Accoucheur doit se mettre au-dessus de ses clameurs.

D. Que faudroit-il faire si le placenta du fatus abortif venoit à se putrésier dans la matrice?

R. Il faudroit employer les injectionss recommandées, en traitant de la rétention du placenta, ou d'une partie du placentas seulement, après l'accouchement à terme; & faire observer à la semme le même régime que dans ce dernier cas.

D. La délivrance exige-t-elle quelques soinss particuliers à la suite de l'accouchement de:

plusieurs enfans?

R. Pour fixer la conduite qu'on doitte tenir dans ce cas, il faut exposer d'abordle ce que les jumeaux ont de communiquant l'arrière-faix.

Le plus souvent les jumeaux n'ont qu'unt placenta qui leur est commun; ou s'ils; ont chacun le leur, ils sont tellement; liés l'un avec l'autre, qu'ils ne paroissent former qu'une seule masse.

Il est très-rare que chaque enfant ait: fon placenta & ses membranes séparés &:

distincts.

Aucuns signes ne pouvant nous faire connoître avant la délivrance, si les jumeaux ont chacun leurs enveloppes particulières & leur placenta, ou si toutes ces parties leur sont communes, nous ne devons entreprendre de délivrer la femme qu'après

fur l'Art des Accouchemens. 265 qu'après la fortie du dernier enfant; car en amenant l'arrière-faix du premier, on détacheroit & on entraîneroit nécessairement celui de l'autre: ce qui pourroit avoir des inconvéniens.

Nous en excepterons la circonstance où le placenta vient comme de lui-même,

après le premier enfant.

Pour opérer la délivrance, on ne tirera que sur l'un des cordons, afin que le placenta présente le moins de volume possible à l'orifice de la matrice, & qu'il le traverse, ainsi que le canal du vagin, avec plus de facilité. Si l'on ne peut entraîner le placenta en tirant sur le cordon qu'on aura saisi d'abord, on essaiera de le faire en agissant sur l'autre; & lorsqu'on ne pourra l'extraire en se conduisant de cette manière, on en abaissera le bord au moyen de deux doigts introduits assez loin dans le col de la matrice, afin de le dégager sous le plus petit volume possible.



## CHAPITRE IX.

Du traitement de la femme après

Des soins qu'on doit accorder à la semme immédiatement après la délivrance.

D. QUELS sont les soins qu'on doit donner à la femme immédiatement après la délivrance?

R. 10. Dès que l'arrière-faix est sorti, l'Accoucheur doit introduire le doigt dans le vagin, pour s'assurer si le sond de la matrice n'a point suivi cette masse, &si cet organe ne s'est pas renversé, afin d'en faire aussi-tôt la réduction, si l'accident avoit lieu. Pendant cette courte perquisition, de l'autre main appliquée sur l'abdomen de la femme, il fera de nouvelles frictions pour exciter la matrice à se resserrer de plus en plus, & à expulser le sang qui pourroit s'être épanché dans sa cavité. Il répétera ces mêmes frictions de temps à autre pendant les premières heures;, & à son défaut, la semme les sera ellemême. Moyennant cette précaution, nonseulement il ne s'accumulera pas de sang. dans la matrice, & il ne s'y formera pas de gros caillots, mais encore les paroisfur l'Art des Accouchemens. 267 de ce viscère s'engorgeront moins, & la femme aura moins de tranchées à sup-

porter.

2°. On mettra la femme sèchement; en substituant de nouveaux linges à ceux qui sont mouillés, & qui constituent la garniture du pétit lit. On la couvrira convenablement pour la désendre du froid, ou du courant d'air de la chambre, lorsqu'il y a eu de la sueur pendant le travail, & sur-tout si la peau est encore humide.

fi elle a besoin de réparer ses sorces; ou bien une tasse d'eau sucrée, pure ou teinte de vin, si elle se plaint de la soif, & de

sécheresse à la bouche.

de ces boissons échaussantes, de ces liqueurs spiritueuses, de ces élixirs, dont les bonnes semmes vantent l'efficacité pour relever les sorces abattues, pour prévenir les tranchées, ou calmer le tremblement qui se maniseste presque toujours après la délivrance; & que bien des accouchées attribuent au froid.

tenir les cuisses & les jambes rapprochées & alongées; de garder le silence, & de modérer les mouvemens de l'ame autant que ceux du corps; trop d'agitation de l'un & de l'autre pouvant lui devenir sur neste. On la laissera sur le petit lit pendant

Mij

une heure ou deux, & même plus, fi elle est menacée de perte ou de désaillance; & lorsqu'elle a répandu beaucoup

de sang en accouchant.

6°, On aura soin de la tenir éveillée, pour qu'elle puisse prévenir de ce qu'elle éprouvera; & dans le cas où elle ne pourroit s'abstenir de dormir, on examinera de temps en temps si le sang ne coule pas trop abondamment, ou s'il ne se forme pas d'épanchement dans la matrice: plusieurs semmes ayant été-victimes de l'un ou l'autre de ces accidens, pendant un sommeil de peu de durée; & d'autres s'étant éveillées dans un état d'épuisement.

Après le délai que nous venons de prefcrire, on habillera la femme, on la garnira convenablement, on la transportera dans le lit préparé pour le temps des couches, & on s'occupera de son régime.

## SECTION PREMIÈRE.

De l'habillement des femmes en couches.

D. QUEL est l'habillement qui convient aux

femmes récemment accouchées?

R. Elles devroient se couvrir assez pour se préserver du froid, & de manière d'ailleurs à ne se procurer que le degré de chaleur qui leur convient; car les deux extrêmes sont également nuisibles.

sur l'Art des Accouchemens. 269

En hiver, elles se couvriront la tête d'un bonnet de toile de coton piquée, & d'une coesse ordinaire (a).

Elles se garniront le cou d'un ou de plu-

sieurs fichus.

Elles se couvriront le sein d'une serviette mollette pliée en plusieurs doubles, qu'elles soutiendront d'une seconde assez longue pour entourer la poitrine, & se croiser sur le devant.

On pourra substituer à la première de ces deux serviettes, même à l'une & à l'autre, des pièces préparées pour les mêmes usages, qu'on appelle pièces de seins.

On couvrira pareillement le ventre d'une serviette mollette, pliée en quarré ou en triangle, qu'on soutiendra d'une autre placée en manière de bandage de corps.

Une chemise, une camisole de toile piquée, de molleton, ou de flanelle, une alaise en forme de jupon, & une serviette à demie usée placée entre les cuisses, contre la vulve, compléteront l'habille.

M iii

<sup>(</sup>a) Celles qui desirent conserver leur chevelure, feront très-bien de se saire peigner à sond avant d'accoucher, pour dépouiller les cheveux de la pommade & de la poudre, si elles en sont usage habituellement. Cette précaution est salutaire d'ailleurs; elle facilite la transpiration, elle préserve de quelques maux de tête, des demangeaisons souvent insupportables, &c.

270 Principes

ment & la garniture de la femme en couches.

Nous observerons, 1°. qu'une chemise fort courte, sendue pardevant dans toute sa longueur, ayant de longues manches, & une espèce de collet, vaut mieux qu'une chemise ordinaire dans les premiers jours des couches (a); 2°. que la camifole devroit être assez large pour se croiser sur la poitrine sans être trop serrée; que les manches doivent en être assez longues pour descendre jusqu'aux poignets, & assez étroites en en bas pour les envelopper.

La femme nouvellement accouchée se couvrira moins en été qu'en hiver.

D. Est-il bien nécessaire d'appliquer autour de la poitrine & du ventre, l'espèce de bandage de corps dont vous venez de parler?

R. Cette précaution est assez inutile quant à la poitrine; mais souvent on ne fauroit s'en dispenser à l'égard du bas-

<sup>(</sup>a) Cette chemise, qui ne descend que jusqu'aux lombes de la semme, ne se trouve pas mouillée par les lochies dès le premier moment, comme une chemise ordinaire; on n'est point obligé d'en changer aussi souvent, & il est bien plus facile d'entretenir la semme dans la propreté qu'exige son état. Quand on présère une pareille chemise, l'alaise recommandée ci-dessus pour entourer le bas du tronc, ainsi que les cuisses & les jambes, devient indispensable.

sur l'Art des Accouchemens. 271 ventre, sans exposer la semme à quelques inconvéniens.

D. Que se propose-t-on, en général, en bandant la poitrine de l'accouchée?

R. Chez bien des femmes on ne se propose que de maintenir sur le sein la serviette mollette qui le recouvre, & de le défendre du froid. Mais quelques - unes, en serrant cette espèce de bandage un peu plus, imaginent pouvoir s'opposer à la montée du lait, prévenir le gonslement du sein, & les vergétures qui en sont la suite, & que rien ne peut effacer. C'est dans les mêmes vues que ces semmes ont recours à des topiques astringens, & qu'elles en recouvrent le sein dès les premiers momens: pratique on ne peut plus pernicieuse, & à laquelle les personnes de l'art doivent fortement s'opposer.

· Les femmes de la campagne, qui ne pensent qu'à satisfaire au devoir de la na-ture, en allaitant leurs enfans, ignorent

ces ulages dangereux.

D. Quelle est l'utilité du bandage que vous recommandez d'appliquer autour du ventre?

R. Les avantages de ce bandage font évidens chez les femmes dont la grossesse a été volumineuse; chez celles qui ont déjà eu plusieurs enfans; chez celles enfin dont le ventre étoit en besace avant d'accoucher, & conserve beaucoup de capacité après l'accouchement. Ce bandage sou-

M iv

tient le poids des viscères; il modère les efforts qu'ils exercent continuellement sur les muscles & les tégumens affoiblis; il prévient certaines espèces de hernies, ces éventrations, ces gros ventres en besace, qui sont si insupportables à la plupart des semmes. Ce bandage est tellement nécessaire dans les premiers momens, à l'égard de quelques-unes de ces semmes, qu'elles ne sauroient se tenir un instant à leur séant, sans éprouver des tiraillemens incommodes vers le bas de la poitrine, sans se plaindre de vertiges, de désaillances, & même sans tomber en syncope, si on ne l'employoit pas.

D. Quel est l'instant où il convient de

bander le ventre de l'accouchée?

R. Il convient de le faire immédiatement après la délivrance chez quelques femmes; & chez d'autres seulement au moment où elles vont quitter le petit lit.

D. Ce bandage doit-il être très-serré pour

remplir les vues qu'on en attend?

R. Il ne doit l'être que médiocrement dans les premiers momens; mais on le ferrera un peu plus dans la fuite. Un bandage trop lâche d'abord ne rempliroit pas fon objet; & un bandage trop ferré donneroit lieu à quelques accidens.

D. La femme doit-elle garder long - temps

ce bandage?

R. Ce temps ne peut être fixé que par l'état du ventre même de la femme ;

fur l'Art des Accouchemens. 273 quelques - unes le porteront une semaine ou deux; & d'autres feront bien de le garder plusieurs mois.

D. Comment le lit de l'accouchée doit - il

être disposé?

R. On n'ajoutera rien au lit ordinaire de la femme; on le garnira seulement de manière qu'on puisse l'entretenir proprement, en substituant du linge sec & blanc de lessive à celui qui sera gâté par les vuidanges: pour se procurer cet avantage, on garnira ce lit d'une alaise, & même de deux, depuis le dessous de l'oreiller jusqu'au-delà du point où doivent porter les sesses de la semme.

On fera ces alaifes d'un drap plié en plusieurs doubles; & on les attachera par

les quatre coins au bord du lit.

On chauffera ce lit au moyen d'une bassinoire, un instant avant d'y faire entrer la semme; sur-tout en hiver, pour corriger la fraîcheur & l'humidité des draps. Si l'on ne peut se procurer de bassinoire, dont l'usage est peu samilier dans les campagnes, on enveloppera la semme jusqu'audelà des pieds, dans une alaise chaude, pour qu'elle ne soit pas saisse par le froid du lit en y entrant, & qu'elle n'éprouve pas le tremblement qui est la suite de cette impression.

En été, il suffira que les linges de la garniture du lit, & ceux qui entourent

274 Principes
le corps de la femme, soient bien secs de lessive.

- D. La femme récemment accouchée peutelle, sans inconvéniens, passer d'elle - même d'un lit dans un autre?
- R. La plupart peuvent le faire : il suffit d'approcher le lit sur lequel elles sont accouchées, de celui qui doit leur servir pendant leurs couches. Mais il en est de trop soibles pour soutenir ce léger exercice, ou qui ne pourroient le faire sans en être incommodées: on portera ces dernières.

## SECTION II.

Du régime que doit observer la femme en couches.

D. QUEL est le régime qu'il convienc d'observer pendant le temps des couches?

R. Ce régime doit être fixé par l'état: de la femme même; par la nature des accidens qui auront accompagnés le travail de l'enfantement, ou qui se manifesteront après l'accouchement.

Le régime ne s'entend pas seulement du choix & de la quantité des alimens qu'on doit accorder à la femme; mais encore de tout ce qui l'environne, & qui pourroit lui devenir nuisible.

fur l'Art des Accouchemens. 275

Il est important, 1° que la semme en couches respire un air libre & pur; c'est-à-dire, qui ne soit ni trop chaud ni trop froid, ni trop sec ni trop humide, & qui ne contienne d'ailleurs aucune odeur.

Le parsum de la rose, du jasmin, de la violette, &c. pouvant être aussi nui-sible que l'odeur pénétrante du musc & de l'ambre: même qu'un air chargé de miase.

l'ambre; même qu'un air chargé de mias-

mes putrides.

On aura donc l'attention que la chambre de l'accouchée ne soit ni trop chaude ni trop froide, & d'en renouveller l'air plusieurs sois dans la journée, en ouvrant la porte ou la croisée pendant un instant, même en hiver. On ne renfermera pas la femme fous les rideaux du lit; on ne l'accablera pas du poids de ses vêtemens & de ses couvertures; on n'admettra que peu de personnes à la fois dans sa chambre; & on en refusera l'entrée à toutes celles qui porteront des fleurs, ou des odeurs.

On changera fréquemment les linges qui servent d'alaises & de chauffoirs à l'accouchée, & on ne laissera aucun de ces linges dans la chambre; où l'on a la dangereuse coutume de les entasser les uns sur les autres, soit dans un coin, foit dans le fond d'une armoire : c'est ainsi qu'on entretiendra la falubrité de l'air.

La chambre de l'accouchée devroit être

Principes
éloignée du grand bruit, & il ne fauroit
y régner trop de filence. Il ne faut la
tenir ni dans une trop grande obscurité;
ni trop éclairée. En hiver, & sur-tout
pendant la nuit, on aura l'attention de
n'y tenir qu'une seule lumière; & si on se sert d'huile pour l'entretenir, on observera qu'elle ne répande pas de ces odeurs suffoquantes, que les personnes même en bonne santé ont peine à supporter.

La femme en couches ne s'abandonnera à aucune passion violente, de quelque espèce qu'elle soit; un accès de joie immodérée pouvant lui devenir aussi funeste qu'un mouvement de grande colère, &c.

On n'obligera pas l'accouchée à garder la même position des jours entiers, comme on l'exige encore affez fouvent à l'égard de quelques-unes. Elle se couchera tantôt fur le dos, tantôt fur un côté ou fur l'autre, & se mettra même sur son séant, si les forces le lui permettent. Ces mouvemens, ces changemens de positions ne doivent être défendus qu'aux femmes qui sont épuisées par l'hémorrhagie; parce qu'elles ne fauroient s'y livrer fans éprouver de grands maux de tête, des vertiges, des bourdonnemens d'oreilles & des défaillances.

D. Quels sont les alimens qu'on doit accorder à la femme nouvellement accouchée?

fur l'Art des Accouchemens. 277 R. Ces alimens doivent être de facile digestion, & en assez grande quantité pour réparer & soutenir les forces; une diète trop sévère pouvant avoir des inconvéniens aussi bien que l'excès contraire. En général, on donnera plus d'alimens à la femme qui nourrit son enfant, qu'à celle qui ne doit pas allaiter.

On accordera une soupe à la première pour son déieuner. & une autre, avec une pour son déieuner.

pour son déjeûner, & une autre, avec un peu de légumes, ou un œuf frais, pour son dîner; un bouillon avec une croûte. de pain pour le goûter, & autant au fouper. On retranchera quelque chose de ce régime le troissème & le quatrième jour, si le lait se porte au sein avec trop d'abondance; s'il survient alors de l'élévation & de la fréquence dans le pouls; en un mot, si la semme, quoique nourrice, éprouve à un degré marqué ce que nous appellons sièvre de lait. Après ce temps on pourra donner des alimens plus solides encore; & la semme reprendra insensiblement sa manière de vivre ordinaire. naire.

La femme qui n'allaite pas son enfant aura moins besoin de nourriture que la première. Si on lui accorde chaque jour quelques légers potages jusqu'au moment de la montée du lait, on les lui retranchera pendant le temps de cette révolution, & on ne lui donnera alors que du

Principes 278

bouillon (a). Après ce temps, on augmentera graduellement les alimens; on accordera des légumes, des œufs, de la volaille, &c.

D. Quelle est la boisson qu'on doit donner aux semmes en couches?

R. Toutes les boissons d'usage conviennent aux femmes en couches à l'heure des repas. On donnera du vin à celles qui pourront se le procurer; mais elles le couperont à moitié, même aux deux tiers, avec de l'eau. Les autres boiront de l'eau pure, de la bière, ou du cidre, selon l'habitude où elles seront à cet égard.

L'eau commune un peu sucrée, ou édulcorée, soit avec le syrop de capillaire, de violette ou de guimauve, servira de boisson ordinaire dans l'intervalle des repas; on pourra y substituer une tisanne d'orge, de chiendent & de réglisse; ou bien une légère infusion de capillaire, de véronique, de bourache, &c. selon les circonstances.

<sup>(</sup>a) Autant qu'il est possible, le bouillon sera fait avec le bouf, le veau & la volaille. Nous présumons bien que toutes les semmes de la campagne ne pourront se procurer cet avantage; mais qu'on observe que nous traçons ici un plan de conduite général. & que nous avons en vue le traitement des semmes qui vivent dans une sorte d'aisance, & de celles qui sont les plus indigentes.

Sur l'Art des Accouchemens. 279
D. Doit-on donner ces boissons chaudes

ou froides?

R. L'usage de ne donner à la femme que des boissons chaudes, même tièdes, a ses inconvéniens: elles débilitent les forces de l'estomac, & rendent les digestions pénibles à la suite des couches.

On ne doit donner la boisson tiède que lorsqu'il y a de la moiteur à la peau. Dans le reste du temps, on la donnera à la température ordinaire, & telle que la semme la prendroit dans l'état de santé, excepté cependant à la glace.

D. Ne doit-on rien changer à la boisson des semmes en couches pendant la sièvre de

lait ?

femme aura préférée, si elle nourrit son ensant. Mais on sera prendre aux autres quelques verres de ces insusions théisormes dont nous avons parlé, asin d'exciter ou d'entretenir la transpiration, & d'augmenter les urines. Quélques tasses de thé léger'; d'insussion de fleurs de sureau, de tilleul, &c. rempliront les mêmes vues.

D. Ces boissons suffisent-elles pour évacuer le lait, chez les semmes qui ne nourrissent pas

leurs enfans?

R. Ces boissons suffiroient à l'égard de bien des semmes, si elles évitoient soigneusement de s'exposer à l'intempérie de l'air, & ne commettoient aucune saure

dans le régime. Mais il est rare qu'on s'en tienne à des remèdes aussi simples & aussi peu dispendieux : soit parce que les femmes qui ne nourrissent pas ne se croiroient point en sûreté après l'usage de pareils moyens, soit parce que des circonstances particulières ne permettent pas de s'y borner. Aussi-tôt que la sièvre de lait est passée, & que la matière des vuidanges commence à blanchir & à devenir laiteuse, on administre tous les matins, ou de deux jours l'un seulement, un lavement composé de la décoction de quelques plantes émollientes, & de trois ou quatre onces de miel commun, ou de miel mercuriel; auquel on ajoute encore, par fois, quelques gros de cristal minéral, & plus souvent de sel de duobus.

On donne à la femme quelques verres d'une tisanne faite avec la racine de canne, de roseau, de persil, & autres de cette

espèce.

On leur fait prendre tous les matinsdeux ou trois tasses d'infusion de chicorée, de bourache, de cerfeuil, & autres plantes semblables; ou bien on compose de ces plantes une espèce de bouillon, auquel on ajoute un gros ou deux de sel d'ipsom, de glaubert, ou de duobus, même de sel marin en assez grande quantité, pour lui donner un certain degré d'amertume.

Nous préférons ces sortes de sels à celui

sur l'Art des Accouchemens. 281 de duobus, dont bien des femmes ont à se plaindre de l'usage qu'on en fait encore journellement.

Le sel marin est moins dispendieux pour les femmes de la campagne, il se trouve par-tout, & peut remplir les mêmes vues.

Après l'usage de ces remèdes, on administre une ou plusieurs médecines; composées de deux gros de sené mondé, de deux onces de manne, & de deux gros de sel d'ipsom ou de glaubert.

D. Les semmes qui ne nourrissent pas ne sont-elles point obligées d'employer quelques topiques sur le sein?

R. On ne sauroit approuver la plupart de ceux que quelques bonnes femmes pres-crivent à cet égard. Les unes se font ap-pliquer des linges trempés dans l'eau-de-vie; d'autres, des linges enduits de beurre salé, de suif, d'huile, de cérat, d'onguent populeum; ou de diverses pommades, dont la formule se transmet de génération en génération dans la même famille. Cellesci recouvrent le sein de persil; celles-là le garnissent de pervenche, &c. La nature n'a besoin d'aucun de ces prétendus secours : il suffit de tenir le sein couvert mollement & chaudement, pour le défendre du contact de l'air froid. Loin de chercher à modérer la montée du lait, & de s'y opposer, comme le font bien des femmes, il faut favoriser son ascension ausein autant qu'il est possible.

D. L'état des parties naturelles de la femme n'exige-t-il pas quelques soins après.

l'accouchement?

R. Il est important de s'en occuper, sur-tout lorsque ces parties ont éprouvé, quelques contusions ou déchirures, & qu'elles ont été violemment distendues lorss du passage de l'enfant; parce qu'elles se tumésient presque aussi tôt après l'accouchement, & qu'elles peuvent s'enslammers & s'ulcèrer. Les urines & la matière dess vuidanges dont elles sont baignées à chaque instant, y excitent d'ailleurs des cuissons & des douleurs insupportables, qu'ill faut s'essorce, de calmer.

On s'en occupera donc, & on feraplusieurs sois le jour des somentations émollientes & résolutives sur ces parties; jusqu'à ce que le gonslement soit dissipé, que la douleur soit cessée, & que la réunion ou la consolidation des parties

déchirées se soit opérée.

La décoction de racine de guimauve; le lait chaud, serviront dans les premiers momens; & on emploiera dans la suite l'infusion de sleurs de sureau, de camomille & de melilot; ou bien le vin chaud, auquel on ajoutera un peu de miel.

Quoiqu'il ne survienne ni gonslement,

sur l'Art des Accouchemens. 283 ni tension douloureuse à ces parties, chez bien des femmes, il est utile néanmoins d'y faire des lotions, une ou plusieurs fois le jour, soit avec du lait, comme le font la plupart des femmes, soit avec de l'eau de guimauve & de sureau; pour les nettoyer, & prévenir les cuissons & les démangeaisons que le passage des vuidanges peut exciter.

Ces lotions doivent se faire sans ex-

poser la semme au froid, & sans la découvrir; fur-tout dans le temps des fueurs qui accompagnent la révolution du lait.

D. Doit - on approuver l'usage de ne changer de linges & de lit qu'après les six ou sept premiers jours de couches?

R. Cet usage est on ne peut plus ridicule; & l'ignorance seule paroît l'avoir perpétué & conservé jusqu'à nous.

On doit changer de linges toutes les sois qu'ils seront mouillés, soit par les suites ser le lait ou par les vuis fueurs, soit par le lait, ou par les vui-danges. On aura seulement la précaution de ne pas en changer pendant la sueur, & de n'en donner que de bien secs & un peu chauds. Si l'on peut se dispenser de changer de chemise tous les jours, dans le premier temps, on doit renouveller très-souvent les alaises qui garnissent le lit, & sur-tout les linges qui servent à recevoir les vuidanges.

On peut transporter la femme tous les

jours d'un lit sur un autre; excepté pendant la révolution du lait, & lorsque dess circonstances particulières s'y opposent.

D. A quel terme des couches la femmes peut-elle se lever & commencer à marcher?

R. Ce terme ne peut être encore fixé que: d'après l'état même de la femme. Si less unes peuvent se tenir levées, & marcher: après les cinq ou six premiers jours, ill en est d'autres qui ne sauroient le faire: au dixième, & même au douzième, sans en être incommodées; & sans éprouver des pesanteurs de matrice, des tiraillemens douloureux dans le bas-ventre, &c.

pagne quittent leur lit, & reprennent leurs occupations domestiques de trop bonne heure. La plupart vont à l'église & aux champs, s'exposent au froid & à l'humidité, dans un temps où elles devroient au plus rester levées quelques instans de

la journée.

L'usage où elles sont de nourrir leurs ensans, ne sauroit les dispenser de prendre plus de précautions; puisque l'allaitement ne les met pas à couvert d'une soule d'instirmités, plus ordinaires chez elles que chez les semmes qui habitent les villes.

# CHAPITRE X.

De l'emmaillotement, & du régime de l'enfant.

### SECTION PREMIÈRE.

De l'emmaillotement,

D. QUELS sont les soins qu'on doit accorder à l'enfant avant de l'emmailloter?

R. Quelques-uns de ces soins semblent n'être dictés que par un esprit de propreté, pendant que d'autres font de la plus grande importance. Les premiers consistent à dépouiller le corps de l'enfant d'une espèce de pommade visqueuse & tenace qui le recouvre en quelques endroits; les derniers, à rechercher s'il n'existe aucuns vices de conformation, ou accidens qui puissent influer sur la vie de l'enfant, afin d'y apporter les remèdes nécessaires.

D. Comment doit-on nettoyer le corps de l'enfant de l'enduit visqueux dont il s'agit?

R. La plupart des femmes qui se chargent de ce soin, s'efforcent de détacher cet enduit, en essuyant assez rudement

les endroits où il se trouve, soit avec un linge sec, soit avec un linge trempé dans l'eau chaude ou le vin; ce n'est que par des frottemens réitérés qu'elles y parviennent, & eucore ne le sont-elles qu'imparfaitement, & en tourmentant horriblement! l'enfant; parce que cet enduit tient for-tement à la peau, & qu'il n'est nullement susceptible d'être détrempé ni par l'eau;

ni par le vin.

On commencera par le rendre coulant & bien liquide, en frottant légérement par-tout où il se trouve, avec un linge trempé dans, l'huile, ou le beurre fondu; & on l'enlevera facilement ensuite en effuyant avec un linge fec. On en dépouillera sur tout les aisselles & le plis des aînes, où il est pour l'ordinaire assez abondant; afin que la rancidité qu'il acquiert promptément par la chaleur, du corps, n'excite pas la rougeur, & l'excoriation de ces parties.

On donnera plus de soins encore à en nettoyer les parties naturelles chez les petites filles; parce que ces parties s'en-flamment & s'ulcèrent bien plus facile, ment que les autres, & qu'indépendam-ment de la douleur qui en est inséparable alors, il s'y établit des écoulemens, qu'on pourroit attribuer à des maladies moins

bénignes.

Après avoir nettoyé l'enfant de cette

fur l'Art des Accouchemens. 287
espèce de pommade, on le lavera avec
de l'eau tiède, pure, ou mêlée avec le
vin. On doit éviter, dans le premier moment, de le laver & de le baigner à l'eau
froide, comme quelques-uns le recommandent; si le bain froid peut entrer dans
le plan de l'éducation physique des enfans, il convient de les y accoutumer
insensiblement, en diminuant de jour en
jour, & par degrés, la chaleur de l'eau.

D. Quels sont les accidens & les vices de conformation qui exigent les secours de la Chirurgie des les premiers momens de la

naissance?

R. Les accidens dont il s'agit peuvent être la suite des efforts naturels de l'accouchement, ou de ceux que l'on a faits pour le terminer. Tantôt ce sont des contusions, des bosses ou des dépressions à la tête, & tantôt une fracture ou une luxation à l'une des extrémités.

Les vices de conformation auxquels il convient de remédier dès les premiers jours, font le filet, l'imperforation de l'anus, & celle du canal de l'urètre (a).

D. Comment doit-on habiller l'enfant?

R. On doit commencer par couvrir fa.

<sup>(</sup>a) Ces accidens & ces vices de conformation feront le sujet d'un chapitre particulier.

tête d'une espèce de coëffe appellée béguin; & d'un bonnet de toile piquée, de coton,, bandelette qui passe sous le menton, &: de l'un à l'autre côté de cette coëssure.

On lui mettra ensuite une demi - chemise & une camisole, appellées brassières,, qui se croiseront sur le dos. La camisole: sera de toile, de futaine, ou de molleton, selon la saison.

Ayant couvert la tête & la poitrine, on placera autour du ventre un bandage: propre à foutenir le bout de cordon qu'oni a conservé & lié soigneusement. Cet appareil fera composé de deux compresses à-peu-près quarrées, & d'une troissème: en forme de bande, & assez longue pour: faire le tour du corps. L'une des deux: premières compresses sera fendue au milieu de l'un de ses bords jusqu'au centre, où: l'on fera une petite échancrure pour passer. le cordon. On couchera le cordon fur cette compresse, qu'on recouvrira de la. seconde, en montant vers le côté gauche: du ventre; & on contiendra le tout au. moyen de la troisième,

On observera de ne pas trop serrer ce bandage, & de le renouveller dans la. fuite, toutes les fois qu'il fera gâté par les urines, ou les excrémens de l'enfant.

Pour que le cordon ne s'attache pas:

trop !

fur l'Art des Accouchemens. 289 trop fortement aux premières compresses, en se desséchant, & qu'on puisse aisément les changer sans tirailler l'ombilic, on les enduira d'un peu de beurre frais, du côté qui touchera ce cordon.

D. En quoi consiste le reste du maillot; ou de l'habillement de l'ensant?

R. On enveloppera le corps d'un double lange, dont l'un sera de toile à demi-usée &z l'autre de toile piquée, depuis les aisselles jusqu'au-delà des pieds. On croisera ces langes sur le devant, on relevera l'excédent de leur longueur sur les jambes, &z on assujettira le tout au moyen de quelques épingles; mais de manière que la poitrine ne soit pas serrée, &z que l'enfant puisse aisément remuer les extrémités.

On mettra un fichu fur le col, & un fecond lange, foit de futaine, ou de laine, pardessus les premiers, si c'est en hiver. On garnira ce dernier lange d'une serviette, & on y rensermera les bras de l'enfant, lorsqu'il fera très-froid.

Pour empêcher que la tête ne ballotte; & ne tombe de côté & d'autre lorsqu'on porte l'enfant sur les bras, ce qui peut avoir des inconvéniens, on la fixera au moyen d'une bandelette passée sous celle du bonnet, & attachée en manière de martingale, sur le devant de la poitrine; ou bien en faisant monter le dernier lange

du maillot assez au-dessus de la tête, pour en former une espèce de chaperon (a).

D. L'espèce de maillot que vous venez de décrire est-il aussi commode & aussi sûr que celui qui est soutenu par des tours de bandes multipliés, ainsi qu'on le fait encore dans la plupart des campagnes?

R. Les femmes de la campagne, qui font dans l'usage dangereux de laisser l'enfant à la garde d'un autre, à peine assezt fort pour le porter, trouveront ce maillot moins sûr & moins commode que celui qui est affermi par des tours de bandes; & dans lequel les bras sont serrés contre le corps, les cuisses & les jambes fortement rapprochées l'une de l'autre, de ma-

Ces femmes doivent éviter aussi soigneusement de tenir l'ensant suspendu par l'un des bras, tandis qu'elles passent sous lui les langes qui doivent l'envelopper; parce qu'elles peuvent luxer colbras.

<sup>(</sup>a) On ne sauroit trop recommander aux semmes chargées d'emmailloter l'ensant, & de le changer de langes dans les premiers temps, de les faire avec les plus grands ménagemens, & de prévenir ce ballottement & ces seconsses de la tête. Après de pareilles seconsses, nous avons vu la face devenir livide, & l'ensant périr de convulsions avant qu'il ne sût emmailloté: il étoit né bien portant, & sans aucun symptome de l'engor gement du cerveau.

fur l'Art des Accouchemens. 291 nière que l'enfant ne peut y exercer le

plus petit mouvement.

Quelques - unes préféreront ce dernier maillot, dans la crainte que l'enfant enveloppé plus lâchement n'éprouve du froid; ou que ses membres trop en liberté ne prennent une tournure vicieuse, &c.

Qu'elles se rassurent contre tant de craintes! Les ensans tenus en liberté dans leurs langes sont ceux qui se ressent le moins de la rigueur des saisons; parce que la chaleur qui leur convient dépend bien plus de l'activité de leurs organes, & des mouvemens de leurs membres, que des langes multipliés dont le poids les accable. Les ensans les mieux saits à l'époque de quelques années, sont ceux qui ont été le moins exposés à la torture, qui est inséparable d'un pareil maillot.

qui est inséparable d'un pareil maillot.

On ne sauroit trop répéter combien l'usage de ces bandes est pernicieux, combien il est contraire à l'intention de la nature, à la tranquillité & au développement de l'ensant; sur-tout chez les habitans de la campagne, qui ne donnent à leurs ensans que des langes de grosse toile, dont la trame se voit prosondément imprimée sur leur corps, toutes les sois

qu'on les change.

D. Doit-on se faire une règle de ne changer les enfans de langes qu'à des heures marquées

dans la journée?

292 Principes

R. Cet usage, assez généralement obfervé dans les campagnes, n'a pu naître que du sein de la pauvreté même, qui manque du nécessaire, pour celui qu'il conviendroit si fort d'adopter. La régle est de changer l'enfant toutes les fois que ses langes sont mouillés, soit par ses urines ou par ses excrémens; & toutes les femmes s'en feroient une loi, si elles consultoient un peu plus leurs propres intérêts. Non-seulement elles changeroient leurs enfans de langes toutes les fois qu'ils seroient mouillés, mais elles auroient encore le soin de laver les parties de l'enfant, qui ont été salies par ses excrémens, au lieu de se borner à les essuyer à demi. Au moyen de ces soins, les semmes assureroient davantage leur repos & celui de l'enfant; parce qu'elles préviendroient ces rougeurs des fesses & du pli des aînes, ces gerçures & ces excoriations, qui l'en-tretiennent dans un état de douleur cuisante, & de veille permanente.

D. De quelle manière l'enfant doit-il étre

couché dans son berceau?

R. Soit qu'on se serve d'un berceau ordinaire, ou de l'un de ces paniers connus sous le nom de barcelonzites, l'enfant doit; y être couché, pendant les premières; heures, sur l'un des côtés, la tête étant un peu plus élevée que les pieds, afin; qu'il puisse rendre plus facilement les hus fur l'Art des Accouchemens. 293 meurs muqueuses qui abondent dans la bouche.

On le couchera dans la suite, tantôt sur un côté, & tantôt sur l'autre, où sur

le dos.

On placera le berceau en face de la croisce, d'où la chambre reçoit son plus grand jour; afin que la lumière tombe directement sur les yeux, & que l'enfant ne s'habitue pas à loucher.

D. Doit - on bercer l'enfant, c'est-à-dire, agiter le berccau dans lequel il est couché,

lorsqu'on se propose de l'endormir?

R. Une douce agitation du berceau ne peut devenir nuisible à l'enfant; mais une agitation violente pourroit avoir des inconvéniens. Continuée pendant quelques instans, elle détermine le sommeil; mais c'est plutôt un état comateux, qu'un repos naturel. On pourroit comparer ce sommeil à celui qu'on procure momentanément à une poule, en lui faisant décrire des mouvemens en fronde, après lui avoir placé la tête sous l'une des aîles; expérience assez familière aux jeunes gens de la campagne.



### SECTION II.

Du régime de l'enfant jusqu'à l'époque du sevrage.

D. QUEL est le régime qui convient à l'enfant dans les premiers jours de sa nais-

Sance?

R. L'enfant n'a pas besoin de nourriture avant qu'il n'ait évacué abondamment son méconium. On lui donnera de l'eau sucrée quelques instans après sa naisfance, & on continuera de lui en faire: boire dans le cours des premières heures; & s'il n'évacue pas, on lui administrerat une once de syrop de chicorée composé, en y ajoutant une pareille quantité d'eau.. On lui fera prendre cette potion en plusieurs fois, dans l'espace de trois ou quatre: heures; & on continuera dans la suite! l'ulage de l'eau fucrée.

Ce syrop est préférable aux potions; purgatives plus composées, & à ces petites boules de beurre roulées dans le sucre, que bien des femmes administrent à leurs enfans dès les premiers momens, dans les vues de les évacuer. On doit également le préférer à l'huise d'amandes douces que prescrivent quelques-uns, & que les semmes de la campagne mêlent souvent à la bouillie

sur l'Art des Accouchemens. 295 qui sert chez elles de premier aliment à l'enfant, & qu'elles lui font avaler un instant après sa naissance.

Rien ne peut remplacer ces légers purgatifs'amers, quand l'estomac de l'enfant est tapissé de glaires qui lui ôtent toute aptitude pour tetter, & lui font éprouver de fréquentes nausées. Il est bon d'en continuer l'usage au-delà des premiers jours, quand la teinte jaune qui survient à l'enfant, paroît un peu plus soncée que de coutume; mais on ne les donne alors qu'à la dose d'un quart de cuillerée, le matin & le soir, mêlé avec deux parties égales d'eau.

D. A quel temps l'enfant commence-t-il

à évacuer le méconium & les urines?

R. Quelquefois c'est à l'instant même de sa naissance ; d'autres fois ce n'est que cinq ou six heures après, & même plus tard. Lorsqu'il n'évacue pas dans le cours des vingt-quatre ou trente-fix premières heures il faut examin<mark>er si l'intestin rectum, ou</mark> le canal de l'urètre, ne seroit pas imperforé; afin de remédier promptement à ce vice de conformation, si on le peut.

D. Quel est l'instant où l'enfant doit com-

mencer à tetter?

R. Lorsque l'enfant ne sera pas allaité par sa mère, on ne le laissera tetter que dix-huit ou vingt-quatre heures après sa naissance; & même plus tard, selon qu'il aura évacué

plus ou moins son méconium, & que le lait de la nourrice aura plus ou moins de consistance. Mais la femme qui allaitera son ensant, pourra le présenter au sein une heure ou deux après la délivrance, & même plutôt: le premier lait, qu'on nomme colostrum, étant regardé généralement comme le meilleur purgatif qu'on puisse donner à l'ensant. Bien des semmes se persuadent même qu'on ne doit en employer aucun autre, & que le syrop de chicorée que nous avons recommandé devient alors inutile. D'autres imaginent qu'en commençant à donner le sein de très-bonne heure, elles auront moins de difficultés à surmonter dans l'allaitement.

Mais le peu de lait, ou de colostrum, que tette l'enfant, ne fauroit toujours le difpenser des légers purgatifs que nous avons prescrits. On lui fera boire de l'eau sucrée par intervalle, & on lui donnera du syrop de chicorée, ou d'un autre également purgatif, s'il n'évacue pas convenablement.

gatif, s'il n'évacue pas convenablement.

D. Est-il nécessaire que la semme donne à tetter aussi-tôt après l'accouchement, pour

réussir dans l'allaitement?

R. Non: cette attention n'est pas nécessaire. Des milliers de semmes n'ayant commencé à donner à tetter que le deuxième, le troisième jour, & même plus tard, n'ont pas éprouvé plus de dissicultés que celles qui l'avoient sait un instant après

fur l'Art des Accouchemens. 297 leur délivrance, & ont eu le même succès, On évitera seulement d'en faire le premier essai, dans le temps où le sein sera pleinement distendu par le lait; parce que le mammelon se développe moins facilement alors, & que la succion excite plus de douleurs. On commencera donc avant ce moment, autant qu'on le pourra; ou bien l'on attendra que le sein soit devenu plus souple.

D. L'époque de la montée du lait, ou dus gonflement du sein, n'indique-t-elle pas le moment où l'on devroit commencer à faire

tetter l'enfant?

R. Quelques femmes sont dans l'opinion que l'enfant n'a besoin d'aucun aliment avant ce moment, qui est le troisième jour; puisque ce n'est qu'à cette époque que le gonslement du sein a lieu. D'autres rapportent à ce même principe, l'inaptitude de certains enfans à prendre le sein, ou l'espèce d'indissérence qu'ils témoignent lorsqu'on le leur présente. Sous le saux prétexte qu'il n'a aucun besoin, on le laisse jeûner pendant des jours entiers, on le laisse affamer ou affoiblir, de manière qu'il n'a plus dans la suite la force de tetter, & qu'il succombe d'inanition.

Quand un enfant ne tette pas avec avidité après vingt-quatre ou trente-six heures, c'est qu'il a besoin d'être évacué, ou qu'il ne peut saisir le bout du sein. Son inaper

titude, dans ce dernier cas, vient de cet qu'il a le filet, ou de ce que le bout du. sein est trop court, trop gros, ou trop, applati, &c.

D. Toutes les femmes peuven t-elles nourrir

· leurs enfans?

R. La nature, en leur accor dant le titrede mère, semble leur prescrire d'allaiter elles-mêmes leurs enfans; mais elle ne paroît pas avoir donné également à toutes les femmes les qualités nécessaires pour bien remplir ce devoir. Si elle accable les: unes de maux & d'infirmités, pour s'être soustraites volontairement à la loi rigoureuse qu'elle leur impose à cet égard; trop d'asservissement à cette même loi ne deviendroit pas moins préjudiciable à d'autres, qu'aux enfans qu'elles entreprendroient d'allaiter.

Il est des femmes dont la santé est trop délicate, pour qu'elles puissent allaiter. Il y en a qui perpétueroient chez leurs. enfans les principes qu'elles leur ont trans-mis, d'une maladie souvent incurable dont: elles sont elles-mêmes affectées; telles que la phthisie, le virus psorique, &c. Il en est ensin qui ne peuvent allaiter, quoiqu'elles jouissent de tous les avantages, d'une bonne constitution, même qu'elles aient beaucoup de lait; parce qu'elles ont le bout du sein peu disposé à transmettre

cet aliment à l'enfant.

sur l'Art des Accouchemens. 299

D. Quels sont les vices de conformation du mammelon, qui peuvent rendre l'allaite-

ment difficile, ou impossible?

R. On doit regarder comme tels, la dureté extrême de cette partie, & son désaut de longueur. Le bout du sein, quelquesois, au lieu d'être saillant, se trouve comme ensoncé dans le corps de la mamelle, & l'on ne voit à la place qu'il doit occuper, qu'une dépression semblable à celle qu'auroit pu saire le bout du petit doigt. D'autres sois il est très-gros, & si applati, que l'ensant ne peut le pincer; ou bien il est si dur, qu'il ne sauroit se développer, & donner passage au lait.

D. Les femmes qui se proposent de nourrir ne devroient - elles pas s'y préparer avanz

l'accouchement?

R. Il en est beaucoup qui seroient bien de s'en occuper pendant les derniers temps de la grossesse, & qui ne sauroient allaiter sans ces préparations. Elles les commenceront plutôt ou plus tard, selon qu'elles auront plus, ou moins de difficultés à surmonter. Si quelques semaines suffisent aux unes, les autres ont besoin de s'en occuper pendant plusieurs mois.

D. En quoi consistent les préparazions dont il s'agit?

R. Elles consistent, pour quelques femmes, à ramollir le bout du sein & à

300 Principes

le développer; & pour d'autres, seulement à diminuer son extrême sensibilité.

On procurera de la souplesse aux mammelons, & on les amollira lorsqu'ils seront trop durs, en les humestant souvent avec de la falive, avec de l'eau tiède, ou de l'eau de guimauve; & en les tenant couverts d'un linge trempé dans l'une de ces dernières.

On développera le mammelon, & on le rendra plus perméable àu lait, en fai-fant tetter la femme pendant les dernières femaines, même les dernières mois de la grossesse, soit par une personne saine, ou par des petits chiens. Au désaut de ces secours, on se servira d'une pipe, soit de verre, soit de terre cuite, ou de toute autre matière. On connoît des pompes & des suçoirs destinés aux mêmes usages. Mais le moyen le plus sûr, selon nous, est de servir de petites bouteilles de verre blanc, en sorme de ballon, dont le col soit un peu alongé, & médiocrement évasé à son entrée.

On échausse cette bouteille, en y mettant de l'eau presque bouillante, ou en la présentant au seu; on l'applique au sein de manière que le mammelon puisse s'engager dans le goulot, & que l'air n'y trouve aucun accès; on la tient ainsi pendant quelques minutes, & jusqu'à ce que le mammelon s'y trouve alongé de ciuq fur l'Art des Accouchemens. 301
à fix lignes. On répète cette préparation
tous les jours, matin & foir, & autant
de temps que les circonstances l'exigent.
Les femmes qui ont besoin de ces pré-

Les femmes qui ont besoin de ces précautions, feront bien d'ailleurs de porter habituellement des petits étuis destinés à conserver le bout du sein. Ces étuis, qui font de buis, d'ivoire, de cire, ou d'un métal très-mince, ressemblent assez bien à un chapeau détroussé, & sont connus de tout le monde.

On diminue la grande fensibilité du mammelon, en le touchant fréquemment & avec précaution, en le lavant avec du vin chaud, & en insistant sur les succions préparatoires dont nous venons de parler.

D. Quelques causes étrangères aux vices de conformation du mammelon ne peuventelles pas également rendre l'allaitement im-

possible?

R. Indépendamment de ces vices de conformation, on ne voit que trop de femmes obligées de discontinuer l'allaitement après quelques jours, ou après quelques semaines; soit par rapport aux gerçures, aux déchirures & aux ulcérations du mammelon, soit par rapport à l'engorgement ou à l'inflammation des mamelles, & aux dépôts qui y surviennent. D'autres sois c'est une maladie aiguë, qui empêche la semme de se livrer au doux penchant de nourrir elle-même son engone

Principes fant; ou bien elle est forcée de discontinuer, parce que la source du lait se tarit.

D. Comment doit-on nourrir l'enfant que

la mère ne peut allaiter?

R. De toutes les ressources connues, aucune ne mérite la présérence sur celle qui est en usage dans les grandes villes, où bien peu de semmes se mettent en peine de nourrir elles-mêmes leurs enfans : il saut lui donner une nourrice, & ce n'est qu'au désaut de celle-ci qu'il est permis, ou qu'on devroit se permettre de nourrir l'enfant avec le lait des animaux.

## SECTION III.

Du choix d'une nourrice.

D. QUELLES sont les qualités qui doivent nous diriger dans le choix d'une nourrice?

R. Il faut choisir une semme d'un âge moyen; d'une forte complexion, & d'une bonne santé; une semme dont la bouche soit garnie de belles dents, dont les gencives soient sermes & vermeilles, dont l'haleine soit douce, & la transpiration sans odeur désagréable; une semme qui n'ait sur le corps ni pustules, ni tumeurs, ni cicatrices qui dénotent d'anciennes maladies, quoique guéries; une semme qui

foit exempte de grandes passions, qui ne s'adonne ni à la débauche, ni à l'ivrognerie, ni à la colère, &c. On présérera celle dont les cheveux sont bruns, & le tissu de la peau serré, à celle qui sera très-blonde, rousse, ou très-noire; parce que la transpiration de celles-ci est toujours d'une odeur très-pénétrante, souvent nauséabonde, & que leur lait par-

ticipe à ces mauvaises qualités.

Les mamelles doivent être d'une moyenne grosseur, souples, un peu pendantes & parfemées de veines bleuâtres. Le mammelon doit être également souple, & long de plusieurs lignes, il doit se développer au moindre attouchement, ou à la moindre succion, & donner librement issue au lait. L'aréole, ou le cercle qui entoure le mammelon, doit être large, un peu monticuleux, & d'une couleur tirant sur le brun: enfin la nourrice doit avoir beaucoup de lait, d'une bonne qualité, & en sournir également des deux seins.

D. A quelles marques reconnoît-on que le

lait est d'une bonne qualité?

R. Le lait est de bonne qualité, lorsqu'il n'est ni trop épais, ni trop clair; quand il est d'une saveur douce, agréable & légérement sucrée, & qu'il n'a aucune odeur.

On juge de la confistance du lait en le faisant rayer en petite quantité dans une

304 Principes

cuiller d'argent, ou en en plaçant une goutte sur l'ongle du pouce, qu'on incline l'égérement. Quand il est d'une consistance requise, il laisse sur la cuiller un nuage léger, d'une couleur tirant un peu sur le bleu. Ce nuage est épais, lorsque le lait a trop de consistance; & ne s'apperçoit pas, lorsqu'il est trop clair.

La goutte de lait placée sur l'ongle,

La goutte de lait placée sur l'ongle; ne s'en détache pas s'il est trop épais; elle tombe aisément, & n'y laisse que la trace

de l'eau, quand il est trop clair.

On juge de la faveur, même de l'odeur du lait, en en mettant quelques gouttes

fur la langue.

Un fait trop épais, ou trop clair, ne convient pas à l'enfant; & celui qui a de l'odeur, qui faisse sur la langue une sorte d'âcreté, ou qui est d'une couleur jaunâtre, bleuâtre, ou verdâtre, est décidément mauvais.

D. Quelles sont les précautions qu'on doit observer pour juger sainement du lait d'une nourrice?

R. On observera, 1° que cette semme ne soit pas à jeun depuis long-temps, & on aura égard pareillement à la nature de ses derniers alimens, si elle a mangé récemment; car le lait ne peut avoir les qualités requises chez une semme qui souffre la faim, & il contracte d'ailleurs sacilement l'odeur & le goût de certains.

alimens. On observera de même que le sein ne soit pas trop plein, & que le lait n'y soit pas engrumelé; parce que le peu qu'on en exprime alors est toujours trèsséreux. Les doigts de la semme qui servent à saire rayer le lait doivent être propres, asin qu'ils ne sui communiquent aucune odeur, aucune saveur, ni aucune couleur qui sui seroient étrangères: on aura la même attention à l'égard du vase dans lequel on recevra ce liquide. La personne chargée de juger des qualités du lait aura le soin ensin, de ne pas lui attribuer le goût & l'odeur des alimens dont elle aura fait usage dans ses derniers repas.

D. Doit-on avoir égard à l'âge du lait, quand la nourrice a d'ailleurs les qualités

requises?

R. Cette observation est souvent moins importante qu'on ne le pense. Si un lait de deux à trois mois paroît en général présérable à celui de six à huit, quelquesois ce dernier vaut mieux. C'est moins l'âge du lait qui doit nous diriger, que ses qualités & son abondance; en supposant les choses égales d'ailleurs du côté de la constitution physique & morale de la semme.

D. A quels inconvéniens expose-t-on l'enfant, en lui donnant pour nourrice une

femme anciennement accouchée?

R. Le premier, c'est que l'ensant ne digérera ce lait que dissicilement, s'il est trop épais, si on lui en donne fréquemment & beaucoup à la fois; le second, c'est qu'on sera forcé de sevrer l'ensant; de trop bonne heure, ou de lui donner une autre nourrice, si la source du lait; s'épuise avant le temps ordinaire du sevrage. Ces deux inconvéniens peuvent en produire une soule d'autres; tels que le vomissement continuel, quand l'ensant ne peut digérer le lait trop épais, la diarrhée, l'obstruction des glandes mésaraïques, l'atrophie, &c.

D. L'enfant nouvellement né ne rajeunitil pas & ne renouvelle-t-il pas le lait de: sa nourrice, lorsqu'elle est anciennemens ac-

couchée?

R. Bien des hommes sont dans l'opinion que l'ensant nouvellement né produit ce changement dans le lait de sai nourrice; mais cette opinion n'est que le fruit de l'ignorance, & de quelques apparences trompeuses. Elle a eu trop de victimes, pour ne pas en dévoiler la source: voici ce qui a trompé le commun des hommes, & ce qui les trompe encore tous les jours à cet égard. Qu'une semme quitte un ensant de huit à dix mois, pour présenter le sein à un ensant de naissance, qu'observerons-nous? Que l'ensant nouvellement né, qui a peu de besoins dans

fur l'Art des Accouchemens. 307 les premiers jours, ne vuidera le sein de cette femme qu'imparfaitement, chaque fois qu'on le lui présentera, au lieu que l'enfant de huit à dix mois en arrachoit jusqu'à la dernière goutte de lait ; de forte qu'après deux jours, souvent un seul, il y aura redondance, que les mamelles seront pleines, même distendues & gonflées douloureusement, comme bien des femmes l'éprouvent du deuxième au troisième jour des couches, ou du troisième au quatrième. Or, si l'on en tire du lait dans cet état, l'on n'aura qu'un lait clair & féreux, femblable à celui qu'on exprime d'une mamelle où ce fluide s'est engrumelé. C'est cette plénitude accidentelle du sein, & cette fluidité provenant de l'altération du lait dans le sein même, qui ont fait croire que l'enfant nouvellement né renouvelloit & rajeunissoit le lait de fa nourrice. Cette furabondance n'est que momentanée, elle disparoît promptement, & l'enfant manque du néceffaire.

D. Quelles sont les précautions qu'il convient de prendre, quand on ne peut donner à l'enfant qu'une nourrice anciennement accouchée?

R. Quand le lait a trop de confistance, on observera, 1°. d'en donner plus rarement que ne le feroit une semme nouvellement accouchée, & d'en laisser prendre

Principes
moins à la fois; 2°. de faire boire à l'enfant, aussi-tôt qu'il aura tetté, quelques; cuillerées d'eau sucrée & dégourdie, afin de délayer ce lait dans l'estomac,

& d'en favoriser la digestion.

On tiendra la nourrice au régime végétal; on ne la nourrira que de l'égumes, si la faison le permet, & on lui recommandera de boire plus que de coutume, non du vin, ni de la bière ou autres liqueurs fermentées, mais de l'eau pure; ou bien on lui fera prendre une infusion l'égère de thé, de véronique, de fenouil, ou de toutes autres plantes de cette es-pèce. On procurera de cette manière un peu de fluidité au lait ; comme on lui procure en d'autres circonstances, certaines propriétés médicinales, en faisant prendre à la nourrice des substances qui en jouissent.

D. Peut-on procurer au lait qui est trop clair, la consistance qui convient à la nour-

riture de l'enfant?

R. Lorsque cet excès de fluidité ne provient que de quelques causes accidentelles, comme de la mauvaise qualité des alimens que prend la femme, &c. on peut y remédier & procurer plus de confistance au lait. On prescrit alors un meilleur régime, on donne des substances plus nourrissantes, des farineux, du lait même, si la femme peut s'y habituer. Mais on ne corrigejamais l'excès de sluidité qui dépend de la foiblesse des organes, ou de la constitution de la femme.

D. Le lait ne perd-il rien de ses bonnes qualités chez les semmes qui ont leurs règles périodiquement, & chez celles qui deviennent grosses dans le cours de l'allaitement?

R. Nous avons déjà fait observer que le lait devenoit un peu plus clair & moins abondant pendant l'écoulement des règles; mais il recouvre promptement ses bonnes qualités après cette évacuation, lorsque la femme est d'une forte constitution, & l'enfant n'en éprouve aucune altération.

Quelquefois cette évacuation périodique est salutaire à la nourrice; elle semble améliorer le lait; elle l'entretient du moins dans ses bonnes qualités, qu'un état de pléthore soutenu ne manqueroit pas d'altérer.

La grossesse, chez bien des semmes, n'influe pas davantage sur le lait, & il n'en devient pas moins propre à nourrir l'enfant; chez d'autres, il s'altère & se décompose au point qu'on devroit plutôt le regarder comme un poison, que comme un aliment.

Quelques femmes peuvent donc continuer d'allaiter, quoiqu'elles foient réglées tous les mois, ou qu'elles foient enceintes, puisque leur lait conferve fes bonnes qualités; mais lorsqu'il s'altère &

Principes
fe déprave, quelle qu'en foit la cause, il
faut changer l'enfant de nourrice.

D. Peut - on changer l'enfant de nourrice fans l'exposer à quelques inconvéniens?

R. On ne l'exposera à aucun inconvénient, toutes les sois qu'on substituera un lait de bonne qualité à celui qui sera décidément mauvais. Le préjugé où l'on est encore à cet égard, a été suneste à beaucoup d'enfans, & contribue peut-être aux petits déréglemens de certaines nourrices, qui se persuadent qu'on n'osera pas les saire remplacer par d'autres. Si quelques enfans ont paru victimes de ce changement, c'est qu'on l'a trop différé, & qu'ils avoient puisé le germe de la mort dans le sein de leur première nourrice.

D. Quelles sont les précautions qu'on doit observer en changeant un enfant de nourrice?

R. La plus essentielle est de choisir un bon lait, & de le prendre proportionné à l'âge & aux forces de l'enfant. Accoutumé aux accens, à la figure, aux manières de sa première nourrice, si l'enfant resuse le sein de la nouvelle, on le trompera, en le lui présentant dans l'obscurité, & en gardant le silence.

D. Quel est le régime que doit observer la femme pendant le cours de l'allaitement?

R. Elle ne prendra que des alimens de bonne qualité, autant qu'elle le pourra. fur l'Art des Accouchemens. 311
Elle écartera de son régime les substances qui abondent en acides, à moins qu'elles ne lui soient prescrites dans l'intention de remplir quelques vues particulières. Elle n'usera habituellement d'aucunes viandes fortement salées & épicées; elle ne boira que du vin coupé avec de bonne eau, de la bière ou du cidre, selon son usage; & elle s'interdira les liqueurs spiritueuses, telles que l'eau-de-vie, &c.

D. La femme peut - elle présenter le sein à l'enfant dans tous les instans du jour, &

dans toutes les circonstances possibles?

R. Non: quels que soient l'âge & la sorce de son nourrisson, il ne convient pas qu'elle lui donne le sein, 1°. lorsqu'elle aura long-temps soussert de la saim; 2°. immédiatement après le repas; 3°. dans le travail d'une indigession; 4°. dans un état d'ivresse, ou après une violente passion, comme un accès de colère, &c.; 5°. ensin immédiatement après avoir habité avec son mari.

D. Une nourrice ne devroit-elle pas vivre dans une continence absolue pendant le temps de l'allaitement?

R. On ne fauroit le lui prescrire trop rigoureusement; parce qu'il y a des semmes qui ne s'écartent que trop fréquemment de cette loi. Si ces semmes ne s'exposoient pas à devenir grosses, une pareille infraction seroit tolérable, même permise;

une continence absolue, de la part de quelques nourrices, pouvant influer sur le lait aussi désavorablement que le trops fréquent usage du mariage chez d'autres.

D. Si le manvais régime & le trouble des passions peuvent influer si puissamment sur le lait de la semme, ne vandroit-il pas mieux nourrir l'enfant au biberon, que de le con-

fier à une nourrice étrangère?

R. Les suites fâcheuses du déréglemente de quelques nourrices, & la difficulté des s'en procurer un assez grand nombre, ent certaines occasions, pour tous les enfanss qui naissent dans une grande ville, telles que Paris; & sur-tout pour ceux qu'ont dépose dans les hôpitaux, ont inspiré depuis long-temps l'idée de l'allaitement au biberon. Des essais en ont été faits, mais avec trop peu de succès jusqu'ici, pour qu'on puisse préserer cette ressource à celles que nous offrent les bonnes nourrices.

S'il est des cas où l'allaitement au biberon doit être admis exclusivement, ce n'est
qu'à l'égard des enfans qui naissent intectés,
de certaines maladies, qu'ils communiqueroient inévitablement à la semme qui se
chargeroit de les allaiter; & de ceux qui
apportent en naissant des vices de conformation à la bouche qui les empêchent
de tetter. Nous ne parlerons de cette espèce
d'allaitement, que parce qu'il devient une
ressource nécessaire dans ces sortes de cas.

SECTION

#### SECTION IV.

De l'allaitement au biberon, ou de la manière de nourrir l'enfant avec le lait des animaux.

D. QUELLES sont les différentes espèces de lait qui peuvent servir à la nourriture de l'ensant?

R. Le lait de vache & celui de chèvre paroissent les seuls qu'on ait employés jusqu'ici, comme alimens. Si l'on a prescrit quelquesois celui d'ânesse, c'étoit plutôt comme médicament, que dans la vue de nourrir, quoique d'ailleurs il soit très-propre à cet esset.

Le lait de chèvre étant plus léger que celui de vache, sembleroit mériter la présérence. La chèvre peut l'offrir d'ellemême à l'enfant; elle se prête à la succion avec la plus grande docilité; il sussit de le lui présenter une seule sois, pour qu'elle aille au devant de ses besoins, & qu'elle se place convenablement sur le berceau pour le faire tetter, si on la laisse agir en liberté. Ce lait, quoique plus léger que celui de vache, a cependant encore trop de consistance pour la plupart des ensans; & ils le digèrent assez mal, si l'on

O

Principes Principes

ne prend le parti de l'affoiblir en le coti<sup>2</sup> pant, soit avec de l'eau d'orge, soit avec de l'eau commune un peu sucrée.

Comme on ne peut le couper de cette manière, quand la chèvre allaite ellemême, on observera de n'en laisser tetter que peu à la fois, & de donner ensuite à l'enfant de l'eau d'orge, ou de l'eau sucrée.

Le lait de vache ne peut être donné qu'avec le biberon.

- D. Quelles sont les considérations qu'on doit avoir dans le choix de ces sortes de lait?
- R. Le lait des animaux ne présente pas moins de dissérences spécifiques que celui des semmes. Il faut prendre le plus léger & le plus nouveau; choisir l'animal d'un âge moyen, & le saire nourrir dans les pâturages ou en pleine campagne: le lait des animaux qu'on tient à l'étable étant toujours plus épais & moins parfait.

Il faut tirer le lait chaque fois qu'on en aura besoin pour l'ensant, ou du moins le plus souvent possible; parce qu'il s'altère & se décompose promptement, surtout dans les grandes chaleurs de l'été. La précaution de le faire bouillir, pour le conserver, comme cela se pratique dans les villes, où l'on ne peut à chaque instant s'en procurer de nouveau, nous pagant les villes par le procurer de nouveau, nous pagant les villes par les villes par le procurer de nouveau, nous pagant les villes par le procurer de nouveau, nous pagant les villes par le procurer de nouveau, nous pagant les villes par le procurer de nouveau, nous pagant le plus seus les villes par le plus seus les villes par le procurer de nouveau, nous pagant le plus seus les villes par le procurer de nouveau, nous pagant le plus les villes par le plus seus les villes par le procurer de nouveau, nous pagant le plus les villes par le procurer de nouveau, nous pagant le plus les villes par le procurer de nouveau, nous pagant le procurer de nouveau pagant le procure de no

fur l'Art des Accouchemens. 319 roît inutile, même mauvaise; il vaut mieux tenir le lait dans un lieu frais & sain.

D. Comment doit-on administrer ce lait

aux enfans?

R. La meilleure manière de l'administrer seroit de le lui faire tetter au pis de l'animal même; & comme on ne le peut que très-difficilement, on le donnera, soit avec un biberon, ou une cuiller, ou un gobelet. On se sert à la campagne d'un biberon de bois, ou d'étain, fait en forme de bouteille un peu alongée, dont le chaperon est terminé par une espèce de manimelon, qui n'est percé que d'un seul trou. Si la forme de ce biberon est commode, la matière dont il est fait le rend peu recommandable. Indépendamment de ce que le bois contracte une odeur désagréable & mal-faisante, quand il a été pénétré par le lait chaud, même par l'eau qui sert à le laver intérieurement, & que l'étain contient quelques parties arfénicales, c'est qu'on ne peut nettoyer le dedans de ces vases avec exactitude.

Un biberon de verre mérite la préférence, & il est facile de se le procurer par-tout. Les petites bouteilles dont les Apothicaires se servent pour leurs potions médicinales offrent tous les avantages que

nous desirons.

On y ajuste une éponge fine, en forme de bouchon, alongée d'un demi-pouce,

qu'on recouvre d'un linge clair attaché autour du collet de la bouteille. Chaque fois qu'on a allaité l'enfant, on met la petite éponge dans l'eau, ainsi que le linge qui la recouvroit; on lave l'une & l'autre, & on les exprime; on nettoie de même la bouteille, & elle ne contracte jamais l'odeur aigre que prennent les autres biberons après quelques jours.

D. Quelles sont les précautions qu'il faut shifterver à l'égard du lait même, qu'on donne

à l'enfant?

R. On le coupe dans les premiers temps avec partie égale, & même deux parties de bonne eau sucrée; ou bien avec une légère eau d'orge (a). On l'affoiblit moins dans la suite, à mesure que l'enfant se fortisse; enfin on le donne pur. On ne met dans la bouteille que la quantité qu'on veut donner chaque sois à l'enfant; & on le sait chausser au bain-marie,

<sup>(</sup>a) Cette eau se prépare en faisant bouillir, pendant un quart d'heure ou environ, une demicuillerée d'orge dépouillée de son écorce, dans une chopine d'eau. Au désaut de cette orge mondée, on se servira d'orge ordinaire; mais on aura la précaution de lui faire subir une légère ébullition dans une première eau, avant de l'employer, & on la fera bouillir plus long-temps que l'autre. L'eau d'orge préparée pour le besoin de l'enfant ne doit pas être conservée au-delà d'un sour, parce qu'elle s'aigrit.

fur l'Art des Accouchemens. 317 L'est-à-dire, en plongeant la bouteille dans de l'eau très-chaude. La chaleur qu'il convient de lui procurer doit être à-peu-près celle du lait qui sort du pis de l'animal.

D. Quelle est la quantité de lait qu'on doit donner chaque sois à l'ensant, & à quel intervalle de temps doit-on lui en donner?

R. On ne doit pas lui en donner audelà de trois à quatre cuillerées ordinaires chaque fois, dans les premiers jours; & plus fouvent que de deux heures en deux heures, quand l'enfant sera éveillé.

On en augmentera la quantité dans la fuite; mais on y mettra toujours au moins

le même intervalle.

D. A quels signes reconnoîtra-t-on que le lait des animaux convient à l'enfant, & qu'il

le digère bien?

R. Le lait se digère bien, quand l'enfant va deux ou trois sois, & même quatre à la selle dans les vingt-quatre heures; & lorsque ses matières sont liquides, jaunâtres, & liées comme des œuss brouillés. Les digestions sont mauvaises, quand il évacue plus fréquemment, ou beaucoup plus rarement; quand ses matières sont séreuses, sétides & chargées de beaucoup de pelotons blanchâtres, semblables à du fromage; de même que lorsqu'elles sont épaisses, grisâtres ou blanchâtres, & grasses, à-peu-près comme la terre argilleuse. On doit tirer la même industion

O iij

318 Principes

du lait caillé & d'une odeur aigre, qu'il rejette souvent par le vomissement, ainsi que des matières verdâtres & poracées, qu'il rend par les selles.

D. Que faut-il changer au régime de l'en-

fant dans tous ces cas?

R. Lorsque l'enfant évacue fréquemment des matières séreuses & mal digérées, on lui fera prendre plusieurs sois le jour, quelques grains de poudre absorbante, telle que la magnésie calcinée, ou les yeux d'écrevisses préparés, qu'on délaiera dans une cuillerée d'infusion de sleurs de camomille romaine un peu sucrée, ou dans une très-légère teinture de rhubarbe. On coupera ce lait avec de l'eau de riz, au lieu de cette tisanne d'orge dont nous ayons parlé.

Lorsque les matières seront verdâtres & poracées, on insistera davantage sur les poudres absorbantes, & on en sera prendre jusqu'à dix-huit & vingt grains, même plus, dans le cours de vingt quatre

heures.

Les absorbans conviennent encore, quand l'enfant rejette fréquemment le lait par le vomissement, & que sa bouche exhale une odeur aigre très forte. Souvent il est à propos de le purger après deux ou trois jours de l'usage de ces poudres, même avant de lui en faire prendre. Le fyrop de chicorée, à la dose d'une once

sur l'Art des Accouchemens. 319 dans le cours de la matinée, est le pur-

gatif que nous préférons.

On doit affoiblir le lait, en le coupant avec une plus grande quantité d'eau, lorsque l'enfant est constipé, lorsqu'il va rarement à la garde-robe, & que ses excrémens sont épais & gras. On lui en donnera moins fréquemment; & on lui fera prendre dans les intervalles quelques cuillerées d'eau d'orge miellée.

Au moyen de toutes ces précautions; & de ce régime sagement ordonné, on parviendra à élever quelques enfans avec le

lait des animaux.

### SECTION V.

Suite de la nourriture de l'enfant jusqu'au terme du sevrage.

D. L'ENFANT doit-il tetter fréquemment?

R. En général, une bonne nourrice pèche plutôt, à cet égard, par excès que par omission. Elle présente le sein à son ensant à chaque instant, quelle que soit la cause de ses inquiétudes & de ses cris, persuadée que la saim y a toujours la plus grande part, & que le tetton seul convient pour l'appaiser. En surchargeant ainsi l'estomac de l'ensant, il ne peut saire une bonne digestion; il rejette le lait

comme par regorgement, ou il passe par la voie des selles sans être digéré. La langue se couvre d'une croûte blanche & épaisse; & quelquesois la bouche se garnit de petits boutons de même couleur, qui dégénèrent bientôt en autant d'ulcères. L'œsophage, l'estomac & tout le canal intestinal s'afsectent de même, & il survient un dévoiement qui enlève promptement l'enfant.

On préviendra ces défordres chez la plupart des enfans, en ne leur donnant à tetter, dans les commencemens, que toutes les deux à trois heures, & même

plus rarement.

Le regorgement du lait ou le vomissement, ainsi que le hoquet, que bien des femmes regardent comme autant de signes de la prospérité de leur nourrisson, exigent ces précautions; ce sont des symptomes de maladie, & non des signes de santé.

D. Vous êtes donc dans l'opinion qu'il faut régler les enfans, & ne leur donner à

tetter qu'à des heures déterminées?

R. Non: ce n'est pas les régler que de leur donner à tetter rarement, & d'attendre qu'ils aient digéré le lait qu'ils ont pris, pour leur en donner de nouveau. Il y auroit autant d'inconvéniens à leur laisser supporter la saim pendant des heures entières, qu'à leur donner le sein à chaque instant. Les semmes qui habituent leurs ensais à ne tetter que toutes les quatre

sur l'Art des Accouchemens. 321 heures, par exemple, & qui ne leur pré-fentent jamais le tetton dans le cours de la nuit, recherchent bien moins les avantages de ces enfans, que leur propre commodité.

D. A quels signes reconnoîtra-t-on que l'enfant a besoin de nourriture?

R. On ne peut établir de règles bien positives à cet égard. Nous remarquerons seulement qu'il n'y a point d'inconvéniens à donner le sein à l'enfant, lorsqu'il a été plus de deux à trois heures fans le prendre; soit qu'il ait dormi pendant ce temps, ou qu'on l'ait tenu éveillé. Ses cris s'appaiferont dès que la nourrice l'approchera de son sein, s'ils n'ont d'autres causes que la faim; il le faisira avec empressement, il le tettera de suite jusqu'à ce qu'il y air puisé de quoi se satisfaire, & il demeurera tranquille. Il continuera de crier, & ne faisira le sein qu'autant qu'on le forcera de le prendre, & il le quittera souvent, si les cris proviennent de la douleur, de la gêne qu'il éprouve dans fon maillot, ou du besoin d'être changé de langes.

D. A quel âge doit-on commencer à donner d'autres alimens que le lait de la nourrice?

R. On commencera plutôt ou plus tard, selon que l'enfant sera plus soible ou plus fort, & que la nourrice aura plus ou moins de lait ; il conviendroit de ne le faire qu'après les cinq ou six premiers mois : une femme qui ne peut nourrir un enfant uniquement de son lait jusqu'à cet âge, ne sauroit passer pour une excellente nourrice, & être choisse présérablement à une autre. Si la plupart des semmes qui habitent la campagne commencent plutôt à faire manger leurs enfans, ce n'est pas qu'elles manquent de lait, mais uniquement par rapport à l'usage qui leur a été transmis par leurs parens. Le premier aliment que donnent ces semmes est une bouillie grossière & mal faite, qu'un adulte digéreroit difficilement. Cet aliment pernicieux par sa nature même, le devient encore bien plus, par la manière dont on l'administre à l'enfant.

On ne peut voir sans dégoût, & même sans une sorte d'indignation, les nourrices porter la bouillie avec leur doigt, fouvent mal-propre, jusqu'au fond de la bouche de l'enfant, ramasser autour de ses lèvres celle qu'il refuse d'avaler, & le contraindre de la recevoir de nouveau. Ces femmes se servent-elles de cuiller pour l'administrer, elles portent la bouillie dans leur bouche, pour s'assurer si elle n'est pas trop chaude, & la font prendre ensuite à l'enfant. Qu'on instruise ces femmes, elles se rendront moins coupables à l'avenir. Qu'on leur apprenne qu'elles peuvent préparer un aliment plus léger, plus salutaire & aussi peus dispendieux, & qu'elles peuvent le donner

sur l'Art des Accouchemens. 323 avec moins d'inconvéniens; & elles renonceront à ce dégoûtant & dangereux usage.

D. Quels sont les alimens qu'on doit

donner à l'enfant?

R. Une bouillie bien préparée, une panade, une crême de riz, d'orge ou de gruau, font les premiers alimens qu'on doit donner à l'enfant, quand le lait de la nourrice ne suffit pas à ses besoins, ou lorsqu'on veut habituer ses organes à des nourritures plus solides.

D. Comment doit-on préparer ces alimens?

R. On emploiera, pour la bouillie, de la farine cuite au four, jusqu'à ce qu'elle foit un peu rousse : chaque semme, en faisant son pain, peut en préparer pour une semaine, en en faisant sécher plein

une jatte de terre à la fois.

Il faut peu de cette farine pour la quantité de bouillie qui convient à un repas. On la délaie exactement dans quelques cuillerées de lait, & on ajoute de celuici à mesure qu'elle se délaie : on l'expose ensuite au feu, dans un poëlon de terre vernissé, & non de cuivre, & on la fait cuire convenablement.

On peut se servir de pain séché au sour & réduit en poudre fine, pour préparer

la bouillie.

La panade la plus légère se prépare en faisant bouillir du pain blanc & un peu rassis, dans une médiocre quantité d'eau, jusqu'à ce que le tout soit réduit à la consistance de bouillie ordinaire. On y ajoute ensuite un peu de sel; & quelquesois du

sucre en place de sel.

La crême de riz, d'orge perlée & de gruau, se prépare de même. On expose ces semences à une longue ébullition, dans un vase de terre convenable. On ne met d'abord que peu d'eau, & on en ajoute de temps en temps, à mesure que ces semences se gonslent. On les écrase avec une cuiller, lorsqu'elles sont bien gonslées ou crevées; on les passe à travers un tamis, & on ajoute du sel ou du sucre à cette crême.

On peut préparer ces crêmes de temps en temps avec un bouillon gras, mais léger, quand l'enfant approchera du moment du fevrage.

D. Doit-on donner une grande quantité de ces alimens à la fois, & les répéter dans

les vingt-quatre heures.

R. On n'en donnera que quelques cuillerées à bouche dans les premiers temps, & une seule sois le jour; mais on en augmentera la quantité dans la suite, & ou en accordera à l'ensant soir & matin. On sur en donnera également à l'heure du diner, quand il sera question de le préparer au sevrage.

D. A quel age doit-on sevrer l'enfant?

R. Le vœu de la nature semble tel, qu'on ne devroit sevrer l'enfant qu'après la sortie des vingt premières dents, qu'on appelle dents de lait; mais il est rare qu'on le fasse tetter jusqu'à cette époque. On sèvre la plupart des enfans entre le douzième & le dix-huitième mois de leur naissance, & souvent c'est le temps où ils ont le plus besoin de leur nourrice, parce qu'ils sont dans le plus grand travail de la dentition.

D. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour sevrer l'enfant?

R. On doit observer, 1°. de ne jamais le sevrer dans le temps où plusieurs dents seront prêtes à percer, quels que soient sa force & son âge; parce que c'est un temps de douleurs, que la bouche est souvent enslammée, & si sensible, que quelques ensans peuvent à peine faisir le tetton de leur nourrice; & qu'ils feroient de trèsmauvaises digestions, si on leur donnoit alors des alimens nouveaux; 2°. on doit sevrer l'ensant insensiblement, en lui donnant à tetter moins fréquemment chaque jour, & en l'habituant de même à une plus grande quantité de ces alimens dont nous avons parlé; 3°. on les privera d'abord du tetton pendant la nuit, & ensuite pendant le jour.

D. Ne vaudroit-il pas mieux sevrer l'ere-

326 Principes fant tout-à-coup, que de le priver insensiblement du tetton?

R. Non: en le sevrant tout-à-coup; cette privation lui devient trop sensible; rien ne peut l'en consoler & l'en distraire; il s'agite, il crie jour & nuit; on est d'ailleurs obligé de lui donner tout à coup une plus grande quantité d'alimens auxquels son estomac n'est pas encore parfaitement habitué; & sa santé, pour l'ordinaire, ne tarde pas à donner des marques d'altération.

La meilleure manière de sevrer l'enfant; est celle que nous venons de prescrire : l'enfant & la nourrice y trouvent leurs

avantages.

D. Comment doit-on nourrir l'enfant qu'on vient de sevrer?

R. On lui donnera trois fois le jour l'une des crêmes que nous avons preferites, ou de la panade. On lui mettra de temps à autre une petite croûte de bon pain entre les mains, pour qu'il s'amuse à la manger. On lui fera prendre quelquesois de la soupe grasse; & quand il fera plus avancé, on lui donnera un œuf frais & un peu de légumes bien préparés.

Sa boisson sera de l'eau bien pure, à laquelle on ajoutera de temps à autre un peu de bon vin, si l'on peut s'en procurer.

D. Quelles sont les précautions que do ?

fur l'Art des Accouchemens. 327 prendre la femme relativement à elle-même, après avoir sevré son enfant?

R. Quelle que soit la durée du temps

pendant lequel elle aura nourri, & la quantité de lait qu'elle confervera en fevrant, elle évitera de s'exposer au froid & à l'humidité; elle se tiendra chaudement, & se couvrira le sein exactement; elle gardera le lit, si le lait est encore assez abondant pour distendre douloureusement les mammelles; & elle s'efforcera d'exciter un peu de transpiration. Pour remplir cette dernière vue, elle boira abondamment d'une infusion de thé, de véronique, de fleurs de tilleul, ou de fureau, avec un peu de sucre. Dans la fuite, élle fera usage d'une légère tisanne de racine de perfil, ou de scorsonnaire, à laquelle elle ajoutera un ou deux gros de sel d'epsom, de glauber ou de duobus; elle prendra quelques lavemens tous les jours, & rendra celui du matin purgatif, en y ajoutant du miel commun & une fusfisante quantité de l'un des sels dont nous avons parlé. Enfin elle se purgera une ou deux sois, si le cas le requiert, après avoir sevré son enfant.





# SECONDE PARTIE.

## CHAPITRE PREMIER.

De l'accouchement contre nature & laborieux, des causes qui peuvens le rendre tel, &c.

D. Qu'ENTEND - ON, en général, par accouchement contre nature?

R. On appelle contre nature, l'accouchement qui ne peut absolument pas se terminer par les seules forces de la semme; de même que celui que l'on ne peut consier aux soins de la nature sans exposer la vie de la mère ou de l'enfant, & quelquesois celle de l'un & de l'autre.

Pour nous conformer au langage ordinaire, nous distinguerons deux sortes d'accouchemens contre nature; ceux qui n'exigent que la main d'une personne instruite, & ceux qui ne peuvent être terminés qu'au moyen de quelques instrumens.

Nous appellerons les premiers accouchemens contre nature, & les derniers accouchemens laborieux. Principes sur l'Art des Acc. 329

D. Tous les acconchemens contre nature ou laborieux peuvent-ils être confiés au savoir à la dextérité des Sages-femmes?

R. Non; il en est de l'une & l'autre espèces qui exigent plus de savoir, plus d'intelligence, plus de force & plus de fermeté d'ame qu'on en accorde communément aux Sages-semmes; mais il convient que ces semmes soient instruites des causes qui peuvent rendre l'accouchement contre nature ou laborieux, & qu'elles connoissent toutes les ressources de l'Art aussi-bien que ses difficultés, pour qu'elles puissent se procurer à temps les secours convenables, & qu'elles n'entreprennent rien au-delà de ce qu'elles peuvent saire.

### ARTICLE PREMIER.

Des causes qui peuvent rendre l'accouchement contre nature ou laborieux; des signes qui feront reconnoître que l'accouchement sera tel; & de ce qu'il faut saire dans chacute de ces cas.

D. QUELLES sont les causes qui peutvent rendre l'acconchement contre nature ou laborieux?

R. Ces causes sont très-nombreuses:
les unes proviennent de l'enfant même,

Principes

& les autres de la femme. Celles qui dependent de l'enfant, consistent dans sa maus vaile fituation, dans fa conformation monftrueuse, ou dans quelques-unes des ma-ladies dont il peut être affecté dans le sein de sa mère. Les causes qui proviennenti de la femme doivent être attribuées aux accidens qui compliquent le travail des l'accouchement, à la mauvaise conformation des parties de la génération & du bassin; à l'obliquité de la matrice, à la rupture de ce viscère, & aux conceptions extra-utérines.

## SECTION PREMIÈRE.

De la mauvaise situation de l'enfant, de sa: conformation monstrueuse, &c.

D. Qu E doit - on appeller mauvaise post-

tion de l'enfant?

R. On doit appeller mauvaises positions, toutes celles dans lesquelles l'enfant ne peut sortir du sein de sa mère sans que l'Accoucheur n'éloigne de l'orifice de la matrice la partie qui s'y présente, pour en ramener une autre. En partant de cette définition, la position de l'enfant sera mauvaise toutes les fois qu'il ne présentera pas le sommet de la tête, les pieds, les genoux, ou les fesses; puisqu'il ne fur l'Art des Accouchemens. 334
peut sortir qu'autant qu'il offre l'une de ces parties à l'orifice de la matrice; à moins qu'il ne soit extrêmement petit, relativement à la capacité du bassin de sa mère.

D. Comment reconnoîtra - t - on que l'enfant se présente dans une mauvaise position; & que doit saire l'Accoucheur lorsqu'il se pré-

sente ainsi?

R. Ce n'est qu'au moyen du toucher qu'on peut reconnoître la partie que l'enfant présente à l'orifice de la matrice, & la manière dont se présente cette partie. Le temps le plus propre pour en faire la recherche, est celui du travail, où le col de la matrice se trouve complétement essacé & bien dilaté. On se rappellera que la position de l'ensant peut changer en quelques occasions, & qu'elle ne devient sixe alors, qu'après l'écoulement des eaux de l'amnios; de sorte que ce n'est que dans ce moment que l'Accoucheur doit en porter son jugement.

Presque toujours on est obligé de retourner l'ensant lorsqu'il se présente mal, & de le saire venir par les pieds; parce qu'il n'y a que très-peu de cas où l'on puisse le ramener à sa position naturelle. Nous exposerons dans la suite ce qu'il y a de mieux à faire à l'occasion de toutes les mauyaises positions de l'ensant, D. Qu'entendez - vous par conformation

monstrueuse de l'enfant?

R. Nous n'appellons ainsi que celles qui peuvent mettre obstacle à l'accouchement; ces conformations dans lesquelles on remarque deux têtes unies, liées & confondues entre elles; ou simplement comme entées sur un même corps; celles où il y a deux troncs pour une seule tête, out bien qui offrent deux ensans unis par quelques-unes des parties de leur corps, &: qui paroissent ne former qu'un tout.

D. Ces conformations monstrueuses rendentelles toujours l'accouchement impossible sans:

les secours de l'art?

R. Non: il s'est trouvé des semmes! assez bien constituées pour accoucher aussi heureusement de ces enfans que des autres; mais souvent aussi de pareilles conformations ont rendu l'accouchement extrêmement difficile: la circonstance est d'autant plus embarrassante, même pour le Praticien le plus instruit, qu'il est presque toujours impossible de bien reconnoître ces sortes de monstruosités avant l'accouchement.

D. Quelles sont les maladies de l'enfant qui peuvent rendre l'accouchement difficile, ou

contre nature?

R. L'hydropisse de la tête, connue sous le nom d'hydrocéphale; l'hydropisse du basventre, appellée ascite; ainsi que des

fur l'Art des Accouchemens. 333 tumeurs, dont nous citerons des exemples, font les feules maladies de l'enfant qui puissent rendre l'accouchement difficile, & exiger en ce moment les secours de l'art.

D. A quels signes reconnoît-on l'hydro-

pisse de la tête, ou l'hydrocéphale?

R. On reconnoît l'hydrocéphale à la grosseur & à la souplesse extraordinaire de la tête, à l'écartement des os du crâne, ainsi qu'à la largeur des sutures & des sontanelles. Quand il y a beaucoup d'eau dans le crâne, les sutures sont de la largeur d'un travers de doigt & plus, & les sontanelles égalent l'étendue du creux de la main. La tête paroît au toucher comme une vessie épaisse & remplie de sluide; lorsque c'est l'une des sontanelles qui se présente, elle se tend & se durcit pendant la douleur de l'accouchement, & s'amollit après cette douleur, comme le fait la poche des eaux.

D. Les eaux qui constituent l'hydrocéphale sont-elles toujours épanchées dans l'intérieur

du crâne?

R. Non: l'épanchement est quelquesois à l'extérieur, & sous les tégumens seulement. Ces tégumens forment alors une espèce de poche, qui s'avance plus ou moins dans le col de la matrice, & se présente au doigt de l'Accoucheur, comme la poche des eaux de l'amnios même.

334 Principes

Cette maladie, qu'on nomme hydro-cephale externe, se distingue aisément de la première, en ce qu'on ne trouve à l'endroit de l'épanchement ni sutures ni fontanelles; ou bien qu'elles paroissent dans l'état naturel, quand le doigt les découvre.

D. Quels sont les signes qui dénotent l'hya

dropisie du bas-ventre?

R. On ne reconnoît cette espèce d'hydropisse qu'à la grosseur & à la distension du ventre, & sur-tout à l'ondulation ou fluctuation des eaux: il faut porter toute la main dans la matrice pour en bien juger.

D. Quelles sont les tumeurs appartenantes à l'enfant, qui peuvent rendre l'accouchement

difficile?

R. Ces tumeurs ne se trouvent, pour l'ordinaire, qu'au bas du tronc, & derrière le bassin de l'enfant; presque toujours elles ne sont formées que par de l'eau, & de l'espèce de celles qu'on appelle spina bistida. Il s'en est vu d'assez grosses pour surpasser de beaucoup le volume de la tête de l'enfant. Quand de pareilles tumeurs se présentent à l'orifice de la matrice, on est long-temps incertain de la position de l'enfant, & l'on ne peut en juger qu'en portant la main sort avant dans le sein de la femme. Les tumeurs aqueuses dont il s'agit ne sont pas les

feules qui puissent affecter l'enfant avant sa naissance; & rendre l'accouchement dissicile à quelques égards; il en est aussi l'une nature fongueuse, qui peuvent acquérir le même volume, & produire les mêmes essets relativement à l'accouchement; mais les exemples en sont plus rares (a).

D. Que doit - on faire pour terminer l'accouchement, quand l'enfant est hydrocéphale, quand il y a hydropisie du bas-ventre, ou lorsqu'il existe une tumeur semblable à celles

dont on vient de parler?

R. Il faut évacuer les eaux, en faisant une ponction, si elles sont en assez grande quantité pour s'opposer à l'accouchement. La Sage-semme, dans tous ces cas, ne s'en rapportera pas à ses propres connoissances, & consultera, un Accoucheur instruit.



<sup>(</sup>a) Nous avons observé une tumeur de cette espèce, dont la longueur étoit de cinq pouces, & l'épaisseur de quatre : cette tumeur étoit placée au bas du tronc, & pendoit entre les cuisses de l'ensant.

## SECTION II.

Des accidens qui peuvent se manifester danss le cours de l'accouchement, & le rendres contre nature.

D. QUELS sont les accidens qui peuvents rendre l'accouchement contre nature?

R. Ces accidens font, 1°. l'hémorrhagies ou la perte; 2°. les convulsions; 3°. l'épuissement des forces de la femme; 4°. less foiblesses ou syncopes; 5°. la présence des quelque descente ou hernie, qu'on ne peut réduire; 6°. la sortie du cordon ombisical.

D. Les accidens dont vous venez de faire: l'énumération peuvent - ils rendre l'accouchement impossible sans le secours de l'art?

R. La plupart de ces accidens ne fauroient rendre l'accouchement impossible: fans les secours de l'Art; mais ils peuvent tellement insluer sur la vie de la mère, ou sur celle de l'ensant, que l'un ou l'autre, quelquesois même les deux, périroient infailliblement, ou seroient exposés au danger le plus imminent, si l'ont ne terminoit l'accouchement.

D. D'où provient l'hémorrhagie qui exige.

R.

R. Quelquefois le fang vient de la matrice même, par le vagin; d'autres fois il s'échappe par le nez ou par la bouche, & en assez grande quantité pour donner les plus vives inquiétudes. Dans le premier cas, la perte est occasionnée par le détachement du placenta; dans le second, l'hémorrhagie dépend de la pression que la matrice exerce fur les vaisseaux du basventre; à l'instant des grands efforts que la femme faits pour accoucher.

D. Pourquoi devons-nous opérer l'accouchement dans tous ces cas?

R. On doit opérer l'accouchement, 1°. dans le cas de perte, parce que cet accident ne peut cesser qu'autant que la matrice se contracte & se resserre sur ellemême ; or , elle ne peut fe contracter & se resserrer ainsi qu'après l'accouchement. Non-seulement on doit opérer l'accouchement, quand il survient une perte confidérable dans le cours du travail, mais on est encore autorisé à le faire lorsqu'elle se maifeste beaucoup plutôt, & qu'elle résiste aux moyens ordinaires. Voyez p. 257 & Suiv.

Il est également nécessaire de terminer. l'accouchement, quand le fang fort de la bouche ou du nez en grande abondance, dans le moment des efforts que la femme fait pour se délivrer, afin de la soustraire

à la nécessité de ces mêmes efforts alors dangereux.

D. Quelle est la cause des convulsions qui affectent la semme dans le travail de l'accouchement?

R. Ces convulsions peuvent dépendre de l'extrême sensibilité de la matrice; de la plénitude & de l'engorgement des vaisseaux du cerveau, provenans des efforts mêmes de l'accouchement; ensin elles peuvent être habituelles, & alors elles sont presque toujours épileptiques. Les convulsions peuvent être momentanées, ou permanentes, & avec perte, ou sans perte de connoissance dans l'intervalle qu'elles laissent.

D. Doit-on opérer l'accouchement toutes les fois qu'il survient des convulsions dans

le cours du travail?

R. Non: parce qu'il est possible que les convulsions ne se soutiennent qu'un instant, & qu'elles ne s'opposent point à ce que la femme accouche seule & sans danger. Il saut opérer l'accouchement, lorsque les convulsions se manifestent à plusieurs reprises, & lorsqu'elles sont suivies de perte de connoissance, avec tumésaction & rougeur à la face, &c.

Nous observerons cependant qu'il est souvent à propos de faire saigner la semme, soit du bras ou du pied, même de la gorge, avant que d'entreprendre de

sur l'Art des Accouchemens. 339 l'accoucher; & qu'il y a des cas où il convient également de la baigner. Mais on n'aura recours à ce dernier moyen, qu'autant qu'il n'existera point d'engorgement au cerveau, que la face ne sera ni tuméfiée ni enflammée, ni d'un rouge brun, &c.

Si l'on prend le parti de retourner l'enfant, & de l'amener par les pieds, on observera de n'opérer que dans l'intervalle que laisseront les convulsions. Le forceps, quand l'enfant présente la tête convenablement, mérite la préférence sur tous les autres moyens propres à terminer

l'accouchement.

La Sage-femme ne sauroit se dispenser, dans tous ces cas, d'appeller un bon Accoucheur.

D. Est-il aussi nécessaire de terminer l'accouchement quand la femme éprouve de fré-quentes défaillances?

R. Lorsque cet état de foiblesse, de défaillance & de syncopes successives ne se dissipe pas au moyen des cordiaux; tels que le bon vin, les eaux spiritueuses, &c. il est à propos de terminer l'accouchement, quoique le danger ne foit pas aussi imminent que dans le cas de perte & de convultions.

D. Pourquoi prescrivez - vous de terminer l'accouchement, quand il existe chez la semme une hernie qu'on ne peut réduire?

R. Nous ne donnons ce conseil qu'à l'égard des femmes qui doivent se livrer à de grands efforts pour accoucher naturellement, & qui souffrent de la hernie ou descente dont il s'agit; parce que dans ces efforts de nouvelles parties peuvent s'échapper du bas-ventre, augmenter la descente, & s'y étrangler avec celles qui constituoient déjà cette tumeur (a).

D. En quoi la sortie du cordon ombi-lical vous paroît - elle assez dangereuse pour exiger qu'on termine l'accouchement?

R. Le cordon ne peut sortir de la matrice, & former une anse au-dessous de la tête de l'enfant, que la vie de ce dernier ne soit exposée; parce que cette anse de cordon sera pressée par la tête même contre un des points de la surface interne du bassin, & pourra l'être assez fortement, pour que le passage du sang se trouve intercepté dans les vaisseaux ombilicaux. Or, comme l'enfant ne peut vivre sans le secours de cette circulation, avant qu'il ne puisse respirer librement, il périra, fi l'on ne le dégage pas promptement du sein de sa mère.

<sup>(</sup>a) Nous avons vu périr une semme des suites d'une hernie ombilicale ancienne, qui a augmentée & qui s'est étranglée dans les esforts d'un accouchement très-long.

fur l'Art des Accouchemens. 342
D. Est-il nécessaire de terminer l'accouchement toutes les fois que le cordon ombilical sort de la matrice à l'instant de l'écoulement des eaux?

R. Non: il y a même des cas où ce feroit agir contre les règles de l'Art. On doit laisser agir la nature, lorsque la tête de l'enfant se plonge dans le bassin à l'instant où le cordon paroît, parce qu'une feule douleur peut alors la mettre dehors; que le cordon est à peine comprimé, & que les pulsations s'y entretiennent librement. Ce seroit encore agir contre les règles de l'Art, que d'opérer l'accouchement, quand le cordon est froid & sans pulsation, l'enfant étant déjà mort, & la présence du cordon ne pouvant mettre obstacle à sa sortie. Mais il faut se comporter différemment, quand les chofes sont disposées de manière que l'enfant ne peut fortir que lentement & difficilement; parce qu'il seroit victime de la grande compression que doit alors éprouver le cordon : c'est le cas où l'on doit opérer l'accouchement sans le moindre retard.



#### SECTION III.

Des vices de conformation, des accidens & maladies des parties de la femme, qui peuvent rendre l'accouchement difficile.

D. QUELS sont les vices de conformation des parties de la femme qui peuvent rendre

l'accouchement difficile?

R. Quelques-uns de ces vices de conformation affectent spécialement les parties molles; & les autres les parties dures ou

osseuses, c'est-à-dire le bassin.

Les premiers consistent dans la réunion contre nature des grandes lèvres; dans l'étroitesse du vagin ou son rétrecissement, à l'occasion de certaines cicatrices, ou de quelques duretés & callosités; dans l'obturation incomplète du col de la matrice même, &c.

Les vices de conformation du bassin ont été décrits au commencement de cet Ouvrage; on peut consulter ce que nous

en avons dit alors.

D. Quelles sont les maladies des parties de la semme qui peuvent s'opposer à l'accouchement?

R. Ce sont des tumeurs, & il y en a de toutes les espèces. Les unes affectent les parties extérieures, & les autres

fur l'Art des Accouchemens. 343

le vagin, le col de la matrice, ou des parties plus éloignées, tels que les ovaires (a).

Parmi ces tumeurs, les unes ne font formées que de fluides, & les autres ne font faites que par le déplacement de quelques parties; ces dernières constituent autant de hernies, & elles sont sormées par une anse d'intestin, par la vessie, ou par le relâchement & le renversement du vagin même. Les tumeurs par congestion de fluides passent généralement pour autant d'abcès.

Indépendamment de toutes ces tumeurs, qui cèdent facilement à la pression du doigt, sans disparoître cependant, il y en a de très dures, qu'on nomme squir-reuses; & de plus dures encore, qui appartiennent aux os, & qu'on appelle exostoses.

Une pierre volumineuse dans la vessie, peut rendre l'accouchement aussi dissicle que les tumeurs dont nous venons de faire mention; ainsi que la dureté squirreuse du col de la matrice.

D. Quelles sont les indications que présentent ces divers états contre nature, relativement à l'accouchement?

<sup>(</sup>a) Nous avons en à surmonter de grands obstacles dans l'accouchement, à l'occasion d'une tumeur à l'ovaire, dont une partie étoit ofseuse.

344 Principes

R. Ces diverses maladies exigent autants d'opérations, & sont du ressort d'un Chirurgien instruit dans l'Art des accouchemens.

Il faut séparer les grandes lèvres au moyen du bistouri, quand elles sont réunies; inciser la membrane hymen, ainsi que les cloisons membraneuses qui ferment incomplétement le vagin, ou qui s'opposent à sa dilatation, de même que les brides, les cicatrices & les callosités qui rétrecissent ce canal.

Il faut pareillement, en quelques cas, fendre le bord de l'orifice de la matrice, quand il est dur & calleux; ouvrir les tumeurs abcédées, extirper les tumeurs squirreuses susceptibles de l'être, &c.; réduire les hernies qui forment tumeurs dans le vagin; repousser ou extraire la pierre qui est contenue dans la vessie.

La mauvaise conformation du bassin exige souvent qu'on opère l'accouchement avec le forceps, & quelquesois au moyen des crochets; ensin, quand elle est extrême, il n'y a de ressource que dans l'opération césarienne; quoique bien des personnes présèrent encore aujourd'hui la section de la symphise du pubis dans ces cas malheureux.

D'après ce simple énoncé, les Sagesfemmes verront clairement que de pareilles opérations ne peuvent leur être confiées, Sur l'Art des Accouchemens. 345 & qu'il est de la plus grande importance qu'elles fassent venir promptement un Accoucheur, dès qu'elles rencontreront de ces sortes de cas.

#### SECTION IV.

De l'obliquité de la matrice.

D. Qu'ENTENDEZ - VOUS par obliquité de la matrice?

R. On appelle obliquité de la matrice toutes les positions dans lesquelles la longueur de ce viscère ne se trouve pas selon celle du corps de la semme; ou dans lesquelles le sond de la matrice ne répond pas au creux de l'estomac.

D. De combien de manières le fond de la matrice peut-il se détourner de la direction

que vous assignez?

R. Si l'on ne considère sa position que dans les derniers temps de la grossesse, l'on conviendra qu'il ne peut se détourner de cette direction que de trois manières; savoir, en se portant en devant, sur le côté droit, ou sur le côté gauche; quoique la plupart des Accoucheurs soutiennent qu'il se tourne également en arrière & s'appuie sur le devant de la colonne épinière, ce qui répugne autant à la raison qu'à l'observation.

D. Comment appelle-t-on chacune de ces

déviations du fond de la matrice?

R. On appelle obliquité antérieure, celle dans laquelle le fond de la matrice fe porte tellement en avant, que le ventre en a la forme d'une beface un peu pendante. ( Voyez la Planche XII ).

On nomme obliquité latérale droite, la déviation du fond de la matrice vers le côté droit du ventre; & obliquité latérale gauche, celle où il s'est déjetté sur le côté gauche. ( Voyez la Planche XIII ).

D. A quel terme de la grossesse l'obliquité

de la matrice commence-t-elle à paroître?

R. L'obliquité de la matrice commence de très-bonne heure chez certaines femmes, même dès les premiers mois de la groffesse; tandis que chez d'autres on ne s'en apperçoit qu'après le quatrième & le cinquième.

D. Quelle est la position la plus ordinaire de la matrice dans les premiers mois de la

groffeffe?

R. Cette position, pour l'ordinaire, est telle que le museau de tanche répond au milieu du bassin; & chez quelques femmes il paroît se porter un peu vers le pubis, ou vers le facrum.

Il y a des cas où la matrice fe renverse dans le bassin, & semble couchée selon sa longueur entre le pubis & le facrum; de forte que son fond s'appuie

fortement contre l'un de ces os, & le museau de tanche contre l'autre. On appelle ante-version, la position dans laquelle le fond de la matrice est appuyé contre la symphise du pubis, & le museau de tanche contre le facrum; & retroversion, celle où le fond de ce viscère porte sur le milieu ou sur le bas du sacrum, & le museau de tanche contre le pubis.

Ces deux positions contre nature peuvent avoir des suites fâcheuses. Elles ne manquent pas de donner lieu à la rétention des urines & à la constipation opiniâtre, dont les accidens sont très-multipliés. Elles exigent toute l'attention d'un Praticien instruit, & ne peuvent être confiées à la sagacité d'une Sage-semme. Ces sortes de déplacemens de matrice s'observent également chez les semmes qui ne sont pas grosses, & les accidens en sont quelquesois les mêmes.

D. Quelle est l'espèce d'obliquité de matrice la plus ordinaire dans les derniers temps de la grossesse.

R. L'obliquité latérale droite est la plus ordinaire de toutes ; mais c'est l'antérieure qui peut devenir la plus grande.

D. Quelles sont les causes de l'obliquité de la matrice?

R. On l'attribue généralement à l'attache du placenta ailleurs qu'au fond de la ma-

trice. Quelques Accoucheurs la font dépendre de l'habitude où sont presque toutes. les femmes de se coucher plutôt sur un côté que sur l'autre; de la mauvaise conformation de la matrice même, &c.; mais cette diversité d'opinions n'est nullement justifiée par l'observation. On trouve quelquesois le fond de la matrice très-incliné en devant, quoique la femme se couche habituellement sur le dos, & que le placenta soit attaché à la partie postérieure de ce viscère.

L'obliquité antérieure paroît dépendre de la direction du bassin, & de la saillie que forme la colonne sombaire & le haut du sacrum; mais cette obliquité ne peut devenir très - grande que chez les femmes qui ont déjà eu plusieurs ensans, parce que les enveloppes du bas-ventre résistent moins alors, & qu'elles ne peuvent soutenir la matrice comme elles le sont dans une première grossesse.

L'obliquité latérale dépend aussi de la faillie de la colonne lombaire, sur laquelle la matrice, qui s'arrondit en se développant, ne peut rester appuyée; & de la position que prennent les intestins grêles relativement à ce viscère, à mesure que son fond s'élève au-dessus du détroit supérieur.

L'obliquité latérale droite paroît avoir pour cause déterminante le rapport de

Sur l'Art des Accouchemens. 349 l'intestin restum avec la matrice, dans les trois ou quatre premiers mois de la grofsesse. Cet intestin, en se dilatant par l'accumulation des excrémens, sur-tout chez les semmes grosses sujettes à la constipation, &c. doit déjetter le fond de la matrice vers le côté droit.

D. Lorsque la matrice s'est inclinée dans un sens quelconque, ne peut-on pas la ra-

mener dans une autre direction?

- R. Quel que foit le degré d'obliquité du fond de la matrice, on peut la corriger, du moins en partie, même dans les cas qui paroissent les plus dissiciles. On diminue l'obliquité antérieure en faifant coucher la femme sur le dos, de manière que la poitrine & la tête soient un peu plus basses que les fesses, & en relevant, au moyen des mains, le ventre qui est alors pendant. On diminue l'obliquité latérale droite en tenant la femme couchée sur le côté gauche; & l'obliquité latérale gauche, en la faisant coucher sur le côté droit.
  - D. Quels sont les signes de l'obliquité de la matrice?
- R. On juge parfaitement de l'obliquité de la matrice, en observant la forme du ventre, en palpant cette partie, & en touchant le museau de tanche au moyen du doigt introduit dans le vagin.

Dans l'obliquité antérieure, l'orifice

regarde assez généralement le sacrum, & est plus ou moins élevé, selon que l'obliquité est plus ou moins grande. Dans l'obliquité latérale droite, l'orifice répond à l'échancrure ischiatique gauche; & dans l'obliquité latérale gauche, il est tourné vers l'échancrure ischiatique droite (a).

Nous observerons qu'on se tromperoit quelquesois, si l'on ne jugeoit de l'obliquité de la matrice que par la situation seule de l'orisice; parce que cet orisice peut être tourné du côté même où le

fond est incliné.

D. L'obliquité de la matrice peut-elle rendre

l'accouchement difficile?

R. L'obliquité de la matrice peut rendre l'accouchement difficile & laborieux; mais elle ne peut le faire aussi fouvent que bien des Accoucheurs se le sont persuadé. Il n'est aucun Praticien un peu consommé, qui n'ait vu nombre de sois l'accouchement se terminer naturellement & heureusement, malgré l'extrême obliquité de la matrice.

D. Dans quels cas l'obliquité de la matrice peut-elle rendre l'accouchement difficile?

R. Elle peut rendre l'accouchement difficile, quand elle est assez considérable pour faire prendre à l'enfant une position désavantageuse; car c'est à l'obliquité de

<sup>(</sup>a) Voyez les Planches XII & XIII.

sur l'Art des Accouchemens. 351 la matrice qu'il faut attribuer quelquesunes de ces mauvaises positions que nous décrirons ci-après. Elle peut encore influer fur le mécanisme de l'accouchement, quoique la tête de l'enfant se présente favorablement, si l'orifice situé en arrière & fort haut, ne se rapproche pas insensiblement du milieu du bassin, & ne revient pas en devant, à mesure que les douleurs se multiplient. La tête de l'enfant poussée par les efforts de la femme, s'engage alors jusqu'au fond du baffin, en poussant au-devant d'elle la partie antérieure & inférieure de la matrice qui la recouvre, & vient ainfi recouverte se présenter à l'entrée du vagin; tandis que l'orifice reste en arrière & si haut, qu'on

D. Que doit-on faire dans tous ces cas?

ne peut y atteindre que difficilement.

R. Il suffira, dans quelques - uns, de corriger, ou seulement de diminuer l'obliquité de la matrice; en d'autres cas, il faudra changer la position de la tête de l'ensant, si elle ne revient pas d'elle-même à sa bonne situation, comme on le verra ci-après. Quand la tête se sera engagée en poussant au-devant d'elle la partie antérieure & inférieure de la matrice, il sera nécessaire de corriger non seulement l'obliquité de ce viscère, mais encore de ramener son orisice en devant, en allant

Principes
le chercher fort en arrière au moyen du


doigt introduit dans le vagin.


D. Peut - on ramener ainsi l'orisice de la

matrice sans inconvéniens?

R. Oui : nous assurons que cela se faitt aisément, & sans le moindre désagréments pour la femme, quoique bien des Praticiens foutiennent que cette conduite foits dangereuse. On n'attend pas que la tête: se soit engagée jusqu'à l'entrée du vagin, pour exécuter ce que nous recommandons ;; si elle s'étoit engagée à ce point, il faudroit la repousser un peu, ne fût-ce que: de la hauteur d'un demi-pouce, pour ra-mener plus facilement encore l'orifice de la matrice au-dessous d'elle. Le doigt étant : parvenu dans cet orifice au point d'en pouvoir accrocher en quelque forte le bord antérieur, on ne s'efforcera de le ramener en devant que dans l'intervalle des douleurs; & l'ayant ramené convenablement, on le retiendra au moyen du doigt, jusqu'à ce qu'il soit bien dilaté, & que la poche des eaux, ou la tête de l'enfant commence à s'y engager.









# EXPLICATION

# DE LA PLANCHE XII.

Cette Planche représente un bassin coupé verticalement, avec la matrice inclinée sur le devant.

AAA. Les vertèbres lombaires, le facrum & le coccix.

. B. Le pubis.

C. La matrice.

D. Le fond de la matrice.

E. L'orifice de la matrice.

F. Les ligamens larges & l'ovaire; la matrice étant vue par la partie latérale.

G. Le vagin, ouvert selon sa longueur sur le côté droit.

### PLANC'HE XIII.

Cette Planche présente l'idée des obliquités latérales de la matrice.

Fig. I. La matrice inclinée fur le côté droit.

Fig. II. La matrice inclinée fur le côté gauche.

AA. Le fond de la matrice.

BB. L'orifice de la matrice.

CC. Le vagin ouvert dans sa partie antérieure.

DDDD. Le bassin.

## SECTION V.

De la rupture de la matrice, considérée comme cause d'accouchement difficile.

D. EN quels endroits la matrice peut-elle

se déchirer?

R. La matrice peut se déchirer indistinctement dans tous les points de son érendue; on l'a trouvée déchirée dans son fond, dans sa partie antérieure, dans sa partie postérieure, & sur l'un & l'autre côté; tantôt plus près du fond, & tantôt plus près du col.

Quelquefois la déchirure est peu considérable; d'autres fois elle est très-grande. Elle peut se faire selon la longueur de la matrice, en travers, & même en forme

de croissant.

Le vagin peut se déchirer également dans le lieu où il s'unit au col de la matrice, & cette déchirure peut être suivie des mêmes accidens que celle de la matrice.

D. Quelles sont en général les causes de

la déchirure de la matrice?

R. Cette rupture, le plus souvent, est l'effet des violentes contractions de la matrice même, & des efforts inconsidérés qu'exerce la femme dans l'espoir de hâter

fur l'Art des Accouchemens. 355 l'accouchement; mais pour qu'elle se fasse, si la matrice est saine, il faut que l'enfant trouve de grands obstacles à sa sortie par la voie naturelle.

Cette rupture peut être également l'effet d'une percussion extérieure, comme d'un coup porté sur le ventre, d'une chûte, ou d'une forte pression; ainsi que des mauvaises manœuvres de l'Accoucheur.

D. Y a-t-il des signes qui puissent faire connoître que la matrice est menacée de se

déchirer?

R. Il n'y en a pas d'assez certains pour qu'on soit en droit de prononcer que cette déchirure se fera, si l'on ne prend le parti

d'opérer l'accouchement.

On fait feulement, 1°. que la matrice est menacée de se rompre, quand l'enfant ne peut sortir par la voie naturelle, quelle que soit la cause qui s'y oppose; 2°. que cette rupture est d'autant plus à craindre que la matrice est plus mince en quelques endroits, qu'elle se contracte plus puissamment, & que la semme, de son côté, se livre à de plus grands essorts; ensin, que l'ensant est alors plus robuste & exerce de plus grands mouvemens.

Le plus fouvent la rupture de la matrice se fait brusquement, & à l'instant où l'Accoucheur s'y attend le moins: mais c'est toujours dans le temps d'une

forte douleur.

D. Quels sont les signes qui annoncent

que la matrice s'est déchirée?

R. La femme ressent à l'instant de cette rupture, & dans le lieu où elle fe fait, une douleur des plus aignes; elle annonce que quelque chose se déchire, & quelquefois le bruit de ce déchirement frappe l'oreille des affistans. Si l'enfant passe aussi-tôt dans le bas-ventre, à travers cette déchirure, il s'y annonce par des mouvemens extraordinaires, s'il est encores vivant, & on le distingue aisément en touchant l'extérieur. Le ventre se tend bientôt, & devient douloureux de toutess parts; les douleurs de l'accouchement difcontinuent, & celles qu'éprouve la femme: n'y ressemblent nullement. On ne distingue: plus le globe sormé par la matrice en palpant le ventre; & l'on observe d'ailleurs que le col de ce viscère se referme,, & que l'enfant ne s'y présente plus, &c..

La rupture de la matrice ne s'annonce cependant aussi clairement, qu'autant que l'enfant passe promptement dans le basventre; quand il ne peut y passer, la rupture, quoique existante, ne se reconnoît pas aussi aisément; & on ne peut que la présumer dans le premier moment.

D. Quels sont les accidens de la rupture de la matrice?

R. Les suites de la déchirure de la ma-

fur l'Art des Accouchemens. 357 rice sont toujours des plus alarmantes, 26 la semme y succombe pour l'ordinaire en très-peu de temps. Une doueur aigue se fait sentir dans le bas-ventre, comme nous l'avons déjà dit; des syncopes fréquentes, des vomissemens presque continuels, une anxiété des plus grandes, une violente agitation, le hoquet, des convulsions, des sueurs froides, ne tardent pas à se manisester, dès que l'enfant & le délivre ont passé, de la matrice dans la cavité du ventre.

Le fang s'épanche en plus ou moins grande quantité dans cette même cavité; une anse de boyaux s'engage quelquesois dans celle de la matrice, & peut y être étranglée, comme il arrive dans la hernie

ordinaire.

D. Quels sont les secours qu'on doit ap-

porter contre tant de maux?

R. Des accidens aussi formidables exigent toute la sagacité & la présence d'esprit du Praticien le plus consommé; & malgré son savoir & son activité, il a presque toujours le désagrément de ne pouvoir conserver ni la mère ni l'ensant: même en supposant qu'il soit en quelque sorte témoin de la rupture de la matrice, & qu'il agisse tout de suite en conséquence.

Malgré le danger imminent, & presque inévitable, qui accompagne cette triste circonstance, on ne doit cependant pas

abandonner la mère & l'enfant à leur fatale destinée. On opérera l'accouchement par la voie naturelle, si la chose est encore possible; & l'on fera l'opération cé! sarienne, si l'enfant a passé dans le ventre. On a conservé la vie à quelques semmes, en se conduisant ainsi, dès qu'on a eu reconnu la rupture de la matrice.

S'il est inutile de prévenir les Sages-femmes que ces fortes de cas ne sont point de leur reisort, on ne sauroit trop leur recommander d'appeller un Accoucheur, quand elles auront lieu de craindre la rupture de la matrice, ou qu'elle la croiront existante.

# SECTION VI.

Des conceptions, ou grossesses extra-utérines:

- D. Qu'entendez-vous par grossesses extra-utérines?
- R. On appelle cxtra-utérines, les grofsesse se dans lesquelles l'enfant & ses dépendances se dévelop-pent dans l'ovaire, dans l'une ou l'autre. des trompes, ou bien dans la cavité du bas-ventre même, au lieu de la matrice.
- D. Quels sont les signes qui caractérisent ces sortes de grossesses?

sur l'Art des Accouchemens. 359

R. Les signes rationnels sont les mêmes que dans la grossesse ordinaire. Les mouvemens de l'enfant se manifestent à la même époque; mais la semme observe, si elle y donne un peu d'attention, que ces mouvemens ne se sont pas sentir exactement dans le même lieu, que ceux qu'elle a pu distinguer dans ses grossesses

précédentes.

Ces signes ne dénotent pas assez clairement une grossesse extra-utérine, pour qu'on ne puisse s'y tromper. Ce n'est qu'en touchant la femme avec soin, dans un terme avancé, qu'on peut en juger; encore y trouve-t-on fouvent beaucoup d'obscurité. Si la matrice se développe dans une grossesse de cette espèce, elle n'acquiert jamais le même volume que dans une grossesse ordinaire; elle reste toujours trèspetite, son col change à peine de sorme, & l'orifice en est si serré, qu'on ne peut y porter le doigt avant les derniers momens. Quand cet orifice est assez ouvert pour permettre au doigt de pénétrer dans la matrice, il est aisé de s'assurer si l'enfant y est renfermé. Lorsqu'il ne s'y rencontre pas, il doit être ailleurs; mais il paroît impossible de réconnoître si c'est

Ovaires, ou dans le bas-ventre même.
D. A quelle partie le placenta s'attache-t-il,
quand l'enfant est dans la cavité du ventre même?

dans l'une des trompes, dans l'un des

R. Quelquefois le placenta s'attache sur la matrice même, d'autres sois sur les intestins ou sur le mésentère.

D. Ces grossesses parcourent-elles les mêmes

temps que les autres?

R. Assez souvent, dans ces grossesses extraordinaires, l'enfant meurt avant les terme de sa maturité; mais quelquesois il ses développe comme dans une grossesse dinaire, & les douleurs de l'accouchements ne se sont sentir que vers la fin du neuvième mois.

D. Comment l'accouchement peut-il se faire:

en pareils cas?

R. L'accouchement ne peut se faire alorss par les voies naturelles; & personne n'ai encore osé tenter de conserver la mère: & l'enfant au moyen de l'opération cérarienne. Il est vrai que cette opération, toujours dangereuse dans le cas de grosfesse ordinaire, doit l'être bien plus encore dans celui de grossesse extra-utérine. Elle paroîtroit cependant présérable à l'espèce d'abandon auquel on a toujours livré: la mère & l'enfant. Si elle présente de grands dangers, la semme est menacée de bien plus grands encore, lorsqu'on l'abandonne à sa malheureuse destinée, & l'entant périt inévitablement.

D. Quelle est donc la suite des grossesses

extra-utérines?

R. Quelquefois, mais bien rarement,

fur l'Art des Accouchemens. 361 l'enfant, après sa mort, se dessèche, se durcit, se racornit en quelque sorte, & se conserve ainsi pendant nombre d'années, sans nuire essentiellement à la vie de la femme (a).

Le plus fouvent la mort de la femme fuit de près celle de l'enfant. D'autres fois celui-ci se putrésie; & ses débris sont expulsés ou extraits par la voie des abcès, qui s'ouvrent à la surface abdominale; de sorte que quelques semmes ont encore le bonheur d'échapper à la mort, si on leur donne les secours convenables.

Ces cas ne doivent pas être confiés aux

soins des Sages-femmes.



<sup>(</sup>a) On a publié récemment un nouveau fait de cette cspèce. Une semme morte à Vitri-le-François en 1785, & dans une extrême vieillesse, portoit dans son sein un enfant desséché, depuis 1753.

### ARTICLE II.

Des préceptes généraux relatifs à la manière d'opérer l'accouchement contre nature, ou difficile, & des devoirs que la religion prescrit dans quelques-uns de ces cas.

### SECTION PREMIÈRE.

Des préceptes relatifs à la manière d'opéret dans les accouchemens contre nature.

D. QUELLES sont les précautions qu'il faut observer dans la pratique des accouchemens contre nature?

R. Parmi ces précautions, les unes regardent la fituation qu'on doit donner à la femme; les autres le temps d'opérer, & la manière de le faire.

D. Quelle est la situation qu'on doit donner

à la femme?

R. La femme sera couchée sur le dos, & située de manière que les sesses débordent un peu l'extrémité du lit. Les jambes & les cuisses seront à demi-pliées, les pieds appuyés sur deux chaises, les genoux sixés & tenus médiocrement écartés, par des aides disposés convenablement. La tête & les épaules seront peu élevées; & d'autres aides sixeront encore la semme;

fur l'Art des Accouchemens. 363 de ce côté, si cela est nécessaire; pour l'empêcher de se retirer vers le haut du lit, quand on introduira la main dans la matrice.

On la couvrira d'un drap & d'une couverture, si c'est en hiver; soit pour la désendre du froid, soit pour ne pas l'exposer nue aux yeux des assistans, & de

l'opérateur même.

Le lit dont il s'agit doit être étroit, folide, & affez élevé pour que l'Accoucheur ne foit pas courbé, ni trop gêné dans les attitudes qu'il fera forcé de prendre dans le cours de fon opération. Une couchette ordinaire vaut mieux, en pareil cas, qu'un lit de fangle; & à fon défaut, on placera la femme fur le bord, ou fur l'extrémité de fon lit garni & disposé convenablement.

Si l'on se servoit d'un lit de sangle, il ne faudroit pas manquer d'en appuyer l'extrémité sur deux tabourets, ou deux

chaises de hauteur convenable.

On placera un coussin ou un carreau solide entre les matelas, à l'extrémité de ce lit; pour qu'il creuse moins, & que les sesses de la semme ne s'y ensoncent pas.

On le disposera d'ailleurs dans la chambre, de manière à ce qu'on puisse aller &

venir librement autour.

Telle est l'espèce de lit qu'on doit pré-

364. Principes

parer dans le cas d'un accouchement difficile & contre nature; & la situation que doit garder la semme même pendant l'accouchement. S'il est des circonstances qui exigent moins d'appareil, & dans lesquelles on puisse la secourir dans son lit ordinaire, nous les indiquerons à mesure que nous avancerons.

D. Quel est le moment le plus favorable,

pour opérer l'accouchement contre nature?

R. Le moment le plus favorable est celui de l'extrême dilatation de l'orifice de la matrice, & de l'écoulement des eaux de l'amnios; quand l'accouchement ne devient contre nature que par la mauvaise situation de l'enfant.

Si l'on opéroit avant ce moment, on éprouveroit plus de difficulté à pénétrer dans la matrice, & comme il faudroit employer plus de force pour les furmonter, la mère ainfi que l'enfant, feroient exposés

à quelques inconvéniens.

Il faut opérer dans ce moment d'élection, parce que les obstacles & le danger s'augmentent en raison de ce qu'on s'en éloigne davantage. La matrice, après l'écoulement des eaux, se contracte plus fortement, se resserre sur l'enfant, & l'embrasse si étroitement, qu'il est extrêmement dissicile, en quelques cas, d'y introduire là main, de retourner l'enfant, & de l'en dégager.

sur l'Art des Accouchemens. 365 D. Faut-il toujours attendre que la poche des eaux s'ouvre d'elle-même, pour opérer l'accouchement qui est contre nature?

R. Non; parce qu'il y a des cas où les membranes sont si dures, qu'elles ne peuvent se déchirer d'elles-mêmes, ou qu'elles ne le feroient que très-tard; on attendra seulement que l'orifice de la matrice soit bien dilaté, & que son bord soit trèsfouple. Alors on placera la femme convenablement, & l'on déchirera la poche des eaux, en avançant la main dans le vagin.

D. Peut - on opèrer l'accouchement dans tous les cas, à l'instant où la poche des eaux s'ouvre d'elle-même?

R. Non; parce que cette poche se crève quelquesois avant que le col de la matrice ne soit esfacé & dilaté convenablement; & que d'autres fois, au moment où elle le fait, il n'existe encore aucun des accidens qui doivent nous engager à opérer.

Quand la poche des eaux s'ouvre de trop bonne heure, il faut attendre que le col de la matrice soit affez souple pour s'ouvrir aisément, & n'opérer que dans

ce moment.

D. L'état de la femme, en général, n'exiget-il pas quelques attentions particulières avant qu'on entreprenne de l'accoucher?

R. Il est des cas où l'on ne doit opérer

l'accouchement qu'après y avoir préparé la femme par des remèdes généraux, tels que la faignée, le bain, les fomenta-

tions, &cc.

Lorsque le pouls est élevé, fréquent & dur, le ventre tendu & douloureux; lorsque les parties sont tumésiées & sensibles, il convient de différer l'accouchement jusqu'à ce qu'on ait satisfait à ce que demande l'ensemble de ces symptomes, par une saignée du bras, par l'usage du bain & les somentations émollientes, tant sur le ventre que sur les parties naturelles.

D. Quelles sont les précautions qu'il convient d'observer relativement à la manière

d'opérer, en général?

R. On doit, en général, distinguer trois temps dans la pratique des accouchemens contre nature; 1°. celui où l'on introduit la main dans la matrice; 2°. celui où l'on retourne l'enfant; 3°. & celui où l'on en fait l'extraction: ces trois temps exigent des précautions particulières.

D. Quelles sont les précautions qui sont relatives à l'introduction de la main dans la

matrice?

R. 1°. On trempera la main dans un mucilage quelconque (a), ou bien on

<sup>(</sup>a) Une forte décoction de racine de guimauve, ou de graine de lin, de manière que l'eau en foit comme glaireuse.

sur l'Art des Accouchemens. 367 l'enduira de beurre frais, de pommade, ou d'huile, pour qu'elle pénètre plus facilement, & avec moins de douleurs pour la femme; 2°. on introduira les doigts successivement dans le vagin, en dilatant graduellement son orifice, pour le préparer à recevoir toute la main, qu'on y fera pénétrer lentement; 3°. on choisira le moment où la douleur de l'accouchement se fait sentir, présérablement à celui du calme qu'éprouve la femme après cette douleur, pour introduire la main dans le vagin; 4°. l'on n'agira que dans ce moment de calme, au contraire, quand il sera question d'introduire la main dans la matrice; parce que ce viscère est alors plus souple & moins contracté sur l'enfant, parce qu'il offre-de toutes parts moins d'obstacles, que la main pénètre en excitant moins de douleurs, & en expofant la femme à moins d'inconvéniens. Quelle que soit la hauteur à laquelle la main sera déjà introduite, elle restera en repos pendant la durée de chaque douleur que la femme éprouvera, ou chaque contraction de la matrice; & l'on ne s'efforcera de la porter plus loin, que quand cette douleur sera passée. 5°. On avancera les doigts successivement dans l'ori-fice de la matrice, si on ne le trouve pas très-ouvert, asin de le dilater graduellement, comme on l'a fait à l'égard de

368 Principes

l'entrée du vagin; & on le dilatera plutôt en écartant ces mêmes doigts, qu'en pouffant de toute la main, pour ne pas dé-chirer le vagin dans sa partie supérieure, près le col de la matrice même. 6°. La main doit être appliquée à la surface de l'enfant, les doigts rapprochés & légérement recourbés de leurs extrémités, de forte que leur face externe regarde la furface interne de la matrice : la main ne doit faire que de très-petits mouvemens dans le trajet qu'elle parcourra, pour qu'elle se fatigue moins, que la matrice en soit moins irritée, & que la femme en ressente moins irritée, & que la femine en ressente moins de douleurs. 7°. Pen-dant qu'on introduira cette main, il est utile quelquesois, de ténir l'autre exté-rieurement sur le sond de la matrice, pour sixer en quelque sorte ce viscère, & l'empêcher de céder à l'impuisson de celle qu'on porte en dedans. 8°. L'Ac-coucheur doit se découvrir les bras jusqu'au-dessus des coudes, toutes les sois qu'il est obligé de porter la main profondément dans la matrice; & il doit avoir de plus la précaution de bien rogner ses ongles. S'il entrevoit, ou s'il rencontre quelques difficultés dans l'opération, il doit se faire un devoir de ne l'annoncer à la femme, ni paraucun geste de tête, ni par aucun propos alarmant; parce que même la plus courageuse s'en effraie aisement;

Sur l'Art des Accouchemens. 369 & qu'il pourroit en réfulter de grands inconvéniens. Il évitera également d'exposer aux yeux de la semme les linges ensanglantés qui lui auront servi à essuyer les mains. En un mot, il doit opérer de sang-froid & avec le moindre appareil possible.

D. Est-il indifférent, dans tous les cas, d'introduire la main droite ou la main gauche

dans la matrice?

R. Non; & cette observation est même fi importante en bien des cas, qu'on ne peut se promettre de facilité & de succès, qu'autant qu'on opérera d'une main plutôt

que de l'autre.

Le choix de celle qu'il convient d'introduire, doit être déterminé par la fituation même de l'enfant dans la matrice. Nous aurons le foin d'indiquer les ças qui exigent qu'on introduife la main droite, & ceux qui requerront la main gauche.

D. Que doit-on observer relativement à la manière de retourner l'enfant dans le sein

de sa mère, & de l'en extraire?

R. On observera, 1°. de ne dégager les pieds que dans l'intervalle des douleurs, ou des contractions de la matrice; & de ne tirer sur ces extrémités que dans ces mêmes instans, jusqu'à ce que les sesses trouvent engagées dans le détroit supérieur. 2°, Quand l'enfant sera descendu

Qγ

370 Principes

à ce point, on ne s'efforcera de l'extraire, qu'autant que la douleur aura lieu, & que la femme exercera quelques efforts en poussant. Nous tracerons ailleurs des règles plus précises, relativement aux diverses circonstances qui peuvent se présenter dans la pratique.

#### SECTION II.

Des devoirs que prescrit la religion.

D. QUELS sont les devoirs que la religion nous impose, soit relativement à la semme, soit relativement à l'enfant, dans tous

les cas d'accouchemens difficiles?

R. La religion nous prescrit, 1°. de faire connoître à la semme le danger qui la menace, quand sa situation est assez sâcheuse pour craindre de la voir expirer dans l'accouchement même, ou immédiatement après; asin qu'elle se fasse au plutôt administrer les sacremens. 2°. Relativement à l'enfant, la religion nous impose le devoir de l'ondoyer toutes les sois qu'il court le risque de mourir dans l'accouchement: pour le faire, il saut verser l'eau immédiatement sur une partie de son corps.

Quand on ne peut que toucher la tête: dans le fond du vagin, on y portera l'eau fur l'Art des Accouchemens. 371 au moyen d'une seringue, dont on dirigera la canulle à la faveur d'un doigt, jusques dans la matrice.

Dans ce cas, l'on ondoyera l'enfant de nouveau, quand il sera sorti, s'il maniseste encore quelque signe de vie, en ajoutant à la formule ordinaire ces mots, si tu n'es pas baptisé.

Quand l'enfant présente une main au dehors, c'est sur cette main qu'on doit verser l'eau; & dans tous les autres cas, sur l'un des pieds, ou sur les deux, aussi-tôt qu'on les a dégagés, & qu'ils sont exposés à la vue. Lorsqu'on a ondoyé l'enfant en versant l'eau sur une main ou sur un pied, il saut l'ondoyer de nouveau après sa naissance, s'il paroît encore en danger de mort; & verser l'eau sur la tête; en ajoutant à la formule ordinaire, si tu n'es pas baptisé, enfant je te baptise, &c.

Quel que soit le terme de la grossesse où se fait l'accouchement; quelle que soit la forme de l'enfant, pourvu qu'il participe en quelque chose de l'espèce humaine, on doit l'ondoyer. On aura la même attention, quoique l'enfant paroisse mort au moment de sa sortie; & le seul cas où l'on doive se dispenser de l'ondoyer, est celui où la pourriture ne laisse aucun doute sur sa mort,

001

Lorsque l'enfant est monstrueux, de même que dans le cas où il ne donne aucun signe de vie, on ajoutera à la formule ordinaire du baptême ces mots: se tu es capable du baptême, je te baptise, &c.

Toutes personnes peuvent baptiser dans un cas de nécessité. Ce sera la Sage-semme qui ondoyera l'enfant, quand il saudra le faire avant ou pendant l'accouchement; ce sera présérablement un homme, excepté le père de l'ensant, quand on ne le sera qu'après l'accouchement.

On emploie, pour le baptême, de l'eau bénite, de l'eau de puits, de pluie, de fontaine, de rivière; en un mot, de l'eau

commune.

En répandant l'eau en forme de croix sur la tête, ou sur toute autre partie, quand on ne peut le faire sur celle-ci, on doit prononcer distinctement les paroles suivantes. « Enfant, je te baptise au nom du Père, du Fils & du Saint-Esprit ».

Lorsqu'on porte à l'église un ensant qui a été ondoyé, on doit en prévenir le Prêtre

avant la cérémonie du baptême,



# CHAPITRE II.

Des accouchemens où l'enfant présente les pieds, les genoux ou les fesses; & de la manière d'opérer ces accouchemens.

### ARTICLE PREMIER.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les pieds.

# SECTION PREMIÈRE.

De la conduite qu'on doit tenir en général, lorsque les pieds se présentent.

D. COMMENT doit on aider la femme dans l'accouchement où l'enfant présente les pieds?

R. On doit laisser agir la nature, toutes les fois que la femme n'éprouve aucun des accidens dont il est fait mention cidevant; on observera seulement dans le premier instant quelle est la position des pieds, & la direction selon laquelle ilss'engagent, On les éloignera des points de

Principes
la surface interne du bassin, contre lesquels ils pourroient s'appuyer & s'arrêter dans la suite, afin qu'ils parviennent plus aisément au dehors. Le doigt seul sussit pour diriger les pieds aussi favorablement.

S'ils ne s'avançoient que difficilement, malgré les efforts de la femme, on les accrocheroit de deux doigts introduits dans le vagin, & on les entraîneroit successivement.

A mesure que l'ensant se dégagera, on observera de tourner sa poitrine vers l'une des symphises sacro-iliaques, & le dos sous l'une des cavités cotyloïdes; s'il ne se présente pas naturellement de cette manière. Si l'on juge à propos d'aider la semme dans ce moment, en tirant sur les pieds, il ne saudra se permettre que de légers essorts, & ne les saire seulement, que dans le temps des contractions de la matrice, c'est-à-dire, dans le moment de la douleur & des essorts que la semme même exercera de son côté.

Quand les choses se passent tranquillement, & que l'enfant avance sans peine, l'Accoucheur doit se borner à soutenir convenablement le corps, à mesure qu'il se dégagera.

On abaissera les bras de l'enfant, s'ils ne se dégagent pas d'eux-mêmes, aussitôt que les épaules seront au dehors; fur l'Art des Accouchemens. 375 pour que la sørtie de la tête se fasse plus aisément.

On continuera de soutenir le corps de l'ensant, en le relevant même vers le ventre de la semme, asin que par son poids & sa position sur le lit, il ne gêne pas les mouvemens que la tête doit exécuter pour sortir le plus aisément possible.

Si les secours de l'Art doivent se borner à seconder aussi foiblement les efforts de la nature, quand la semme n'éprouve pas d'accident, & ne court aucun danger, non plus que son enfant, il saut agir différenment en quelques circonstances, & opérer l'accouchement.

D. Dans quelles circonstances doit - on opérer l'accouchement; & comment faut - il

l'opérer?

R. On opérera l'accouchement toutes les fois qu'il surviendra une perte considérable, ou qu'il se manisestera d'autres accidens également sâcheux. L'on n'attendra point alors que les pieds de l'entant soient descendus à la portée des doigts, on ira les chercher dans la matrice, en avançant, s'il le faut, toute la main dans le vagin. Si l'orifice de la matrice n'est pas suffisamment ouvert dans le moment où l'on est forcé d'opérer l'accouchement, on le dilatera avec ménagement, comme on l'a recommandé ci devant; & si les membranes ne sont pas déchirées,

on les déchirera de même, avant de saissir

les pieds.

On dégagera les deux pieds, s'il se peut en même temps, & dès qu'ils seront au dehors, on les enveloppera d'un linge sec & doux; afin qu'ils échappent moins des mains, qu'on ne soit pas obligé de les serrer étroitement pour les tenir & tirer dessus, de manière à faire descendre l'enfant.

D. Est-il toujours bien facile d'entraîner les deux pieds, dans le cas même où ils se

présentent naturellement?

R. On les dégage aisément, si l'on s'en occupe avant que les fesses de l'enfant ne soient descendues dans le bassin; mais on yrencontre quelques ois de grandes dissicultés, quand la partie inférieure du tronc, les cuisses & les jambes ont été poussées comme en bloc dans la cavité dont il s'agit, & s'y trouvent en quelque manière enclavées. Pour dégager les pieds, lorsque toutes ces parties se présentent ainsi en même temps, il faut commencer par repousser les fesses au-dessus du détroit supérieur.

D. Est-il nécessaire de dégager les deux pieds de l'enfant, lorsqu'ils se trouvent à

l'orifice de la matrice?

R. Non: il est seulement plus avantageux de dégager l'un & l'autre, que de n'en amener qu'un seul; mais il y a fur l'Art des Accouchemens. 377 beaucoup de cas où l'on peut extraire l'enfant en ne tirant d'abord que sur l'un des pieds.

D. A quels signes reconnoîtra-t-on qu'on ne peut se dispenser de dégager le second

pied?

R. Il est important de dégager le second pied, toutes les sois qu'on ne peut faire descendre la partie inférieure du tronc, en tirant avec ménagement & dans une direction convenable, sur celui qu'on a dégagé. En se permettant de tirer sur ce pied, autant qu'il le faudroit pour vaincre l'obstacle qui empêche l'ensant de s'engager, on s'exposeroit à luxer ou à fracturer la jambe ou la cuisse. Les difficultés qu'on se proposeroit de surmonter ainsi, sont d'ailleurs quelquesois au-dessus des efforts que peut absolument supporter la jambe & la cuisse de l'ensant, & on pourroit arracher cette extrémité.

D. Que devient l'autre extrémité inférieure de l'enfant, quand on ne tire que sur l'une?

R. L'extrémité inférieure qui reste en arrière se développe &z s'alonge sur le devant du ventre &z de la poitrine, pour ne se dégager qu'à l'instant où les aisselles paroissent à la vulve. On la laissera donc venir ainsi toutes les sois qu'on sera descendre l'ensant aisément, en ne tirant que sur l'un des pieds; on aura l'attention seulement d'accrocher la hanche, du côté

Principes de la seconde extrémité, aussi tôt qu'on le pourra, au moyen du doigt indicateur légérement recourbé sur le pli de l'aîne, pour aider à la sortie des sesses.

D. Lorsqu'on dégage les deux pieds, peuton être certain qu'ils appartiennent au même

enfant?

R. Il y a des cas où il convient de s'en affurer avant de les engager profondément; parce qu'ils pourroient appartenir à deux enfans, & qu'on a pu prendre alors le pied droit de l'un & le pied gauche de l'autre. Pour s'affurer que les deux pieds appartiennent au même enfant, il faut avancer le doigt entre les jambes & les cuisses, jusqu'aux fesses.

## SECTION II.

De la manière d'extraire l'enfant, dans la position des pieds où les talons regardent le côté gauche du bassin. Voyez Planche XIV (a).

D. COMMENT doit-on opérer l'extraction de l'enfant, dans ce cas?

R. Lorsque les pieds se présentent de

<sup>(</sup>a) Cette Planche fait connoître l'attitude de l'enfant, dans le cas où il présente les pieds le plus ordinairement.





cette manière, on les dégagera, en les portant obliquement en en bas, & l'on continuera de tirer dessus, jusqu'à ce que les genoux soient au dehors. Alors on saistra les cuisses des deux mains garnies d'un linge sec, & l'on tirera selon la même direction, pour dégager les sesses; de manière que le dos de l'ensant soit placé sous la cavité cotyloïde gauche, & que la poitrine regarde la symphise sacro-iliaque droite; afin que les épaules se présentent dans la suite avantageusement au détroit supérieur.

A mesure que les sesses de l'enfant s'avanceront, on rapprochera les mains du haut des cuisses & des hanches pour tirer de plus près, & ne pas satiguer l'articulation des jambes & des pieds. Si l'on éprouve quelques dissicultés à faire descendre la poitrine & les épaules, on tirera en relevant un peu les cuisses de l'enfant vers l'aîne droite de la mère, puis en les reportant de ce point vers le dessous de la cuisse gauche; & alternativement de cette manière, jusqu'à ce que les aisselles

paroissent à la vulve.

Lorsque les fesses seront dégagées, on examinera si le cordon ne tiraille pas l'ombilic au point de le déchirer; & ces recherches, quelquesois importantes, se sont au moyen d'un doigt, quand l'ensant n'est pas assez dégagé pour qu'on puisse

380 Principes

voir ce qui se passe à cet égard. Si l'ombilic est tiraillé, il convient alors de faire descendre une anse de cordon, pour le relâcher & en prévenir la déchirure. On aura la même attention, quand le cordon se trouvera passé entre les cuisses de l'enfant, & montera le long du dos.

D. Doit-on dégager les bras de l'enfant dès que les épaules paroissent, ou vaut-il mieux achever de l'extraire avec les bras placés sur

les côtés du col & de la tête?

R. Les Praticiens conviennent affez unanimement de l'utilité, & même de la nécessité de dégager les bras de l'ensant,
lorsque les épaules paroissent; mais il
en est encore qui regardent cette précaution non-seulement comme inutile,
mais même dangereuse; en ce que, disentils, les bras placés sur le côté de la tête
s'opposent au resserrement de l'orisse de
la matrice sur le col de l'ensant, & empêchent qu'il ne soit étranglé au passage.
Cette crainte est on ne peut moins sondée,
& ne sauroit improuver le précepte de dégager les bras de l'ensant: souvent il est de
la plus grande importance de le faire.

D. Comment doit-on dégager les bras de

l'enfant?

R. On abaissera d'abord celui qui sera le moins serré entre la tête de l'ensant & les parois du bassin; & presque toujours c'est le bras qui répond au sacrum.

sur l'Art des Accouchemens. 381

Pour dégager ce bras, on relevera le corps de l'enfant vers l'aîne droite de la femme, en le foutenant de la main gauche garnie de linge, mais fans tirer dessus. On saisira l'épaule, qui paroît au bas de la vulve, au moyen du pouce & de l'index de la main droite, & on la fera descendre un peu plus. Après cela, on infinuera l'index seul le long du bras jusques sur le pli du coude, & on l'abaissera, en le ramenant sur la poitrine de l'enfant.

Ce premier bras étant forti, on inclinera le tronc en en bas, & vers la cuisse gauche de la femme; où on le soutiendra de la main droite, pendant qu'on dégagera le second bras, comme le précédent.

L'on ne s'efforcera jamais de faire descendre les bras le long du dos de l'enfant, quoique quelquesois l'un d'eux, placé déjà derrière le col, paroisse plus disposé à se dégager de cette manière, qu'à revenir sur le devant de la poitrine; parce qu'on exposeroit ce bras à se casser, ou à se luxer.

D. Doit-on procéder à l'extraction de la tête, après avoir dégagé les bras de l'enfant,

& comment doit-on y procéder?

R. On doit extraire la tête de l'enfant, après avoir dégagé les bras, toutes les fois que les forces de la nature ne seront pas suffisantes pour l'expulser promptement. L'extraction de la tête est facile

pour l'ordinaire, parce que le bassin de la semme est bien fait; & il ne saut, pour l'opérer, que de foibles efforts de la part: de l'Accoucheur. Il examinera d'abord, au moyen d'un doigt porté dans le vagin, qu'elle est la situation & la hauteur de la. tête; car on ne doit essayer de l'extraire, qu'autant qu'elle est placée favorablement, & que la face répond à la courbure du facrum: c'est la position que la tête prend le plus ordinairement d'elle-même, aussi-tôt qu'elle a traversé le détroit supérieur, & qu'on doit lui donner, quand les efforts de la nature ne l'ont pas dirigée ainfi.

Ayant donné cette position avantageuse à la tête, en poussant la face dans la courbure du sacrum au moyen de deux doigts, on introduira l'index, ou le doigt du milieu, de la main droite à l'entrée de la bouche de l'enfant, en le recourbant un peu, non pas pour tirer sur la mâchoire inférieure, comme quelques-uns l'ont recommandé, mais pour empêcher que le menton ne s'accroche & ne s'arrête en quelque endroit: ou bien on remplira les mêmes vues, en alongeant deux doigts de la même main sur les côtés du nez, & vers les joues de l'enfant.

Soit qu'on place les doigts de cette ma-nière, ou qu'on en introduise un à l'entrée de la bouche, on soutiendra le corps de l'enfant de la même main recouverte d'un fur l'Art des Accouchemens. 383 linge, & on appliquera l'autre le long du dos, de façon que l'index & le doigt du milieu soient écartés & recourbés sur le

épaules.

Embrassant de cette manière le corps de l'enfant, sans le comprimer, on tirera dessus en le relevant vers le ventre de sa mère, & en le portant ensuite un peu en bas; pour le relever de nouveau, & continuer de tirer légérement dans ce dernier sens, tandis que la semme fera de son côté tous les essorts dont elle sera capable.

On cessera de tirer sur le corps aussitôt que le front sera parvenu au bas de la vulve, & d'une main alors on soutiendra le périnée de la semme, en pressant un peu de derrière en devant, c'est-à-dire, du coccyx au pubis, tant pour l'empêcher de se déchirer, que pour faciliter la sor-

tie de la tête.

Nous observerons qu'on ne sauroit mettre trop de lenteur & de ménagement dans l'extraction de la tête de l'ensant; qu'on ne doit jamais tirer avec sorce, ni par secousses sur le corps, & qu'il saut éviter, avec le même soin, de le saire selon toute la longueur de l'ensant, en ne tenant que les pieds, & en lui saisant décrire de grands mouvemens en rond.

### SECTION III.

De la manière d'opérer l'accouchement lorsque l'enfant présente les pieds dans la deuxième, troissème & quatrième positions des pieds.

D. COMMENT doit - on opérer l'accouchement, quand les pieds se présentent dans la

seconde position?

R. Dans ce cas, où les talons regardent le côté droit du bassin, l'on observera de saire descendre l'ensant de manière que le dos passe sous la cavité cotyloïde droite, & la poitrine vis-à-vis la symphise sacro-iliaque gauche; pour que les épaules & la tête se présentent savorablement au détroit supérieur. Lorsque les sesses de l'ensant seront au dehors, si l'on éprouve quelques difficultés à saire descendre les épaules, on tirera sur le haut des cuisses & les hanches, en resevant un peu vers l'aîne gauche de la femme, puis en reportant les extrémités en en bas, & obliquement vers le dessous de la cuisse droite, sans donner trop d'étendue à ces mouvemens.

On dégagera les bras, en commençant par celui qui est en dessous, aussi-tôt que les épaules paroîtront à la vulve. Lorsque la tête sera dans l'excavation du bassin, fur l'Art des Accouchemens. 385 on dirigera la face vers le milieu du facrum, si elle ne s'y porte pas d'elle-même; & on achevera l'accouchement comme dans le premier cas.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement

dans la troisième position des pieds?

es.

0

2

R. On aura le foin de changer un peu cette position, à mesure que les pieds se dégageront, & de détourner le dos de dessous la symphise du pubis, en l'inclinant vers l'une des cavités cotyloïdes; pour extraire l'ensant, comme on l'a fait dans la première & la seconde position des pieds.

En détournant le dos de dessous la fymphise du pubis, l'on ne mettra pas toujours la tête dans le cas de se préfenter savorablement au détroit supérieur, parce qu'elle ne suit pas toujours le mouvement de rotation qu'on fait saire au corps. Il saudra donc s'assurer de sa position aussi-tôt que les bras seront dégagés, asin de la changer convenablement, en dirigeant la face vers l'un des côtés de la faillie du facrum, toutes les sois qu'elle ne se sera pas tournée de cette manière.

D. Comment pourra-t-on changer la position de la tête, quand le tronc sera sorti?

R. Pour opérer le déplacement de la tête à l'égard du détroit supérieur, toutes les fois que l'occiput sera comme accroché au rebord des os pubis, & la face

K

386 Principes

appuyée sur la saillie de la base du sacrum; on introduira toute la main, à la réserve du pouce, le long de la partie antérieure du col de l'ensant, jusqu'à ce que les doigts soient parvenus sur l'une des joues, & qu'on puisse entraîner ou pousser la face vers l'une des symphises sacroiliaques. L'on ne s'efforcera jamais de donner cette position à la tête à l'égard du détroit supérieur, en tournant & en tordant, pour ainsi dire, le tronc qui est au dehors; parce qu'on ne peut la déplacer de cette manière, quand elle est engagée & sixée dans ce détroit.

L'on n'oubliera pas de diriger la face vers le milieu du facrum, lorsque la tête aura traversé le détroit supérieur, & sera descendue dans l'excavation du bassin, pour achever de l'extraire comme dans les

cas précédens.

D. Comment doit - on opérer l'accouchement, quand les pieds se présentent dans la

quatrième position?

R. Avant de décrire la manière d'opérer cette espèce d'accouchement, nous retracerons le jugement que tous les Auteurs ont porté de la position des pieds dans laquelle les orteils regardent le pubis. Ils ont aunoncé unanimement que cette position étoit peu savorable à la sortie de l'ensant; parce que le menton devoit s'accrocher & s'arrêter au rebord supérieur

fur l'Art des Accouchemens. 387 du pubis; & aucun n'a manqué de prefcrire de mettre la face de l'enfant endessous, ou vers l'un des côtés du détroit supérieur, pour prévenir cet accident.

Lorsque les pieds se présentent dans cette position, il faudra tourner les orteils en dessous à mesure que les jambes, les cuisses & les fesses se dégageront; de manière que le dos descende derrière l'une ou l'autre cavité cotyloïde, & la poitrine conséquemment vis-à-vis l'une des symphises sacro-iliaques, comme à la suite de la première ou de la seconde position des pieds.

D. Comment peut-on changer la position du tronc de l'enfant, lorsqu'il est engagé au point que les fesses paroissent à la vulve?

R. Ce changement de position s'opère encore, pour l'ordinaire, avec tant de facilité, en tirant sur les extrémités insérieures, & en les tournant comme on vient de le prescrire, qu'il sembleroit inutile de donner d'autres préceptes à cet égard. S'il arrivoit néanmoins qu'on ne puisse y parvenir de cette manière, il faudroit se comporter disséremment. On introduira les quatre doigts d'une main le long des lombes de l'ensant, mais à l'entrée du vagin seulement, & ceux de l'autre main sous le pubis, pour sixer les cuisses au-dessus de leur articulation avec le tronc. Alors on repoussera un tant soit peu

Rij

l'enfant, comme pour le faire rentrer dans la matrice, & on tirera de suite comme pour l'en dégager de nouveau; ce qu'on répétera alternativement, en détournant la poitrine chaque sois de dessous la symphise du pubis, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue vis-à-vis l'une des symphises sacroiliaques.

Comme l'on ne détourne pas toujours la face de dessus la symphise des os pubis, en roulant ainsi le corps de l'enfant à messure qu'il se dégage, & que le menton peut encore, malgré cette précaution, s'arrêter au rebord supérieur de ces mêmes os, il faudra s'assurer de la véritable position de la tête, dès que les épaules seront sorties, & lui en donner une favorable, si on ne la trouve pas telle.

D. Que faut-il faire quand la tête est comme accrochée par le menton au rebord des os pubis?

R. Ce cas est ordinairement fâcheux pour l'enfant; & il le devient d'autant plus que la tête sera retenue depuis long temps en cet état; que la femme aura fait plus d'efforts pour l'expulser, ou que l'Accoucheur même en aura exercé davantage pour l'extraire.

Quel que soit l'état de l'ensant, on ne peut extraire la tête qu'après l'avoir mise dans une position savorable à l'égard

sur l'Art des Accouchemens. 389 du détroit supérieur. Pour lui donner cette position, on avancera toute la main, à la réserve du pouce, le long de la partie postérieure du col de l'enfant jusqu'à l'occiput, qu'on refoulera au-dessus de la faillie du sacrum, & qu'on tournera ensuite vers l'une des symphises sacro-iliaques, si l'on ne peut le porter jusques sur l'une des cavités cotyloïdes. Pendant qu'on déplacera la tête de cette manière, on tournera dans le même fens, le corps qui est audehors.

Quand la tête sera parvenue dans l'excavation du baffin, on conduira la face vers le sacrum, & on achevera de la dégager comme à l'ordinaire.

D. Ne pourroit-on pas changer la position de la tête de l'enfant, dans le cas dont il s'agit, en tournant seulement le corps qui

est au-dehors?

R. On se le promettroit en vain dans le cas où la tête est engagée & comme fixée. Il faut prendre garde de s'en laisser imposer par la facilité avec laquelle on pourroit alors tourner le corps, & mettre la poitrine en dessous. La torsion du col, inséparable de ce mouvement de rotation du tronc, pourroit être fâcheuse, si l'enfant étoit vivant; & en lui donnant alors la mort, la même erreur pourroit conduire à arracher le tronc, & à le séparer d'avec la tête.

#### SECTION IV.

De l'arrachement du tronc de l'enfant, ou de sa séparation d'avec la tête.

D. DOIT - ON regarder l'arrachement du tronc de l'enfant comme un événement bien fâcheux?

- R. Cet événement est toujours fâcheux, puisque la mort de l'enfant le précède constamment; & l'Accoucheur commet une faute très-grave, toutes les fois qu'en se conduisant disséremment, il auroit pu le prévenir. L'impossibilité de conserver la vie à l'enfant, malgré toutes les précautions possibles, la certitude même qu'il en est déjà privé, ne sauroient excusér celui qui arrache le tronc de l'enfant & le décolle; parce que le spectacle en est affligeant pour les assissans; & qu'il est en général plus dissicile d'extraire la tête séparée du corps, que lorsqu'elle y tient encore.
- D. Quelles sont les causes qui penvent donner lieu à l'arrachement du corps de l'enfant?

R. La mauvaise conformation du bassin; le volume extraordinaire de la tête, sa fur l'Art des Accouchemens. 391 mauvaise position, & la putréfaction de l'enfant, sont les causes éloignées de cet accident; mais les efforts inconsidérés de l'Accoucheur en sont la seule cause déterminante.

D. Comment peut-on reconnoître chacune de ces causes éloignées de la détroncation de

l'enfant?

R. On reconnoîtra la mauvaise conformation du bassin, en examinant cette partie, & en comparant ses dimensions à celles de la tête de l'ensant.

On jugera de la putréfaction de l'enfant par l'état du corps qui est au dehors; & de la mauvaise position de la tête, en introduisant un ou plusieurs doigts dans l'orisice de la matrice.

D. Peut-on prévenir l'arrachement du tronç de l'enfant dans toùs les cas dont il s'agit?

R. On préviendra constamment cet événement, en prenant les précautions convenables.

On le préviendra dans le cas de mauvaise conformation du bassin, en appliquant le forceps à propos, quand les bras de l'ensant seront dégagés; ou bien en ouvrant le crâne, & en diminuant son volume, dès qu'on sera certain de la mort de l'ensant.

On préviendra l'arrachement du tronc, quand l'enfant sera très-putrésié, en com-

392 mettant l'expulsion de la tête aux efforts de la nature, si le col ne peut supporter ceux qu'il faudroit exercer pour l'extraire. Dans les autres cas enfin, en donnant une position favorable à la tête, avant de s'efforcer de la dégager.

D. Que faut-il faire quand le corps de l'enfant a été arraché, & que la tête est retenue dans la matrice?

R. Nous pensons qu'il convient d'extraire la tête aussi-tôt, si les parties de la femme ne sont pas fatiguées, tuméfiées, & trop douloureuses; mais la manière d'y procéder doit être différente, selon les circonstances.

D. Au lieu d'extraire la tête, ne vaudroitil pas mieux en abandonner l'expulsion aux efforts de la nature?

R. On paroîtroit fondé, d'après quelques observations, à présérer ce dernier parti, puisque en pareilles circonstances, les efforts de la nature ont suffi plus d'une fois pour expulser la tête: à la vérité, dans tous ces cas, la tête étoit d'une grosseur ordinaire, relativement à la capacité du bassin de la femme. Mais la nature ne peut se suffire ainsi, quand la grosseur de la tête surpasse assez le diamètre du bassin, pour qu'elle n'ait pu traverser cette cavité avant d'être séparée du corps, malgré les violens efforts de sur l'Art des Accouchemens. 393 la femme & ceux de l'Accoucheur. Ce ne feroit qu'après un long féjour dans la matrice, & lorsque la tête seroit atteinte de la plus grande putrésaction, qu'elle pourroit alors être expulsée. Ce long séjour de la tête de l'enfant dans le sein de la femme, & sa putrésaction excessive, peuvent donner lieu à des grands accidens, qu'on préviendra sûrement en en faisant à propos l'extraction.

D. Comment peut-on opérer l'extraction de la tête dans tous les cas?

R. Quand la tête est d'une grosseur ordinaire, relativement à un bassin bien conformé, on peut l'extraire en tirant sur la mâchoire intérieure, au moyen de deux doigts portés dans la bouche de l'enfant, & en dirigeant la tête convenablement; tandis que la semme de son côté, poussera fortement en en bas.

La Sage-femme appellera un Accoucheur toutes les fois qu'elle ne pourra pas extraire la tête en se conduisant de cette manière; & cet Accoucheur emploiera d'autres moyens, si les circonstances l'exigent: il ouvrira la tête, pour en diminuer la grosseur, si elle est trop considérable; il se servira de crochets, ou du forceps, lorsqu'il le jugera convenable.

D. Puisqu'on s'expose à arracher le tronc de l'enfant en tirant dessus, pour extraire la

tête, ne peut-on pas également, en d'autres. circonstances, arracher la tête, en s'efforçant d'extraire le tronc (a)?

- R. Oui : plus d'une fois on a arraché la tête de l'enfant en tirant dessus, pour extraire le tronc, même en des cas où l'accouchement avoit paru devoir s'opérer aisément.
- D. Quelles sont les causes qui peuvent s'opposer assez fortement à la sortie du tronc, après celle de la tête, pour donner lieu à cet accident?
- R. Les obstacles qui s'opposent aussi puissamment à la sortie du trone, ne proviennent souvent que de la mauvaise postion des épaules, soit à l'égard du dé-troit supérieur, soit à l'égard du détroit inférieur; d'autres fois ils dépendent de quelques tumeurs volumineuses; de l'hydropifie de poitrine, ou du bas-ventre; ou de la conformation monstrueuse de l'enfant : sa putréfaction peut également difposer la tête à se séparer du corps.

  D. Que faut-il faire dans tous ces cas;
  pour ne point arracher la tête de l'enfant?

R. Quand l'obstacle qui s'oppose à la sortie du tronc ne dépend que de la mau-

<sup>(</sup>a) Nous parlerons ici de l'arrachement de la tête de l'enfant, ne pouvant en faire mention plus à propos dans un autre lieu.

vaise situation des épaules, on le surmonte aisément, en donnant à celles-ci une meilleure position, c'est-à-dire, en plaçant leur plus grande largeur selon le plus grand diamètre du bassin, avant de tirer sur la tête. Dans le cas de putrésaction excessive, on évitera de tirer sur la tête, & on abandonnera l'expulsion du tronc aux esforts de la nature. Mais il faudra ouvrir la poitrine & le bas-ventre, quand il y aura hydropisie; & quelquesois on sera obligé de démembrer l'enfant dont la conformation sera monstrueuse.

D. Comment peut-on extraire le tronc de l'enfant, quand la tête en a été séparée?

R. Dans bien des cas, on peut entraîner le tronc de l'enfant au moyen d'un doigt placé en manière de crochet, sous l'une & l'autre aisselles; & les efforts de la nature suffiroient pour l'expusser. Quelquesois on est obligé de se fervir de crochets, ou bien de repousser les épaules pour aller prendre les pieds.



# ARTICLE II.

Des Accouchemens dans lesquels l'enfant présente les genoux.

D. COMMENT peut-on reconnoître que les genoux se présentent à l'orifice de la matrice?

R. Il seroit aisé de le reconnoître, si les deux genoux se présentoient & s'engageoient en même temps, ce qui est excessivement rare; parce que ce sont les seules parties semblables qui peuvent ainsi se présenter & s'engager. Quand il n'y a qu'un genou, on peut le prendre pour un coude, comme on peut prendre celuici pour un genou.

Dans le premier cas, on trouve dans l'orifice de la matrice deux tumeurs affez rondes, & plus ou moins groffes, felon l'embonpoint & la force de l'enfant.

Dans le second cas, on n'en rencontre qu'une, & ce n'est qu'en avançant le doigt jusqu'aux pieds, ou jusqu'aux fesses, qu'on peut acquérir la certitude que c'est le genou.

D. Dans combien de positions les genoux

peuvent-ils se présenter?

R. On ne doit faire attention à la pofation selon laquelle les genoux se présentent & s'engagent, que relativement fur l'Art des Accouchemens. 397 à celle du corps de l'enfant, qui peut être alors telle, que le dos réponde, 1°. au côté gauche de la femme, 2°. au côté droit, 3°. à la partie antérieure, 4°. à la partie postérieure de la matrice; comme dans les quatre positions des pieds.

D. Que doit faire l'Accoucheur, quand il reconnoît que ce sont les genoux qui se pré-

Sentent?

R. Si les deux genoux s'engagent l'un à côté de l'autre, dès que les membranes feront ouvertes, on les laissera descendre, & on les dirigera seulement au moyen du doigt, de manière à ce qu'ils ne s'appuient & ne s'arrêtent pas contre quelquesuns des points de la surface interne du bassin.

Quand ils font parvenus vers l'entrée du vagin, on les accrochera de l'index de l'une & l'autre mains, & on les dégagera complétement, pour achever l'accouchement, comme dans le cas où l'enfant

présente les pieds.

S'il se présentoit de plus grandes difficultés, & si l'on ne pouvoit alors dégager les genoux au moyen des doigts, comme on vient de le recommander, on porteroit toute la main dans le vagin, & on repousseroit les genoux, pour prendre les pieds. On pourroit se servir d'un lacs ou ruban de fil, qu'on placeroit sur le pli du jarret, si l'on ne pouvoit pas repousser

les genoux fans de grands inconvéniens; ni les entraîner avec la main seule : cequi n'arrivera peut-être jamais.

D. Comment pourra-t-on placer ce ruban

sur le jarret de l'enfant?

R. On choisit un ruban large d'un pouce, & long d'une aune ou environ, on le plie dans son milieu, & on le place sur le doigt en manière de chaperon. On introduit ce doigt chargé du ruban, sur le côté de l'un ou l'autre genou, en le recour-bant sur le pli du jarret, jusqu'à ce qu'il soit parvenu de l'autre côté, & on le retire en laissant le ruban. On accroche ce dernier du côté opposé à celui par où on l'a fait pénétrer, & on le dégage de la moitié de sa longueur. On tire dessus les deux chefs de ce ruban, pour entraîner le genou, tandis qu'on s'efforce de dégager le second au moyen de l'index de l'autre main.

D. Comment doit - on se conduire quand

l'enfant ne présente qu'un seul genou (a)?
R. Si le genou descend librement & de manière que la partie inférieure du tronc s'engage à chaque douleur, on abandon. nera l'accouchement à la nature, jusqu'à ce que les fesses paroissent; mais on dé-

<sup>(</sup>a) Voyez Planche XV. Cette Planche repré-Fente l'attitude de l'enfant dans le cas le plus ordinaire, où le genou s'engage dans l'orifice de la matrice.

Lag. 398.





fur l'Art des Accouchemens. 399
gagera les pieds, lorsque les choses ne
s'annonceront pas aussi favorablement.
L'accouchement où l'ensant ne présente
qu'un genou, ne diffère pas extrêmement
de celui où il n'offre qu'un pied.

Quand le travail est compliqué d'accidens, on doit opérer l'accouchement. On n'attend pas alors que les genoux se soient engagés; on va les chercher en avançant une main dans le vagin, ou bien l'on dégage les pieds après avoir convenablement repoussé les genoux.

# ARTICLE III.

De la manière d'opérer l'accouchement, quand l'enfant présente les fesses. Voyez Planche XVI (a).

#### SECTION PREMIÈRE.

D. COMMENT doit-on considérer l'accouchement où l'enfant présente les fesses à l'orifice de la matrice?

R. Cet accouchement, comme celui où

<sup>(</sup>a) Cette Planche fait connoître l'attitude de l'enfant, lorsqu'il présente les fesses à l'orisice de la matrice.

l'enfant présente les pieds, peut être naturel, ou contre nature, selon que l'enfant sera plus ou moins volumineux, & que le travail sera compliqué, ou non compliqué d'accidens. Après avoir reconnu que ce sont les sesses qui se présentent, on sera donc ensorte de s'assurer, par l'étendue qu'elles offrent au doigt, quelle peut être la grosseur dè l'ensant, relativement à la capacité du bassin de la mère; asin de prendre le parti le plus convenable.

Lorsque l'enfant est petit, on abandonmera l'accouchement à la nature, jusqu'à ce que les fesses soient au dehors, même jusqu'à ce que les pieds se soient dégagés, pour aider la semme, comme dans le cas où les pieds se sont présentés primitivement.

Si les fesses éprouvent quelques dissicultés à franchir le détroit inférieur & la vulve, on les accrochera de l'index d'une main, recourbé en manière de crochet, sur le pli de l'aîne, & on s'efforcera de les entraîner, en tirant à soi pendant les efforts qu'exercera la femme. Si l'on ne se fert que d'un doigt dans ce moment, on observera de le porter sur la hanche de l'ensant qui répond au facrum de la semme; les sesses s'engageant presque toujours de manière qu'une des hanches regarde cet os, & l'autre le pubis. L'on peut se servix de l'index de l'une & l'autre mains, & accrocher l'une & l'autre hanches, quand les fesses se sont engagées dans la troisième

ou la quatrième position.

n

4

di

e

2

3

Quand les fesses sont assez avancées au dehors, on les faisit convenablement au moyen des deux mains garnies de linge, & on tire légérement, pour aider la nature à opérer la sortie du reste du corps. On ne cherche pas à dégager les pieds dans tous ces cas.

On observera de plus, à l'occasion des troisième & quatrième positions des sesses, de détourner le dos ou la poitrine de l'enfant de dessous la symphise du pubis, comme on l'a recommandé en traitant des troisième & quatrième positions des pieds.

D. Que faut-il faire quand l'enfant est assez gros pour que les fesses ne puissent s'engager que très-difficilement; ainst que dans le cas

où il existe des accidens?

R. Ne pouvant abandonner l'accouchement aux soins de la nature, dans tous ces cas, sans exposer la mère ou l'enfant, & quelquesois tous les deux, l'on opérera dès que les parties de la semme seront bien préparées, ou que la sorce des accidens l'exigeront.

On ira chercher les pieds de l'enfant, toutes les fois que les fesses seront assez peu engagées, pour qu'on puisse les refouler & les écarter du détroit supérieur.

On peut les repousser, quoiqu'elles occupent le fond du bassin, pourvu qu'elles n'aient pas encore franchi l'orifice de la matrice jusqu'à la hauteur des hanches. Si elles étoient sorties de la matrice, si elles en avoient franchi l'orifice; ce qui arrive rarement, quand l'ensant est trèsgros, il y auroit des grands inconvéniens à les repousser, dans les vues d'aller prendre les pieds. Il faut alors dégager l'enfant dans la position où il est, & extraire les fesses.

Quelques Accoucheurs ont proposé, dans ce cas, de passer un lacs ou ruban sur le pli des aînes, comme nous l'avons exposé à l'occasion des genoux; d'autres ont prescrit de se servir du forceps; mais on emploiera plus utilement & plus aisément des crochets mousses, tels, par exemple, que ceux qui terminent les branches du forceps courbe, auxquels on peut donner une forme & une courbure convenable. La Sage-semme doit appeller un Accoucheur dans tous ces cas difficiles.





# SECTION II.

De la manière de dégager les pieds de l'enfant, lorsqu'il présente les fesses.

D. COMMENT doit-on se comporter pour dégager les pieds de l'enfant, quand les fesses

se présentent?

R. On repoussera d'abord les fesses de l'enfant convenablement, en les dirigeant en même temps vers l'une ou l'autre des fosses iliaques, ou bien au-dessus du pubis, felon qu'elles feront placées de telle ou telle manière, relativement au bassin, & on infinuera la main en montant le long de la partie postérieure des cuisses & des jambes, jusqu'à ce qu'on soit parvenu aux pieds, de manière à pouvoir les entraîner en retirant cette main. Nous observerons que les pieds, dans ces fortes de cas, ne sont jamais fort éloignés du détroit supérieur; & qu'ils s'en trouvent même d'autant plus près, que les fesses se font moins engagées.

Quoique les pieds, le plus communément, soient assez près du détroit supérieur, il est bien important de remarquer qu'on ne peut toujours les aller prendre de la même main; & qu'on doit introduire tantôt la main droite, & tantôt la

gauche, felon la position dans laquelle:

les fesses se présentent.

Nous ajouterons encore qu'il n'est pass de la plus grande nécessité, dans ces mêmes cas, de dégager les deux pieds; qu'ill sussit presque toujours d'en amener un, quand on est sûr de la bonne conformation du bassin de la semme; parce que la seconde extrémité peut alors s'étendres aisément vers la poitrine de l'ensant.

D. Ind quez donc les cas qui exigent qu'on: introduise la main droite ou la gauche, des

préférence.

R. Lorsque les fesses seront placées des manière que le dos de l'enfant regarderat le côté gauche du bassin de la semme, ont introduira la main gauche en suivant le côté droit de la matrice; parce que c'est là où se trouvent les pieds. En introduissant cette main, on repoussera les sesses sur la sosse iliaque gauche de la semme; & on le sera de nouveau, quand on aurai dégagé les pieds, si l'on éprouve quelques difficultés à les amener au dehors.

On opérera de la main droite, & on. l'infinuera vers le côté gauche de la matrice, toutes les fois que la position des fesses sera telle, que le dos de l'ensant regardera le côté droit de ce viscère; & en avançant cette main, on repoussera les

fesses sur la fosse iliaque droite.

On introduira la main droite ou la main

fur l'Art des Accouchemens. 405 gauche, à son choix, en suivant la partie postérieure de la matrice & le derrière des cuisses de l'ensant, quand les sesses se présenteront dans la troissème position. On repoussera les sesses au-dessus du pubis de la semme, en avançant la main; & après avoir dégagé les pieds, on aura soin de détourner le dos de l'ensant de dessous la symphise du pubis, comme on l'a recommandé pour la troissème position

des pieds.

On sera libre également d'opérer de la main droite ou de la main gauche, quand les fesses se présenteront dans la quatrième position : lorsqu'on opérera de la main droite, il faudra refouler les fesses en les portant vers la fosse iliaque droite, &, s'il est possible, en leur faisant décrire un mouvement de rotation qui tende à tourner le dos entiérement vers cette fosse iliaque. Après cela, on dirigera les doigts le plus qu'on le pourra, sous la partie antérieure de la matrice, en suivant une des cuisses & des jambes de l'enfant, jusqu'à ce que 11 l'on puisse accrocher les pieds de manière les entraîner. On rendra ce procédé un peu plus facile, en inclinant le fond de la matrice vers le côté gauche de la femme, tandis qu'on avancera la main pour prendre les pieds.

On observera de tourner la poitrine de l'enfant vers l'une des symphises sacro-

Principes
iliaques, à mesure que le tronc se dégagera, comme on l'a prescrit à l'occasion
de la quatrième position des pieds.

# CHAPITRE III.

Des accouchemens où l'enfant présente le sommet de la tête, la face, la poitrine, & le bas-ventre.

#### ARTICLE PREMIER.

Des accouchemens où le sommet de la tête se présente.

#### SECTION PREMIÈRE.

D. QUELLES sont les causes qui peuvent rendre l'accouchement difficile, quand l'enfant

présente le sommet de la tête?

R. Les obstacles qui s'opposent quelquesois à l'accouchement, quand l'enfant paroît se présenter aussi favorablement, dépendent de la position même du sommet de la tête, tant à l'égard du détroit supérieur que du détroit inférieur; d'autres sois ces obstacles proviennent de ce qu'une des mains de l'enfant, même l'un des pieds, se sont engagés au-dessous de la

fur l'Art des Accouchemens. 407 tête; de ce que le bassin est trop étroit, ou la tête beaucoup plus grosse que de coutume; ce sont ensin les accidens qui se déclarent dans le cours du travail, qui nous obligent d'opérer l'accouchement.

D. Quels sont les cas où la position du sommet de la tête pourra rendre l'accouche-

ment difficile?

R. L'accouchement pourra devenir difficile à l'occasion de la position même de la tête, si le bassin de la semme est un peu resserré, toutes les sois que l'occiput se présentera primitivement au-dessus de la symphise du pubis, ou vis-à-vis la saillie du sacrum; parce que ce sera alors le plus grand diamètre de la tête qui se trouvera dans la direction du plus petit

diamètre du détroit supérieur.

L'accouchement pourra devenir également difficile, lorsque l'occiput regardera l'une des tubérosités ischiatiques dans le dernier temps du travail, & ne pourra s'en éloigner, en se portant sous l'arcade du pubis, ou vers la courbure du facrum. L'expérience nous apprend aussi que l'accouchement, quelquesois ne devient laborieux, que parce que la face de l'ensant s'est tournée sous le pubis, après que la tête a traversé le détroit supérieur; ensir, qu'il ne devient tel, que parce que la tête s'est engagée en se renversant sur le dos de l'ensant, comme on le voit

Principes exprimé sur la Planche X, & comme on l'a décrit, page 180 & suiv.

D. Comment peut-on surmonter les obstacles qui proviennent de toutes ces positions vicieuses

de la tête?

R. Dans le premier cas, il faudra détourner l'occiput de dessus le pubis, ou de devant la faillie du facrum, si le bassin est assez resserré pour que la tête ne puisse pas s'engager dans la position où elle se présente.

Dans le second, on écartera l'occiput de la tubérosité ischiatique, & on le

ramenera sous le pubis (a).

Dans le troisième, où la face de l'enfant s'est tournée sous le pubis, si la femme ne peut accoucher seule, on la

délivrera au moyen du forceps.

Quant à ce qui regarde le quatrième cas, nous avons déjà dit qu'on pouvoit empêcher la tête de s'engager en se renversant sur le dos, & de venir présenter le front; qu'on pouvoit de même corriger cette position désavantageuse, & en pro-

<sup>(</sup>a) Il faut observer ici que la tête de l'ensant:
ne peut traverser le détroit insérieur que dans la position où l'occiput répond un peu à l'un des côtés du bassin, lorsque le sacrum est applatiquant toute sa longueur, & que l'excavation du bassin est très-étroite de devant en arrière; mais ce cas d'exception est très-rare,

fur l'Art des Accouchemens. 409 curer une meilleure, en repoussant le front, & en abaissant l'occiput. Voyez page 182.

D. Peut-on changer la mauvaise position de la tête avec la main seule; dans tous ces

cas?

R. Non: si la main seule & bien dirigée, suffit le plus souvent, quelquesois il est nécessaire d'employer le levier ou le forceps. La Sage-semme doit appeller un Accoucheur dans ces derniers cas.

D. Que faut-il faire quand une des mains de l'enfant se présente & s'engage en même

temps que la tête?

R. On voit naître beaucoup d'enfans qui se présentent ainsi; parce que la sortie de la main ne sauroit toujours détourner la tête de sa bonne position, ni s'opposer à son passage à travers le bassin: cette cavité étant plus grande qu'il ne le saut absolument pour l'accouchement, chez la plupart des semmes.

Si la tête s'engage librement, malgré la présence de la main de l'enfant, on la laissera venir, & l'on ne fera rien; mais on repoussera la main, si la tête descend

difficilement.

D. Comment doit-on repousser la main de

l'enfant, dans ce cas?

R. On trouve peu de difficulté, pour l'ordinaire, à la faire remonter au-dessus de la tête, sur-tout en y procédant à

5

l'instant de la douleur même, & des efforts que fait la femme. Il suffit d'appuyer, en poussant du bout de deux doigts, sur le dos de cette main: elle disparoît, & la tête s'avance.

D. Est - il toujours possible de faire remonter ainsi la main de l'enfant, quand la tête s'est engagée dans le fond du bassin?

R. Non: il y a même des cas où il y auroit des inconvéniens à la repousser, & d'autres où la chose seroit impossible. Quand la tête est aussi basse, il faut seu-lement détourner la main de l'ensant, des côtés du bassin, & la pousser en arrière vers l'une des échancrures ischiatiques; pour qu'elle ne se trouve pas dans le trajet du petit diamètre du détroit insérieur.

du petit diamètre du détroit inférieur.
Si l'on ne pouvoit déplacer la main de cette manière, ni la faire remonter, dans le cas où elle s'oppose fortement à la sortie de la tête, il faudroit terminer l'accouchement au moyen du forceps (a).

D. Que doit-on faire quand l'un des pieds de l'enfant s'est engagé au dessous de la tête,

& s'oppose à sa sortie?

R. Il est extrêmement rare qu'un des pieds de l'enfant s'engage au dessous de la tête, & plus rare encore d'y trouver les deux pieds, & que l'accouchement en

<sup>(</sup>a) Nous avons retiré deux fois les plus grands avantages du forceps dans des cas semblables.

fur l'Art des Accouchemens. 41 f devienne impossible sans les secours de l'Art. Quand les choses se présentent ainsi, il saut repousser le pied au - dessus de la tête: on y rencontre moins de difficulté que pour la main (a).

D. Quels sont les obstacles qui dépendent de la grosseur excessive de la tête de l'enfant, ou de l'étroitesse du bassin de la mère?

R. Ces obstacles sont différens, selon que l'excédent de la grosseur de la tête de l'enfant sur le bassin de la semme, est plus ou moins grand. Quelquesois l'accouchement n'en devient qu'un peu plus long & plus dissicile; d'autres sois on ne peut surmonter les obstacles qui en résultent, qu'au moyen des instrumens, tels que le sorceps & les crochets; ensin, on est obligé de recourir à l'opération césarienne.

D. Peut-on aisément juger de la grosseur de la tête de l'enfant, respectivement à la

largeur du bassin de la semme?

R. Il n'est pas facile d'établir ce rapport, quoiqu'on mesure avec assez d'exactitude le diamètre du bassin, qui va du pubis au haut du facrum, parce qu'on ne peut mesurer de même celui de la tête.

On juge que la tête est plus grosse que

<sup>(</sup>a) Nous n'avons trouvé qu'une seule sois les pieds de l'ensant au-dessous de la tête : à peine les eûmes-nous repoussés; que l'accouchement se termina.

de coutume, d'après sa solidité, l'étroitesse de ses sutures & de ses sontanelles (a); & à coup sûr, elle est trop grosse relativement au bassin, quand elle ne peut s'y engager, malgré les essorts multipliés de la semme; étant d'ailleurs dans une bonne position.

D. L'accouchement est-il constamment difficile, toutes les sois que le bassin de la semme est resserré au-delà de certaines bornes?

R. Non; il y a d'heureuses exceptions à cet égard. On a vu des semmes se délivrer seules, & sans beaucoup de dissicultés, quoique leur bassin n'eût que trois pouces moins un quart, même deux pouces & demi de petit diamètre, mesuré du pubis au sacrum. Mais si la tête de l'ensant étoit alors à-peu-près d'une grosseur naturelle, on a remarqué qu'elle se trouvoit assez s'accommoder à la forme du détroit resserré.

Quelle que foit la largeur que conserve un bassin mal conformé, l'Accoucheur ne doit rien entreprendre, s'il apperçoit que la tête de l'enfant s'engage un peu à chaque douleur, après l'écoulement des eaux de l'amnios.

<sup>(</sup>a) On excepte ici le cas d'hydrocéphale; parce que la tête est alors plus molle, & que les sutures sont plus larges, ainsi que les sontanelles.

Sur l'Art des Accouchemens. 413
D. Qu'entendez-vous par enclavement de la tête?

R. On doit entendre par enclavement, l'état dans lequel la tête de l'enfant, engagée dans le bassin, y est tellement serrée, que les esforts de la semme ne sauroient la pousser plus en avant quelques Auteurs ajoutent à cette définition, qu'il est également impossible de repousser la tête avec la main seule, lorsqu'elle est enclavée. Mais l'opinion de ces Auteurs n'est nullement appuyée de l'observation; & la raison seule fait connoître qu'elle est erronée, parce qu'il n'y a pas de cas où l'on ne puisse repousser la tête qui est enclavée.

D. De quelle manière la tête de l'enfant

doit-elle se présenter pour s'enclaver?

R. Elle peut s'enclaver dans toutes les positions possibles; dans celles où sa longueur répond au petit diamètre du détroit supérieur, comme dans celles où l'une des oreilles regarde le pubis, & l'autre le facrum. Mais la position selon laquelle elle s'enclave le plus communément, est celle où l'occiput répond à la symphise du pubis.

La tête de l'enfant ne peut s'enclaver qu'autant qu'elle est solide, & que le bassin de la femme est un peu resserré, relative-

ment à sa grosseur.

D. Une tête enclavée est - elle également pressée de toutes parts dans le bassin?

Sij

R. Si la raison nous fait appercevoir quelques cas où la tête enclavée pourroit être également comprimée de toutes parts, l'observation ne présente pas encore d'exemples d'enclavement de cette espèce. Une tête enclavée ne touche fortement au bassin, que par deux régions de sa surface; soit par l'occiput & le front, soit par ses côtés; felon la manière dont elle s'est engagée, & la forme du bassin même. Presque toujours c'est au pubis & au sacrum que la tête touche avec ce degré de force. D. Quelles sont les causes de l'enclave-

ment?

R. La grosseur, la solidité, la mauvaise position de la tête de l'enfant, ainsi que l'étroitesse du bassin de la semme, sont autant de causes éloignées de l'enclavement; mais les efforts multipliés, & longtemps soutenus de l'accouchement, peuvent seuls y donner lieu.

D. A quels signes reconnoîtra-t-on que la

tête est enclavée?

R. Une tête enclavée ne peut avancer, quels que soient les efforts de la feinme; elle est immobile dans ce sens. Pressée contre les parois du bassin, en deux endroits diamétralement opposés, elle agit avec la même force sur les parties molles qui ta-pissent cette cavité, & y détermine un gonflement douloureux, qui se propage jusqu'aux parties extérieures, quand l'enclafur l'Art des Accouchemens. 415 vement dure long-temps. Les tégumens du crâne se tumésient de même, & forment à la suite une tumeur plus ou moins remarquable, douée d'une sorte d'élassicité.

Ainsi l'immobilité de la tête, le gonslement des tégumens du crâne, la tuméfaction des parties de la femme, telles
que du col de la matrice, du canal de
l'urètre, &c. sont les signes de l'enclavement : mais il faut observer que chacun
de ces signes peut dépendre d'une autre
cause que de l'enclavement. La tête,
placée d'une manière désavorable à l'égard
du détroit inférieur, cesse d'avancer, &
elle n'en est pas pour cela enclavée; parce
qu'elle ne touche avec sorce par aucun
de ses côtés à la surface intérieure du
bassin.

La tuméfaction des tégumens du crâne furvient dans ce cas, comme dans celui d'enclavement; elle a lieu fouvent, quoique la tête ne puisse absolument pas s'engager dans le détroit supérieur, loin de s'enclaver; & bien plus souvent encore, cette tuméfaction ne dépend que de la résistance du col de la matrice, ou des parties extérieures de la semme. Elle se remarque fréquemment, & l'enclavement est très-rare.

Le gonflement douloureux des parties de la femme peut être la fuite d'une difposition étrangère à l'enclavement; il peut d'ailleurs dépendre des fréquens attouchemens de l'Accoucheur.

D. L'enclavement, tel que vous le concevez,

est-il un accident fâcheux?

R. Il le devient on ne peut plus, tant pour la mère que pour l'enfant, s'il subfiste long-temps. La tête ne peut être ferrée, comme on l'a remarqué dans l'enclavement, qu'elle ne s'engorge de toutes parts intérieurement, & que l'enfant ne périsse dans un état d'apoplexie. La femme ne pouvant se délivrer, s'abandonne à des efforts inutiles, qui échaussent le sang, le disposent à s'enssammer, & le resoulent en quelque forte vers la poitrine & le cerveau. Les urines ne peuvent s'évacuer, & le besoin de les rendre excite de nouveaux efforts. Les parties fortement comprimées, & quelquefois contuses par la tête de l'enfant, s'enflamment, suppurent après l'accouchement, & se gangrènent même : ce qui produit d'autres incommodités, dont quelques - unes peuvent être incurables.

D. Que faut-il faire quand la tête de l'en-

fant est enclavée?

R. Il faut au plutôt terminer l'accouchement, & s'occuper enfuite des accidens auxquels l'enclavement aura donné lieu.

On procède alors à l'accouchement de différentes manières, selon l'état de l'en; fant & celui des parties de la femme. Il n'est pas impossible de repousser la tête, & d'aller prendre les pieds; mais on y rencontrera d'autant plus de difficultés, & le danger sera d'autant plus grand, qu'il y aura plus de temps que les eaux de l'amnios seront évacuées, & que la tête de l'enfant sera plus engagée & plus serrée. On ne doit prendre ce parti, que quand on ne pourra pas faire mieux. Le forceps mérite la présérence, & la Sage-semme doit au plutôt appeller quelqu'un qui soit en état de l'appliquer.

Si l'on étoit certain de la mort de l'enfant, dans le cas d'enclavement, comme
dans celui où la tête ne peut s'engager
ou fortir, à cause de l'étroitesse du bassin,
il faudroit se servir de crochets pour terminer l'accouchement. Mais nous observerons qu'il ne faut recourir à ces instrumens qu'avec beaucoup de circonspection. Ceux qui les appliquent souvent,
courent à chaque instant, les risques de
devenir homicides; tant ces instrumens
sont meurtriers, & tant il est dissicile
d'acquérir la preuve de la mort de l'ensant

avant de les employer.

D. Quels sont les signes de la mort de

l'enfant?

R. Il est extrêmement difficile de reconnoître si l'enfant est vivant ou mort,
lorsque son état ne devient douteux que

dans le cours du travail de l'accouchement, & quand la femme assure que ce n'est que depuis quelques instans, depuis quelques heures même, qu'elle ne l'a pas senti remuer.

Quand la tête s'engage difficilement, les tégumens du crâne se gonslent, si l'enfant est vivant, & forment à travers l'orifice de la matrice, une tumeur un peu élastique, qui devient flasque après la mort de cet ensant. Mais l'absence de cette tumeur, ou la flaccidité qui peut y survenir dans la suite, ne prouvent pas toujours d'une manière assez certaine que l'ensant soit mort, pour se croire bien sondé à recourir aux crochets.

L'absence des battemens, que quelquesuns supposent à la sontanelle antérieure, n'est pas un signe plus certain de la mort

de l'enfant.

La putréfaction de la portion de tégumens du crâne, qui se présente à l'orifice de la matrice, la fétidité qu'exhale le doigt qui a servi à toucher ces tégumens; la fétidité des humeurs qui découlent du vagin, la couleur verdâtre des eaux de l'amnios, le méconium qu'elles entraînent, la cessation des mouvemens de l'ensant, n'importe depuis quel temps, ne dénotent pas d'une manière plus infaillible la mort de cet ensant.

L'absence des pulsations du cordon

fur l'Art des Accouchemens. 419 ombilical depuis quelques instans, laisseroit moins de doute sur cet état; mais l'on ne peut toujours toucher le cordon.

La même incertitude ne peut avoir lieu, quand l'enfant est mort depuis long-temps; sa putrésaction est alors très-avancée, la tête est molle, & les os en sont comme vacillans; les tégumens qui la recouvrent sont slasques, & comme détachés; ils se déchirent sous le doigt, ou l'épiderme s'en détache par-tout. Ces signes, qui ne sont que l'esset de la putrésaction, se développent lentement après la mort; & il y auroit des inconvéniens à les attendre dans le cas d'enclavement, pour se décider en saveur des crochets, plutôt que des autres moyens d'opérer l'accouchement. Les crochets, propres à démembrer la tête, doivent donc être la dernière ressource de l'Accoucheur.

- D. Quels sont les moyens qu'on doit employer pour terminer l'accouchement, quand il survient de grands accidens pendant le travail?
- R. On ira prendre les pieds de l'enfant, & on le retournera toutes les fois
  que la tête sera assez peu avancée pour
  qu'on puisse la repousser jusqu'au-dessus
  du détroit supérieur. On peut la repousser,
  quelle que soit la prosondeur à laquelle
  elle se trouve engagée, pourvu qu'elle

SVJ

Principes

420

n'ait pas encore traversé l'orifice de la matrice; mais on ne doit plus le tenter, quand elle a franchi cet orifice, quand elle est sortie de la matrice même, & qu'elle occupe le canal du vagin: il faut alors opérer l'accouchement avec le sorceps, s'il ne peut se faire naturellement,

L'Accoucheur instruit dans l'art d'employer cet instrument, lui donnera la pré-férence, toutes les fois que la tête de l'en-fant, quoique recouverte du col de la matrice, sera parvenue au sond du bassin; parce que l'application en est plus aisée, moins douloureuse, & sujette à moins d'inconvéniens, que l'opération qui consiste à retourner l'enfant & à l'extraire par les pieds. Ce n'est que dans un cas pressant, & lorsqu'on ne peut se procurer quelqu'un pour appliquer le forceps, que la Sage-semme doit retourner l'ensant à l'occasion des accidens énoncés, quand la tête se rouve autant engagée.

Pour exposer plus clairement la manière de retourner l'enfant, dans tous les cas où le sommet de la tête se présente, nous le considérerons dans quatre positions différentes: 10. dans celle où l'occiput répond au côté gauche du baffin, & la face au côté droit; 2°. dans la position où l'occiput regarde le côté droit, & la face le côté gauche; 3°. dans celle où l'occiput réfur l'Art des Accouchemens. 421 pond au pubis, & la face au facrum; 4° dans celle enfin où la face est tournée vers le pubis, & l'occiput vers le facrum.

#### SECTION II.

De la manière de retourner l'enfant, quand le sommet de la tête se présente à l'orifice de la matrice.

D. COMMENT doit-on se comporter pour retourner l'enfant dans la première position du sommet de la tête? Voyez Planche VIII.

R. Nous commencerons par faire remarquer qu'il est alors tellement néceffaire d'opérer de la main gauche, quand les eaux de l'amnios sont évacuées depuis long-temps, la matrice étant fortement contractée sur l'enfant, que le succès peut dépendre uniquement de cette précaution.

En introduisant cette main avec soin, on repoussera la tête de l'ensant jusqu'audessus du détroit supérieur, & vers le devant de la fosse iliaque gauche. On dirigera la main ensuite sur le front & le côté gauche de la tête, pour gagner l'épaule, delà le côté proprement dit & la hanche de l'ensant, en suivant la partie postérieure & latérale droite de la matrice. Lorsque les doigts seront parvenus

à cette hauteur, on gagnera le pied, en passant sur la cuisse & la jambe; on l'accrochera de l'index & du doigt du milieu, & on l'entraînera jusques dans le vagin, ou à la vulve même, si on le juge à propos. On reportera la main dans la matrice, en suivant l'extrémité qu'on aura dégagée, jusqu'à la hauteur du second pied, sur lequel on recourbera quelques doigts; pour l'entraîner comme le premier (a).

Ayant dégagé l'un & l'autre jusques dans le vagin, soit en les entraînant enfemble, ou successivement, on les empoignera de manière à les amener au dehors. Si l'on trouvoit quelques difficultés à les faire descendre à ce point, il faudroit, sans les quitter, repousser la tête de l'enfant de nouveau, en la dirigeant vers le haut de la fosse iliaque gauche; parce que ces difficultés dépendent tou-

(a) Nous observerons qu'il y a des cas où l'on peut entraîner les deux pieds en même temps, & dans lesquels on ne doit pas les aller prendre successivement; mais ces cas ne peuvent se reconnoître que dans le moment même où l'on opère.

Il y a d'autres cas où l'on peut se borner à un seul pied; parce qu'il y a peu de difficulté à surmonter: c'est sur-tout quand les eaux de l'amnios ne sont que de s'écouler, & lorsque le bassin de la semme est bien consormé. Nous indiquerons dans le cours de l'Ouvrage les cas où il convient absolument de dégager les deux pieds.

sur l'Art des Accouchemens. 423 jours de ce qu'elle s'est rapprochée du détroit supérieur, & s'en trouve trop près, pour permettre aux fesses de s'y engager. Ces mêmes difficultés se manifestent souvent, quoique les pieds de l'enfant paroissent au dehors, & elles exigent encore qu'on repousse la tête (a). Pour la repousser alors plus sûrement & plus commodément, on peut appliquer un lacs fur l'un ou l'autre pied, & tirer dessus d'une main, tandis que de l'autre, intro-duite dans le vagin, on éloignera la tête. Le lacs est utile non-seulement dans ce cas, mais encore dans celui où l'on fe propose d'aller chercher le second pied, après avoir amené le premier jusqu'à la vulve. On fixe le pied à ce moyen, & on l'empêche de rentrer à mesure qu'on introduit la main vers le fecond.

D. Comment place-t-on ce ruban au pied de l'enfant?

R. L'application en est facile, quand on peut dégager le pied jusqu'à la vulve. On prend un ruban de sil, long d'une aune ou à peu-près; on le plie dans son milieu, & on en renverse l'anse sur les deux chess, de manière à former une sorte de nœud coulant, dans lequel on

<sup>(</sup>a) La nécessité de repousser la tête est la même dans toutes les positions que nous décrirons.

424 Principes

passe le pouce, l'index & le doigt du milieu d'une main; on saissit le pied avec ces mêmes doigts, & on pousse l'anneau dont ils sont chargés jusqu'au-dessus des malléoles.

On doit se rappeller ici qu'il ne faut tirer sur les pieds, & repousser la tête, que dans l'intervalle des douleurs, afin de retourner l'enfant plus facilement & plus sûrement; & qu'on ne doit agir qu'à l'instant même de ces douleurs, pour extraire l'enfant, lorsque les fesses commenceront à paroître.

D. Comment doit - on se comporter pour retourner l'enfant, dans la seconde position

du sommet de la tête?

R. Dans cette position, où l'occiput regarde le côté droit du bassin, & la face le côté gauche, on opérera de la main droite; & cette précaution devient alors d'autant plus importante, qu'il y a plus de temps que les eaux de l'amnios sont écoulées, lorsqu'on procède à l'accouchement.

On introduira cette main en suivant la partie postérieure & latérale gauche de la matrice, le long du côté droit de l'enfant qui y répond; en commençant par repousser la tête, & la diriger sur le devant de la fosse iliaque droite. Quand les doigts seront parvenus à la hauteur de la hanche & sur la cuisse, on les conduira

fur l'Art des Accouchemens. 425
vers le pied de ce côté, pour l'accrocher & l'entraîner en dégageant la main; comme on l'a prescrit pour la première position. On amenera ce pied dans le vagin, & jusqu'à la vulve même, si on le peut; & on ira de suite chercher le second, en reportant la main le long de la jambe & de la cuisse. Ayant dégagé les pieds, on aura égard à tout ce que l'on a prescrit à l'occasion de la première position, pour achever de terminer l'accouchement.

D. Comment doit - on retourner l'enfant dans la troissème position du sommet de la tête?

(Voyez Planche IX).

R. Dans cette position assez rare, où l'occiput répond au pubis, & le front au facrum, on pourrasse servir indistinctement de la main droite ou de la main gauche pour aller chercher les pieds de l'ensant.

Si l'on se sert de la main droite, comme le feront sans doute la plupart des Accoucheurs, on l'introduira de manière que le dos des doigts regarde le sacrum: on repoussera la tête au-dessus du détroit supérieur, en la dirigeant en même temps sur le bas de la fosse iliaque droite, & en la tournant de saçon que la face regarde le côté gauche du bassin. On insinuera cette main ensuite en montant le long de la partie possérieure de la matrice, & du côté droit de l'ensant, jusqu'à la hauteur de la hanche & de la cuisse; pour accro-

cher le pied, & l'entraîner comme nous l'avons recommandé à l'occasion de la seconde position. On ira chercher l'autre pied de même; & l'on se conduira, pour le reste, comme dans les positions précédentes.

D. Comment doit - on retourner l'enfant, lorsque le sommet de la tête se présente dans la quatrième position? Voyez Planche XII.

R. L'Accoucheur qui se sera suffisame ment exercé des deux mains, pourra se servir encore indistinctement de la droite ou de la gauche. S'il opère de la main droite, il l'insinuera vers le côté gauche du bassin, en repoussant la tête sur la fosse iliaque droite, & en lui faisant décrire, comme dans la troisième position, un mouvement de rotation, tel que la face regarde la sosse iliaque gauche. Il contienuera d'avancer cette main en montant les long du côté droit de l'ensant, & de la partie postérieure & latérale gauche de la matrice, jusqu'à ce qu'elle soit parvenuer aux pieds; qu'il dégagera ensemble ou successivement, comme dans les positions précédentes.



### ARTICLE II.

Des Accouchemens dans lesquels l'enfant présente la face à l'orifice de la matrice (a).

# SECTION PREMIÈRE.

Des signes qui caractérisent la face, & de ce qu'il convient de faire, en général, quand cette partie se présente.

D. A QUELS signes reconnoîtra-t-on que

l'enfant présente la face?

R. On trouve sur l'orifice de la matrice une tumeur assez arrondie d'un côté, & plus inégale de l'autre. Quand le doigt peut parcourir toute l'étendue de cette région, on découvre une suture trèsétroite, le bord des orbites, le nez, la bouche & le menton.

D. De combien de manières la face de

l'enfant peut-elle se présenter?

R. Elle peut se présenter dans quatre positions. Dans la première, le front répond au pubis, & le menton au facrum. Dans la seconde, le front est appuyé

<sup>(</sup>a) La Planche XVII fait connoître l'attitude où est l'ensant, toutes les sois qu'il présente la face à l'orifice de la matrice.

contre le facrum, & le menton contre l pubis. Dans la troissème, le front réponau côté gauche du bassin, & le mentor au côté droit. Dans la quatrième, le fronest du côté droit, & le menton du côte gauche.

D. Ces quatre positions se rencontrent-elle; aussi fréquemment les unes que les autres?

R. Non: la troisième & la quatrième sont celles qui se remarquent presque tou jours; tandis que la première & la secondé se rencontrent on ne peut plus rarements

D. Comment doit-on considérer l'accouche: ment dans lequel l'enfant présente la face à

l'orifice de la matrice?

R. L'accouchement ne peut alors se ters miner naturellement, qu'autant que l'ens sant est d'une grosseur médiocre, & même petite, relativement à la capacité du bassin de la femme; & malgré ces dispositions favorables, il ne s'opère encore que distillement: l'enfant vient alors avec la face tumésée, livide, & comme échimosée. Quand il est plus gros, il court plus de danger, & la femme ne peut se délivrer. seule, quel que soit le bon état de ses forces.

D. Que devons-nous faire quand l'enfant

présente la face?

R. Il faut s'efforcer de ramener la tête: à sa bonne position, toutes les sois que: la semme n'éprouvera pas d'accidens, que fur l'Art des Accouchemens. 429 fon bassin sera bien conformé, & qu'elle aura assez de force pour se délivrer seule après ce changement de position; mais on retournera l'enfant, & on l'amenera par les pieds, lorsque ces dispositions savorables n'auront pas lieu. Il est aussi des circonstances où l'on ne peut se dispenser le faire usage du levier, ou du forceps; mais elles sont extrêmement rares.

D. Qu'entendez-vous par ramener la tête

le l'enfant à sa bonne position?

R. Nous entendons par bonne position; selle où le sommet de la tête se présente; & c'est cette région que nous recommanlons de ramener à l'orifice de la matrice, sin que l'accouchement puisse se faire nsuite naturellement.

D. Dans quels cas doit - on se servir du evier, où du forceps, pour opérer l'accouhement où l'enfant présente la face?

R. On ne se servira de ces instrumens, que dans le cas où la tête de l'enfant sera ellement engagée & serrée dans le bassin, u'on ne pourra ni la ramener à sa bonne osition, ni retourner librement l'enfant, our le faire venir par les pieds. Ce cas xige un Accoucheur instruit.



# SECTION II.

De la manière d'opérer l'accouchement or l'enfant présente la face.

D. COMMENT doit-on procéder à l'accourchement, lorsque la face se présente dans la première position?

R. Quoiqu'il foit alors extrêmemen difficile de ramener la tête à sa bonne po sition, on tentera néanmoins de le faire: en repoussant le bas de la face jusqu'au dessus de la saillie du sacrum, au moyer des doigts placés d'abord sur les parties la térales du nez & au-dessous des orbites, & ensuite sur le haut du front. Pendant qu'o: relevera la face de cette manière, en avan çant la main dans le vagin, de l'autre mail placée extérieurement au-dessus du pubi de la femme, on appuiera avec plus on moins de force, dans la vue de pousse le sommet de la tête vers l'entrée du bassir Si l'on parvenoit à ramener cette région à l'orifice de la matrice, il faudroit encor. détourner l'occiput de derrière la symphis du pubis, pour que la tête s'engageât plu facilement.

Quand on ne peut changer aussi avantageusement la position de la tête, il fav

fur l'Art des Accouchemens. 43 I retourner l'enfant, & l'amener par les pieds; à moins que des circonstances énoncées ci-devant, n'exigent de préférence l'application du levier ou du forceps.

D. Comment doit - on se conduire pour retourner l'enfant, quand la face se présente

dans la première position?

R. On introduit la main droite, par exemple, vers la partie postérieure de la matrice, jusqu'à ce que le bout des doigts soit au-dessus du menton de l'ensant. On écarte alors les doigts pour embrasser la tête plus exactement, & pour la porter sur la sosse iliaque droite, en relevant la face, & en la tournant de manière qu'ellé regarde le côté gauche du bassin. Ayant ainsi déplacé la tête, on rapproche les doigts les uns des autres, & l'on continue d'insinuer la main le long du côté droit de l'ensant & de la partie postérieure de la matrice, jusqu'à ce qu'on soit parvenu aux pieds, pour les dégager, & achever l'accouchement comme dans le cas où le sommet de la tête se présente.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement

dans la seconde position de la face?

R. Dans cette position, où le menton de l'ensant répond au pubis de la semme, il est également difficile de repousser la face, & de ramener le sommet de la tête dans une position favorable. On peut cependant y essayer; mais on n'insistera pas

fur les tentatives qu'on fera à cet égard; & si l'on ne réussit pas dès les premières, on ira chercher les pieds. Au lieu de re-pousser la face en montant au-dessus de la symphise du pubis, au moyen des doigts placés sur les côtés du nez, comme on l'a prescrit à l'occasion de la première position, il faudra introduire toute la main vers la partie postérieure de la matrice, le long du sommet de la tête, jusqu'à ce que l'on puisse accrocher l'occi-put, l'entraîner au détroit supérieur, & le tourner en même temps vers l'un des côtés de ce détroit.

Lorsqu'on ne peut pas ramener la tête à sa bonne position, & quand la semme éprouve des accidens, il faut retourner l'enfant. Si on se sert de la main droite, on l'infinuera vers le côté gauche du bassin, au-dessus duquel on repoussera d'abord la tête, en la conduisant sur la fosse iliaque droite. Après cela, on dirigera les doigts réunis le long du côté droit de l'enfant, pour parvenir aux pieds, & les dégager comme dans le cas précédent.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement; quand l'enfant présente la face dans la troi-sième position? (Voyez Planche XVII). R. Il est alors plus aisé de ramener la

tête à sa bonne position, que dans les premiers cas; & l'on peut y procéder de deux manières, 1°, en repoussant la sace,

fur l'Art des Accouchemens. 433
2°. en entraînant le fommet de la tête même au détroit supérieur; mais ce dernier procédé est le plus sûr, & l'on ne tentera le premier que dans le cas où la tête sera très-engagée. On introduira la main gauche alors vers le côté droit de l'orifice de la matrice, jusqu'à ce que l'on puisse placer l'index & le doigt du milieu sur les côtés du nez, pour repousser le bas de la face, & successivement le front, sur le haut duquel on ramenera les doigts.

Au lieu de repousser la face de cette manière, ce qui ne réussit pas toujours, on pourra refouler la tête, si elle n'est pas fortement engagée & serrée, pour insinuer la main droite vers le côté gauche du bassin, en suivant le sommet de la tête même, jusqu'à ce que l'on puisse recourber les doigts au dessus de l'occiput, pour l'entraîner en en bas, & sorcer ainsi le menton à se relever du côté de la poitrine.

Lorsque les circonstances exigent qu'on retourne l'enfant, soit parce qu'on n'a puramener la tête à sa bonne position, ou par rapport à d'autres causes, on introduit la main gauche en repoussant la tête audessus du détroit supérieur, & vers la sosse iliaque gauche; on avance cette main le long de la partie postérieure & latérale droite de la matrice, & du côté gauche de l'ensant, jusqu'à la hauteur des pieds; pour les dégager ensemble ou successive-

ment, & terminer l'accouchement comme on l'a recommandé à l'occasion de la première position du sommet de la tête.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement où la face se présente dans la quatrième po-


fition ?

R. Lorsqu'on ne se propose que de ramener la tête à fa bonne position, pour mettre la semme à même de se délivrer naturellement, on se comportera comme à l'égard de la troisième position. On repoussera la face au moyen de deux doigts de la main droite, placés d'abord sur les côtés du nez, & ensuite sur le haut du front, jusqu'à ce qu'on ait ramené le sommet de la tête convenablement; ou bien, ce qui vaut mieux, on introduira la main gauche le long du fommet de la tête même, & vers le côté droit du bassin, jusqu'à ce qu'on puisse recourber les doigts audessus de l'occiput, pour l'entraîner en en bas.

Quand il est nécessaire de retourner l'enfant, on introduit la main droite, en repoussant la tête, & en la dirigeant sur la fosse iliaque droite; on avance cette main le long du côté droit de l'enfant & de la partie postérieure & latérale gauche de la matrice, pour arriver aux pieds, & les dégager, comme on l'a prescrit à l'occasion de la seconde position du sommet de la tête.

Pl.xvII.

pag.434.



Challe del

Devifse Sculp.



### ARTICLE III.

Des accouchemens où l'enfant présente le devant du col & la poitrine à l'orifice de la matrice (a).

# SECTION PREMIÈRE.

Des signes & des différences de ces sortes d'accouchemens.

D. PEUT-ON aisément reconnoître le devant du col de l'enfant, en touchant la semme?

R. Il est toujours impossible de bien reconnoître cette région, si l'on ne touche la femme qu'au moyen d'un seul doigt, même après l'ouverture des membranes; & l'on ne peut en acquérir la connoissance, qu'en introduisant toute la main: ce qui ne doit se faire qu'à l'instant même d'opérer l'accouchement. On reconnoît alors que c'est le devant du col, en ce que d'un côté on trouve la tête, le menton, &c. & de l'autre le haut de la poitrine.

D. Est - il plus facile de bien reconnoître la poitrine, lorsqu'elle se présente à l'orifice

de la matrice?

<sup>(</sup>a) La Planche XVIII fait connoître l'attitude où est l'enfant, quand il présente la poitrine à l'orifice de la matrice.

R. Oui; & sur-tout quand on en fait la recherche après l'écoulement des eaux de l'amnios; parce que la poitrine est alors poussée en avant par les efforts de l'accouchement, & présente naturellement une convexité qui lui permet de s'accommoder à la forme du détroit supérieur, & même de s'y engager un peu.

de s'y engager un peu.

La poitrine présente, au toucher, une tumeur aussi large que le détroit même du bassin, sur laquelle on dissingue le sternum & les côtes. La poitrine de l'enfant se présente assez rarement, & le devant

du col bien plus rarement encore.

D. De quelle manière ces régions peuvent-

elles se présenter au détroit supérieur?

R. Elles peuvent se présenter de quatre manières: 1°. la longueur du col & de la poitrine peut être placée selon le diamètre qui va du pubis au sacrum, de sorte que la tête se trouve tantôt au-dessus du pubis même, & tantôt au-dessus du facrum: ce qui constitue deux positions dissérentes. 2°. Ces régions peuvent se presenter transversalement au détroit supérieur, la tête étant appuyée tantôt sur l'une, & tantôt sur l'autre sosse iliaque; ce qui constitue encore deux autres positions: ce sont les plus ordinaires.

D. L'accouchement peut-il s'opérer naturellement, quand l'enfant présente le devant

su col ou la poitrine?





· fur l'Art des Accouchemens. 437

R. Non: si ce n'est dans un cas d'avor tement ou d'accouchement très-prématuré; parce que l'enfant est alors singulièrement petit, relativement à la capacité du bassin. Mais l'accouchement à terme est toujours impossible sans les secours de l'Art; il faut retourner l'enfant, & l'amener par les pieds. Plus on s'éloigne alors de l'instant où les eaux de l'amnios se sont évacuées, plus le danger s'augmente pour l'enfant, & plus on éprouve de difficultés à le retourner. Il est donc bien important de profiter de ce moment pour opérer.

#### SECTION II.

De la manière d'opérer les accouchemens où l'enfant présente le devant du col & la poitrine.

D. COMMENT doit-on procéder à l'accouchement dans la position du col & de la poitrine, où la tête est au-dessus du pubis? R. On introduira la main droite (a) à

R. On introduira la main droite (a) à plat, les doigts étant bien rapprochés, le long de la poitrine. A mesure qu'on avancera, on dirigera les doigts un tant soit peu sur le côté droit de l'enfant, qui

<sup>(</sup>a) Comme il est indissérent d'opérer de l'une ou l'autre main, dans cette position, ainsi que dans la suivante, nous supposons qu'on se servira présérablement de la main droite.

Principes

438

répond alors au côté droit de la matrice, & on gagnera de cette manière la hanche & la cuisse, pour arriver au pied. On entraînera ce pied, en le faisant descendre sur la poitrine, jusqu'à l'entrée de la matrice ou du vagin, & on ira chercher le second, si l'on n'a pu le dégager en même temps. Les deux pieds étant dehors, on terminera l'accouchement comme dans les terminera l'accouchement comme dans les cas précédens.

D. Comment doit - on proceder à l'accouchement dans la position du col & de la poitrine, où la tête est au-dessus du sacrum?

R. Il est plus difficile de dégager les pieds, quand l'enfant se présente ainsi, que dans la position précédente; & pour y parvenir le plus facilement & le plus fûrement qu'il est alors possible, on introduira la main droite de préférence. On linfinuera vers le côté gauche de la matrice, & on poussera la tête de l'enfant, autant qu'on le pourra, vers la fosse iliaque droite; tandis que de l'autre main appliquée extérieurement sur le ventre de la femme, on inclinera légérement la matrice vers le côté gauche. Après cela, on continuera d'avancer la main le long du côté droit de l'enfant, & comme en montant au-dessus du pubis de la mère, jusqu'à ce que l'on puisse atteindre les pieds, & les entraîner, soit ensemble ou successive. ment. Les pieds étant dégagés, on se comfur l'Art des Accouchemens. 239 portera, pour le reste, comme dans le premier cas.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement dans la position du col & de la positine, où la tête de l'enfant est appuyée sur la fosse

iliaque gauche?

R. Cette position est telle, qu'on éprouve bien moins de difficulté à dégager les pieds que dans les deux précédentes; mais il faut nécessairement opérer de la main gauche. On introduira cette main audessous de l'enfant, en suivant d'abord la partie postérieure & latérale droite de la matrice, en dirigeant les doigts le long du côté gauche de l'enfant, jusqu'à la hanche & la cuisse, pour accrocher le pied & l'entraîner en le faisant descendre sur la poitrine. On ira chercher le fecond pied de même, si l'on n'a pu le dégager en même temps que le premier, & l'on terminera l'accouchement comme on l'a recommandé pour la troisième position de la face.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement dans la position du col & de la poitrine, où la tête est appuyée sur la fosse iliaque droite?

R. Pour parvenir sûrement & aisément au but qu'on se propose alors, il est important de se servir de la main droite. On l'insinuera d'abord au-dessous de l'enfant, en dirigeant les doigts le long de son côté, en montant vers la partie postérieure

T iv

Principes

440

de la fosse iliaque gauche de la semme, jusqu'à ce que l'on soit parvenu à la hanche, à la cuisse & au pied. On entraînera ce pied, comme dans le cas précédent, en le faisant descendre sur la poitrine de l'ensant, & on ira chercher le second, pour achever l'accouchement à l'ordinaire.

# ARTICLE IV.

Des Accouchemens où l'enfant présente le ventre à l'orifice de la matrice (a).

# SECTION PREMIÈRE.

De l'attitude de l'enfant, lorsqu'il présente le ventre, & des signes de cette espèce générale d'accouchement.

D. Les accouchemens où l'enfant présente le ventre à l'orifice de la matrice, se rencontrent-

ils bien souvent?

R. Ces accouchemens sont extrêmement rares; & l'on sera forcé de convenir qu'ils doivent l'être, si l'on se fait une juste idée de l'attitude que l'enfant doit prendre dans la matrice pour présenter le ventre.

<sup>(</sup>a) La Planche XIX montre l'attitude où est ordinairement l'enfant quand il présente le ventre.

Celle fous laquelle la plupart des Accoucheurs l'ont dépeint dans leurs Planches, est telle que le corps se trouve recourbé sur sa partie possérieure, la tête renversée sur le dos, les cuisses étant alongées & rapprochées l'une de l'autre, les jambes sléchies sur les cuisses, & les pieds appuyés sur le haut des fesses: mais nous ne l'avons pas trouvée de même, & nous sommes persuadés que celle sous laquelle nous représentons l'enfant sur la Planche XIX, est l'attitude qu'il prend le plus souvent, si ce n'est toujours, pour présenter le basventre à l'orifice de la matrice.

D. A quels signes reconnoîtra - t - on que

l'enfant présente le ventre?

R. On ne peut le reconnoître qu'après l'ouverture de la poche des eaux, & lorsque l'orifice de la matrice est bien dilaté. On trouve alors une tumeur molle, fouple, égale, & plus ou moins large, à laquelle on remarque que le cordon ombilical est attaché. D'un côté, cette tumeur est bornée par le bord inférieur de la poitrine, & de l'autre, par le bord supérieur du bassin; l'extrémité antérieure de la crête des os des îles paroît sur tout très-saillante dans ces sortes de cas, & le plus fouvent une anse de cordon ombilical s'engage dans l'orifice de la matrice, aussi-tôt que les eaux de l'amnios s'écoulent.

D. De combien de manières l'enfant peut il présenter le bas-ventre à l'or fice de la matrice?

R. Cette région peut se présenter de quatre manières; & ces quatre positions sont les mêmes que celles qui ont été décrites à l'occasion de la poitrine & du col.

D. Quel jugement doit on porter sur les accouchemens où l'enfant présente le ventre?

R. Ce jugement est le même que celui que nous avons porté sur les accouchemens où l'enfant présente le col ou la poitrine: on doit regarder l'accouchement, dans tous ces cas, commé impossible sans les secours de l'Art, si la grossesse est parfaitement à son terme.

# SECTION II.

De la manière d'opèrer l'accouchement, lorsque l'enfant présente le ventre.

D. INDIQUEZ - NOUS comment on doit opérer l'accouchement, lorsque le ventre se

présente dans la première position.

R. Il y aura toujours peu de difficulté à dégager les genoux ou les pieds de l'enfant, toutes les fois que le ventre se présentera dans cette position; parce que ces extrémités appuyées sur la partie postérieure & inférieure de la matrice, sont alors trèsprès de l'orifice de ce viscère & de l'entrée du bassin. On introduira une main de ma-

fur l'Art des Accouchemens. 443 nière que sa face externe regarde le sacrum; on dirigera les doigts le long du ventre & des cuisses de l'ensant, en montant vers la partie postérieure de la matrice, jusqu'à ce qu'on puisse les recourber audessus des genoux, pour les entraîner dans le vagin, si on trouve les cuisses alongées & rapprochées l'une de l'autre; mais on accrochera les pieds préférablement aux genoux, si l'enfant est dans l'attitude que Pon voit exprimée sur la Planche XIX. Soit qu'on dégage les genoux ou les pieds dans ce premier moment, le tronc des-cendra de manière que le ventre de l'enfant répondra au pubis de la mère, si l'on ne change pas austi-tôt sa position, comme nous l'avons recommandé à l'occasion de la quatrième position des pieds. On tournera donc la poitrine vers l'une des symphises sacro-iliaques, quand les genoux ou les pieds seront sortis, pour extraire l'enfant de la manière la plus avantageuse.

D. Quels sont les signes qui dénotent la seconde position du ventre, & de quelle manière doit-on alors procéder à l'accouchement?

R. Cette position est telle, que les genoux de l'ensant sont au-dessus du pubis de la mère, & que la poitrine est appuyée sur le haut du sacrum.

Il est alors beaucoup plus difficile d'aller prendre les genoux ou les pieds, que dans la première position; parce qu'on ne peut

[ Y]

444 Principes

des cuisses de l'enfant, comme dans ce premier cas; quand bien même on feroit placer la femme sur les coudes & sur les genoux, ainsi que quelques-uns l'ont recommandé en des circonstances qui ont le plus grand rapport avec celle-ci.

le plus grand rapport avec celle ci. Si l'on procède à l'accouchement à l'inftant de l'ouverture de la poche des eaux, on repoussera d'abord la poitrine de l'enfant, en suivant la direction de la colonne lombaire de la femme, au moyen d'une main introduite dans la matrice; tandis que de l'autre main appuyée sur la région hypogastrique au'- dessus, du pubis, on exercera une pression plus ou moins forte, pour faire descendre les genoux, qui y répondent, vers le détroit supérieur; de manière qu'on puisse les saisir ensuite plus aisément, & les entraîner. Si ce procédé présente trop de difficulté, quand les eaux de l'amnios font écoulées depuis long-temps, on introduira la main droite, par exemple, vers le côté gauche, en dirigeant les doigts le long de la cuisse de l'enfant qui y répond, & en montant comme au-dessus du pubis de la mère, jusqu'à ce qu'on puisse les recourber au-dessus des genoux, & les entraîner. Pendant qu'on s'efforcera d'atteindre les genoux de cette manière, & pour y parvenir plus aisément, on tiendra la femme couchée sur le côté gauche, &

fur l'Art des Accouchemens. - 445 on y inclinera d'ailleurs la matrice au moyen d'une pression exercée convenablement à l'extérieur.

Il feroit plus facile d'aller prendre les pieds de l'enfant, en passant la main sur la cuisse & la hanche, & en recourbant les doigts au - dessus des lombes, où se trouvent ces extrémités; mais si ce procédé est plus facile pour l'Accoucheur, il est moins favorable pour l'enfant : on s'en tiendra donc au premier.

D. Quels sont les signes distinctifs des troisième & quatrième positions du ventre?

R. Dans la troisième position, le ventres est placé transversalement sur le détroit supérieur, de manière que la poitrine est appuyée sur la fosse iliaque gauche, & que les genoux & les pieds sont sur ladroite.

Dans la quatrième position, le ventre se présente également en travers, mais la poitrine est sur la fosse iliaque droite, & les extrémités sont sur la gauche.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement

dans la troisième position du ventre?

R. On introduira la main gauche en fuivant le devant des cuisses de l'enfant, & en montant vers la fosse iliaque droite de la mère, jusqu'à ce qu'on puisse re-courber les doigts au dessus des genoux, ou au-dessus des pieds, de manière à les entraîner dans le vagin. On entraînera les

pieds préférablement aux genoux, toutes les tois que l'enfant sera dans l'attitude qu'on remarque sur la Planche XIX; mais on amenera les genoux, si les cuisses se trouvent alongées & rapprochées. Si l'on vouloit dégager les pieds dans ce dernier cas, il faudroit introduire la main en suivant la partie postérieure de la matrice, & en recourbant les doigts au-dessus des lombes & des fesses de l'enfant même, jusqu'à ce qu'on puisse accrocher ces extrémités & les entraîner: ce procédé est moins recommandable que le précédent, parce que l'enfant s'en trouve plus fatigué.

D. Comment doit-on terminer l'accouche-

ment dans la quatrième position du ventre?

R. On introduira la main droite en montant vers la fosse iliaque gauche de la femme, & le long des cuisses de l'enfant, jusqu'à ce qu'on puisse recourber les doigts au-dessus des genoux ou des pieds, & les entraîner. On dégagera les genoux en premier lieu, ou les pieds, felon l'attitude de l'enfant; comme on l'a recommandé pour la troisième position (a).

<sup>(</sup>a) S'il arrivoit que le devant du bassin & des cuisses se présentar, dans l'une ou l'autre des positions indiquées à l'occasion du ventre, il fandroit proceder à l'accouchement, comme on vient de le recommander à l'occasion de toutes ces pofitions; & dégager les genoux préférablement aux pieds, dans le premier moment.



Challi del

Devifse sell



# CHAPITRE IV.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la région occipitale le derrière du col, le dos, & les lombes à l'orifice de la matrice.

### ARTICLE PREMIER.

Des accouchemens où l'enfant présente la région occipitale & le derrière du col (a).

### SECTION PREMIÈRE.

Des signes qui font connoître ces parties, & du jugement qu'on doit porter sur con sortes d'accouchemens.

D. A QUELS signes reconnoîtra-t-on que l'enfant présente la région occipitale & le derrière du col?

R. On trouve alors sur l'orifice de la natrice une tumeur dure arrondie, qu'on

<sup>(</sup>a) La Planche XX fait voir l'attitude de l'entant, présente l'occiput & le derrière du col.

ne peut méconnoître pour être une partie de la tête de l'enfant. On distingue dans l'étendue de cette tumeur, les deux branches de la suture lambdoïde, les espaces membraneux qui sont au bas de cette suture, la sontanelle postérieure, le derrière des oreilles, & les apophyses épineuses des vertèbres cervicales.

D. De combien de manières cette région peut-elle se présenter au détroit supérieur?

R. L'occiput & le derrière du col peuvent se présenter de quatre manières, à

l'égard de ce détroit.

que le sommet de la tête soit appuyé sur la partie possérieure & inférieure de la matrice, au-dessus du sacrum, & le dos contre la partie antérieure de ce viscère, au-dessus du pubis; 2°. il peut être situé de façon que le sommet de la tête réponde à la partie antérieure & inférieure de la matrice au-dessus du pubis, & le dos à la partie postérieure de ce viscère au-dessus du facrum. 3°. La région occipitale & le derrière du col peuvent se présenter transversalement sur le détroit, de sorte que la tête se trouve appuyée sur l'une des sosses siliaques, & le dos placé sur l'autre ce qui établit encore deux positions dissérentes.

D. L'accouchement peut - il s'opérer natu-

Sur l'Ait des Accouchemens. 449

rellement dans tous ces cas?

R. L'accouchement ne peut s'opérer naturellement dans tous ces cas, qu'autant que le derrière de la tête, appuyé sur un des points de la marge du bassin, quitte ce point & se rapproche du centre du détroit, de manière à s'y engager aussi librement que si la tête se sût présentée dans une bonne position. Si ce changement de position, ce déplacement se fait quelquesois comme de lui-même, c'est-à-dire, par les seuls essorts de la nature, quelquesois aussi l'occiput au lieu de descendre de la marge du bassin, dans le détroit supérieur, reste fortement appuyé sur cette marge, ou s'en éloigne en remontant, de sorte que c'est le derrière du col qui se présente en plein à l'orifice de la matrice, & que l'accouchement ne peut se faire sans les secours de l'art.



# . SECTION II.

De la manière d'opérer l'accouchement, quand l'enfant présente le derrière de la tête & du col.

D. Q U E faut-il faire quand l'enfant prèsente la région occipitale & le derrière du col?

R. Il faut ramener la tête à sa position naturelle, c'est-à-dire, rapprocher les sommet du milieu du détroit supérieur, toutes les sois que la semme n'éprouver pas d'accidens; & abandonner ensuite: l'accouchement aux soins de la nature.

Penfant à sa position naturelle, dans les

divers cas dont il s'agit?

R. Si l'on étoit certain, avant l'écoulement des eaux de l'amnios, que l'enfant: présente la région occipitale & le derrière: du col, ainsi que de la position de cette région à l'égard du détroit supérieur, on pourroit espérer de ramener la tête convenablement, en faisant prendre & garder à la semme une attitude déterminée, sur son petit lit.

Dans le cas où le fommet de la tête est au-dessus du facrum, il faudroit que la semme se tîat couchée sur le dos. Dans celui où le sommet regarde la sosse iliaque gauche, on la feroit coucher sur le côté gauche, pour y incliner le sond de la matrice; & sur le côté droit, quand le sommet de la tête répond à la sosse iliaque droite, pour remplir les mêmes vues. Il n'est alors qu'un seul cas où l'on ne puisse rien attendre de la situation de la semme, c'est celui où l'occiput & le derrière du col sont placés de manière que le sommet de la tête est au-dessus du pubis; à moins qu'on ne la fasse tenir sur les coudes & sur les genoux: mais cette position de l'occiput & du col doit être excessivement rare; & si elle se rencontroit, le parti le plus sûr seroit de retourner l'ensant.

D. Que faudroit - il fuire dans les trois premiers cas, si l'on ne pouvoit ramener la tête à sa bonne position au moyen des diverses attitudes que vous recommandez de donner à la semme?

R. Il faudroit opérer ce changement de position, en avançant une main dans la matrice. Dans le cas où le sommet de la tête est appuyé sur la partie postérieure de ce viscère, on introduira l'une ou l'autre main vers ce côté, jusqu'à ce que l'on puisse embrasser le haut de la tête, & l'entraîner, en tournant en même temps l'occiput derrière l'une des cavités cotyloïdes.

On infinuera la main droite en montant vers la fosse iliaque gauche, quand le

sommet de la tête sera de ce côté, & on l'entraînera de même au détroit supérieur.

On introduira la main gauche au contraire, en montant vers la fosse iliaque droite, quand le sommet de la tête sera tourné vers cet endroit, & on le ramenera de même à l'orisice de la matrice.

La tête étant réduite ainsi à sa bonne position, l'on abandonnera l'accouchement aux soins de la nature. Mais il saudroit retourner l'ensant & l'extraire par les pieds, si la semme éprouvoit des accidens, ou si elle ne conservoit pas affezde forces pour se délivrer seule, malgréda bonne position à laquelle on pourroit ramener la tête.

D. Comment doit on retourner l'enfant dans la première position du derrière de la tête & du col?

R. On introduit alors la main en montant le long de la partie postérieure de la matrice, jusqu'à ce qu'elle embrasse exactement le sommet de la tête, qui y répond; & l'on se conduit d'abord commes si l'on ne vouloit que ramener la tête à sa bonne position, c'est-à-dire, en entraînant le sommet vers le détroit supérieur. Si l'on se sert de la main droite, on la dirigera dans la suite sur le côté droit de la tête, de manière qu'elle: embrasse l'occiput & une partie du sommet. On écartera la tête alors de la saillie:

fur l'Art des Accouchemens. 453 a facrum, en la portant au-dessus des os abis & sur le devant de la fosse iliaque coite, de sorte que la face, après ce éplacement, regarde le côté gauche du assin. On continuera d'avancer la main long du côté droit de l'enfant, pour arvenir aux pieds & les dégager, comme n l'a recommandé pour la seconde potion du sommet de la tête, & beaudup d'autres qui ont été décrites ci-deant.

D. Comment doit · on retourner l'enfant uns la seconde position de l'occiput & du

1.2

R. Cette position rare, dans laquelle n a remarqué ci - dessus qu'on ne pouoit ramener le sommet de la tête avangeu'ement au détroit supérieur, offre ten plus de facilité que la précédente, tand il s'agit de retourner l'enfant.

L'on introduit alors la main droite, par cemple, en montant vers la fosse iliaque auche de la femme, & en poussant la tête ir celle de l'autre côté. On continue avancer cette main en suivant la partie térale gauche de la matrice, jusqu'à la anche, & à la cuisse de l'ensant; & l'on rige les doigts sur les pieds, pour les itraîner, soit ensemble ou successiveent, & les amener dans le vagin. L'ortion a dégagé les pieds à ce point, on re uniquement sur le gauche, jusqu'à ce

454 Principes


qu'il foit au dehors, puis on reprend celui qui est resté en arrière, & on agit sur l'un & sur l'autre, comme dans tous les cas; en observant de tourner la poitrine vers l'une des symphises sacro-iliaques, à mesure que le tronc s'avance.


D. Comment doit - on retourner l'enfant dans la troisième position de l'occiput & du col?

R. On introduit alors la main droite, en montant vers la fosse iliaque gauche, sur laquelle est appuyé le haut de l'occiput & le sommet de la tête. On éloigne celleci de cet endroit, en la poussant sur le devant de la fosse iliaque droite. On avance la main ensuite le long du côté droit de l'enfant, jusqu'à la hauteur de la hanche & de la cuisse, pour parvenir plus sûrement aux pieds, & les dégager avec les précautions recommandées dans les autres cas.

D. Comment doit-on retourner l'enfant dans la quatrième position de l'occiput & du col?

R. L'on doit introduire la main gauche dans la matrice, pour en dégager les pieds de l'enfant. On l'insinue d'abord en montant vers la fosse iliaque droite, où répond le sommet de la tête; & l'on pousse celle-ci sur la fosse iliaque gauche. On avance la main ensuite le long du côté gauche de l'enfant, pour parvenir aux pieds, & les dégager comme dans la





fur l'Art des Accouchemens. 455 remière position du sommet de la tête, z terminer l'accouchement ainsi qu'on l'a rescrit alors.

#### ARTICLE II.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le dos à l'orifice de la matrice (a).

### SECTION PREMIÈRE.

Des signes qui font connoître le dos; & du jugement qu'on doit porter sur ces sortes d'accouchemens.

), A QUELS signes reconnoîtra-t-on que

enfant présente le dos?

R. On reconnoît aisément cette partie, uand on peut la toucher à nud. On rouve sur l'orifice de la matrice une tuteur assez large pour recouvrir toute entrée du bassin; & on y distingue assez ien les omoplates & les côtés, ainsi que les pophyses épineuses des vertèbres, quoi-ue très-petites au terme de la naissance.

D. Dans combien de positions le dos de enfant peut-il se présenter à l'égard du bassin

e la femme?

<sup>(</sup>a) La Planche XXI exprime l'attitude où est enfant, quand il présente le dos.

R. Il peut se présenter de quatre manières, ainsi que toutes les régions précédentes. Dans la première position du dos, le derrière du col est appuyé sur le rebord des os pubis; & les lombes, ainfil que les fesses de l'enfant, répondent à las partie postérieure de la matrice, au-dessus du sacrum.

Dans la seconde, les lombes & les fesses de l'enfant sont au-dessus du pubis de la mère, & le col est appuyé contre le haut du facrum, au-dessus duquel la tête se trouve alors.

Dans la troisième, le dos est placés transversalement sur le détroit supérieur, de manière que le col & la tête répondent à la fosse iliaque gauche, les lombesses & les fesses à la fosse iliaque droite.

Dans la quatrième, c'est la tête & les

col qui sont appuyés sur la sosse iliaques droite, les lombes & les fesses étant sur

la fosse iliaque gauche.

D. Quel est le jugement qu'on doit porter sur l'accouchement où l'enfant présente le dos

à l'orifice de la matrice?

R. L'accouchement, en pareil cas, est constamment impossible sans les secours de l'Art, si l'enfant continue de présenter le dos après l'écoulement des eaux de l'amnios, à moins qu'il ne soit assez petit relativement à la capacité du bessin de la femme, pour venir en double.

On

sur l'Art des Accouchemens. 457

On a quelquesois vu l'enfant présenter le dos avant l'écoulement des eaux de l'amnios, & changer de position, au point d'offrir dans la suite à l'orifice de la matrice, la tête ou les fesses, de sorte que l'accouchement a pu se terminer seul. Mais ce changement de position s'opère si rarement, qu'on ne doit pas y compter, & qu'on est toujours très-bien sondé à prononcer qu'il faudra retourner l'enfant & dégager les pieds, quand le dos se présente.

#### SECTION II.

De la manière d'opérer l'accouchement où l'enfant présente le dos.

D. COMMENT doit-on opérer l'accouchement dans la première position du dos?

R. Toutes les fois qu'on y procédera au moment de l'ouverture de la poche des eaux de l'amnios, on introduira la main en montant le long de la partie postérieure de la matrice, jusqu'au-dessus des fesses de l'enfant qui y répondent; on accrochera les pieds convenablement du bout des doigts recourbés, & on les entraînera, pendant que de l'autre main appuyée sur le ventre de la semme, on s'occupera à

diminuer l'obliquité antérieure de la ma-

trice, par une pression convenable.

Si l'on ne pouvoit pas dégager les pieds s de cette manière, quand les eaux sont écoulées depuis long-temps, il faudroit se: comporter différemment. On avance alors s la main droite le long de la partie latérale gauche de la matrice, jusqu'à la hanche de l'enfant, en poussant le Las du tronce vers le côté droit de la femme ; tandis que? de l'autre main appliquée extérieurement, on incline un peu le fond de la matrice: même vers le côté gauche; & l'on gagne: ainsi les pieds, pour les dégager, commes on l'a recommandé à l'occasion de quel-ques-unes des positions précédentes : après avoir amené l'un & l'autre dans le vagin, **s**i l'on éprouve quelque difficulté à les <mark>dé-</mark>gager complétement, il faut tirer uniquement sur le pied gauche, jusqu'à ce qu'il soit au dehors, & reprendre ensuite les fecond, pour agir sur les deux ensemble.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement

dans la seconde position du dos?

R. Si l'on se sert de la main droite, on l'insinuera d'abord en montant vers le côté gauche de la matrice, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue sur l'épaule de l'ensant; & dans ce moment, on détournera le dos de dessus l'entrée du bassin, en le dirigeant vers la sosse iliaque droite, tandis que de l'autre main on pressera légérement le

sur l'Art des Accouchemens. 459 ventre de la femme, de manière à incliner la matrice vers le côté gauche. Ensuite on dirigera les doigts sur la poitrine & le ventre de l'enfant, pour parvenir aux genoux & aux pieds, qu'on dégagera fucceifivement.

Si l'on trouve quelque difficulté à faire descendre les fesses de l'enfant, après avoir dégagé les pieds, on repoussera de nouveau, le dos & les épaules vers la fosse iliaque droite, & l'on tirera uniquement, pendant un instant, sur le pied droit.

D. Comment doit-on opéier l'accouchement

dans la troissème position du dos?

R. Lorsqu'on est le maître d'opérer à l'instant de l'ouverture de la poche des eaux, on introduit la main gauche le long du dos, des lombes & des fesses de l'enfant, en montant vers la fosse iliaque droite, à laquelle répondent les pieds; on recourbe les doigts au dessus de ces extrémités, & on les entraîne en retirant la main. Pendant qu'on s'efforce de dégager les pieds de cette manière, il est utile d'incliner la matrice vers le côté droit, soit en faisant coucher la semme sur ce côté, foit en appuyant convenablement sur le côté gauche du ventre.

Quand il y a très-long-temps que les eaux sont évacuées, l'on ne parvient pas aisément à dégager les pieds de l'enfant, en suivant le procédé que nous venons V ij

460

260 Principes de décrire, & il vaut mieux se conduire de la manière suivante. On introduit alors la main droite au-dessous de l'enfant; on dirige les doigts le long de la partie postérieure de la matrice, en suivant le côté droit de l'enfant, & en passant sur la hanche, la cuisse & la jambe, pour arriver aux pieds, qu'on dégage l'un après: l'autre. Après les avoir amenés dans le vagin, on tire fur le pied gauche pendant: un instant, & on relève davantage le dos: de l'enfant au-dessus du pubis de la femme :: ensuite on agit sur les deux en même temps,, & on termine l'accouchement à l'ordinaire.

D. Comment doit-on opérer l'accouchement

dans la quatrième position du dos?

R. Lorsqu'on opère au moment de: l'écoulement des eaux, on avance la main droite en montant vers la fosse iliaque: gauche de la femme, en fuivant les lombes; & les fesses de l'enfant, jusqu'aux pieds;, on accroche ces extrémités du bout des, doigts, on les entraîne pendant qu'on incline légérement la matrice vers le côté. gauche, loit en faisant coucher la femme. sur ce côté, ou bien en appuyant d'une: main sur le côté droit du ventre.

Quand les eaux sont évacuées depuis long-temps, à l'instant où l'on est pour: operer, on introduit la main gauche audessous de l'enfant, vers la partie posté-rieure de la matrice. On dirige les doigts:

Pag 460





fur l'Art des Accouchemens. 461 en suivant le côté de cet enfant, jusqu'à la hanche & à la cuisse, pour arriver plus sûrement aux pieds, & les dégager, en commençant par le gauche. Après avoir dégage l'un & l'autre, on doit tirer uniquement, pendant un instant, sur le pied droit, & ensuite sur les deux en même temps, pour extraire l'ensant à l'ordinaire.

# ARTICLE III.

Des accouchemens où l'enfant présente les lombes à l'orifice de la matrice (a).

D. A QUELS signes reconnoîtra-t-on que l'enfant présente les lombes à l'orifice de la matrice?

R. Il n'est pas très-difficile de reconnoître cette partie de l'enfant, lorsque la
poche des eaux est ouverte. Les lombes
présentent au toucher, une sorte de tumeur assez large, dans l'étendue de laquelle
on distingue plusieurs tubercules ofseux,
placés sur la même ligne, les fausses-côtes
& la faillie de l'extrémité postérieure de
la crête de l'un & l'autre os des îles.

D. De combien de manières les lombes de

<sup>(</sup>a) La Planche XXII montre l'attitude où est l'enfant quand il présente les lombes.

l'enfant peuvent - elles se présenter à l'orifice de la matrice?

R. Elles peuvent se présenter dans quatre positions différentes, comme on l'a remarqué à l'égard du dos.

La première est telle que les sesses & les pieds de l'ensant sont au-dessus du sacrum de la mère, le dos étant appuyé sur le rebord des os pubis, sous la partie antérieure de la matrice.

Dans la feconde, le dos est appuyé sur la base du sacrum, & les sesses ainsi que les pieds, sont au dessus du pubis.

Dans la troisième, le dos est sur la sosse iliaque gauche, & les sesses ainsi que les pieds, se trouvent sur la droite.

Dans la quatrième, le dos est sur la fosse iliaque droite, & les fesses & les pieds sont sur la gauche.

D. Quel jugement doit-on porter des accouchemens où l'enfant présente les lombes?

R. Ce jugement doit être le même que pour les accouchemens où l'enfant préfente le dos. La femme ne peut se délivrer seule, qu'autant que les fesses de l'enfant se rapprochent du détroit supérieur dans le cours du travail, de manière à pouvoir s'y engager. Quoique ce changement se soit opéré quelquesois comme de luimême, on ne doit pas trop s'y attendre;

Sur l'Art des Accouchemens. 463 til ne peut se faire d'ailleurs, qu'autant que la matrice contient beaucoup d'eau.

Lorsque ce changement de position ne s'opère pas ainsi, l'accouchement est im-

possible sans les secours de l'Art.

D. Que doit-on faire, lorsqu'on a reconnu que ce sont les lombes de l'enfant qui se pré-

sentent?

R. La conduite que doit tenir l'Accoucheur dans tous ces cas, doit être différente, relativement à quelques circonstances particulières. Si l'on étoit certain, avant-l'ouverture de la poche des eaux, que ce sont les lombes qui se présentent, il faudroit prescrire à la semme une attitude propre à changer la position de l'enfant, & à rapprocher les fesses de l'entrée du bassin. Si les lombes se présentoient dans la première position, on feroit coucher la femme à plat sur le dos, afin de diminuer l'obliquité antérieure de la matrice, qui est la cause éloignée de cette position On la feroit coucher sur le côté gauche, dans la vue d'y incliner le fond de la matrice, dans la position des lombes où les fesses de l'enfant se trouvent sur la fosse iliaque gauche; & sur le côté droit, lorsque les fesses sont appuyées sur la fosse iliaque droite. Nous observerons qu'il n'y a rien à espérer de l'attitude que pourroit garder la semme, quand les lombes se présentent dans la seconde

Viv

position, c'est-à-dire, dans celle où les fesses de l'enfant sont au-dessus du pubis.

Lorsque les fesses de l'enfant se sont rapprochées du détroit supérieur, soit au moyen des seuls essorts de l'accouchement, ou de l'attitude qu'on a prescrite à la semme, on attend qu'elles se soient engagées prosondément; & si on le juge nécessaire alors, on les accroche de l'index de l'une & l'autre main recourbé légérement au-dessus du pli des aînes, pour les aider à sortir; comme on l'a prescrit dans le cas où les sesses se présentent.

D. Comment doit-on se comporter quand les lombes continuent de se présenter, malgré

les précautions énoncées?


R. On doit alors dégager les pieds de l'enfant, comme on l'a prescrit pour tous les cas où il présente le dos. On se conduira donc, pour la première position des lombes, comme pour la première du dos; & ainsi des autres.





Challi del .

Duhamel . Soulp



# CHAPITRE V.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les diverses régions de l'un & de l'autre côtés du corps.

#### ARTICLE PREMIER.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant prèsente un des côtés de la tête à l'orifice de la matrice (a).

## SECTION PREMIÈRE.

Des signes qui caractérisent ces sortes d'accouchemens, &c.

D. A QUELS signes reconnoîtra-t-on que l'enfant présente un des côtés de la tête?

R. On trouve sur l'orifice de la matrice une tumeur dure & arrondie, qui dénote que c'est la tête qui se présente. On y remarque des sutures & des espèces de fontanelles; on y rencontre l'oreille, & l'on

<sup>(</sup>a) La Planche XXIII offre l'attitude où est l'enant, quand il présente l'un des côtés de la têre,

peut toucher jusqu'à l'angle de la mâchoire inférieure.

D. Est-il nécessaire de distinguer si c'est le côté droit, ou le côté gauche de la tête qui

se présente?

R. Il est des cas où cette distinction est de la plus grande importance, & dans lesquels il est nécessaire de savoir non-feulement lequel des deux côtés de la tête se présente, mais encore de quelle manière cette région est placée sur le détroit supérieur.

D. Indiquez-nous à quels signes on reconnoîtra que c'est le côté droit, ou le côté gauche

qui se présente.


R. On reconnoîtra quel est le côté de la tête qui se présente, & quelle est sa position relativement au détroit supérieur; en observant à quels points de ce détroit répondent l'oreille & ses dissérentes parties, l'angle de la mâchoire inférieure, & la suture lambdoïde qui est derrière l'oreille, comme on le remarquera ciaprès.

D. Quelles sont les positions que les côtés de la tête peuvent prendre à l'égard du détroit

Supérieur?

R. Chacun des côtés de la tête peut se présenter de quatre manières à l'égard du détroit supérieur.

Dans la première position du côté droit, le sommet de la tête répond au rebord des





os pubis, & le col est appuyé sur la base du sacrum; mais de sorte que la face regarde le côté gauche du bassin. L'extrémité supérieure de l'oreille est alors vers le pubis de la mère, son extrémité inférieure vers le facrum, & son bord postérieur tourné vers le côté droit du bassin.

La première position du côté gauche ne dissere de celle-ci, que parce que la face regarde le côté droit du bassin, le bord postérieur de l'oreille répondant alors

au côté gauche de cette cavité.

Dans la seconde position de l'un & l'autre côtés de la tête, le sommet est appuyé contre la saillie du sacrum, & le col sur le rebord des os pubis. La sace regarde la sosse diaque droite, lorsque c'est le côté droit qui se présente ainsi, & la sosse iliaque gauche, lorsque c'est le côté gauche. Cette position est celle dans laquelle les côtés de la tête se présentent le plus ordinairement.

Dans la troisième de l'un & l'autre côtés de la tête, le sommet est appuyé sur le bas de la fosse iliaque gauche, & le col sur la fosse iliaque droite. La face de l'enfant regarde la faillie du sacrum, sur laquelle elle est placée transversalement, lorsque c'est le côté droit qui se présente ainsi; & c'est l'occiput qui répond à ce même point, lorsque c'est le

côté gauche.

Dans la quatrième position, le sommet de la tête est appuyé sur le bas de la sosse iliaque droite, & le col sur la sosse iliaque gauche. L'occiput est placé transversalement sur la saillie du sacrum, & la sace au-dessus du pubis, lorsque c'est le côté droit; la face au contraire se trouve couchée transversalement sur la saillie du sacrum, & l'occiput au-dessus du pubis, quand c'est le côté gauche de la tête qui se présente.

D. En quoi est-il donc si important de distinguer si c'est le côté droit ou le côté gauche de la tête qui se présente à l'orifice de la matrice?

- R. Cette connoissance est absolument mécessaire, dans tous les cas où l'on est obligé d'opérer l'accouchement longtemps après l'écoulement des eaux de l'amnios. C'est elle qui nous détermine à porter telle ou telle main dans la matrice, pour en dégager les pieds de l'enfant; qui indique la route que doit suivre cette main pour parvenir à ces extrémités; c'est de cette connoissance, en un mot, que dépend le succès de notre entreprise dans les cas où il y a le plus de dissicultés à surmonter.
- D. Quel jugement doit on porter des accouchemens où l'enfant présente l'un ou l'autre côté de la tête?
- R. La tête de l'enfant trouve quelquefois tant de facilité à revenir comme d'elle-

fur l'Art des Accouchemens. 469 même à fa bonne position, quand elle présente l'un de ses côtés, que l'accouchement alors dissère peu de celui qu'on appelle naturel. D'autres sois elle conserve sa position primitive, malgré les essorts de l'accouchement, & celui-ci ne peut se terminer. Ensin, des accidens peuvent compliquer le travail, & nous mettre encore dans l'obligation d'opérer.

D. Que faut-il faire, en général, quand l'enfant présente l'un des côtés de la tête?

R. Il faut ramener la tête à sa bonne position, toutes les sois que la semme n'éprouvera pas d'accidens, & abandonner l'accouchement ensuite aux soins de la nature. Il faut retourner l'ensant, & l'extraire par les pieds, lorsque les circonstances feront telles que la semme ne pourroit accoucher naturellement, sans s'exposer à des inconvéniens.

## SECTION II.

De la manière de procéder à l'accouchement dans tous les cas où l'enfant présente l'un des côtés de la tête.

D. COMMENT doit-on procéder à l'accouchement dans la première position de l'un & l'autre côtés de la tête?

R. Lorsqu'on ne se propose que de ramener la tête à sa bonne position, on introduit une main dans le vagin, en dirigeant les doigts sous le bord postérieur de l'orifice de la matrice jusqu'au-dessous de l'oreille de l'enfant, & aux environs de l'angle de la mâchoire inférieure. On repousse alors le bas de la tête le plus qu'on peut, au-dessus de la saillie du sacrum, tandis que de l'autre main placée sur la région hypogastrique de la semme, on presse avec plus ou moins de force, pour diriger le sommet de la tête qui y répond, vers le milieu du détroit supérieur. Si l'on parvient de cette manière à ramener la tête fur l'entrée du bassin, on abandonnera l'accouchement aux efforts de la nature. Si l'on ne réussit pas, ou bien si des accidens ne permettent pas de confier l'accouchement à la nature, on ira chercher les pieds, & on retournera l'enfant.

D. Comment doit-on retourner l'enfant, quand l'un des côtés de la tête se présente

dans la première position?

R. Lorsque c'est le côté droit de la tête qui se présente ainsi, on doit opérer de la main droite (a). On introduit cette main

<sup>(</sup>a) Il est aussi nécessaire d'opérer de la main droite dans ce cas, qu'il est important de le saire de la main ganche dans la première position du côté gauche de la tête, quand il y a long-temps que les eaux de l'amnios sont écoulées. Le choix de la main n'est pas moins nécessaire dans tous les autres cas, que dans ceux dont il s'agit.

fur l'Art des Accouchemens. 471 en montant vers le côté gauche du bassin, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue sur la face de l'ensant, & l'on pousse alors la tête sur la fosse iliaque droite. On continue d'insinuer la main le long du côté gauche & de la partie possérieure de la matrice, en suivant le côté droit & le devant de l'ensant, jusqu'à ce que l'on soit à la hauteur des pieds, & qu'on puisse les accrocher de manière à les dégager; comme on l'a prescrit pour la seconde position du sommet de la tête.

Quand ce sera la première position du côté gauche de la tête, on insinuera la main gauche dans la matrice, en montant vers la sosse iliaque droite; on poussera la tête sur la sosse iliaque gauche, pour aller ensuite chercher les pieds, en suivant la partie postérieure & latérale droite de la matrice; comme on l'a recommandé à l'occasion de la première position du

sommet de la tête.

D. Comment doit-on procéder à l'accouchement dans la seconde position de l'un &

l'autre côtés de la tête?

R. Lorsqu'on a reconnu cette position de honne heure, on recommande à la semme de se tenir couchée à plat sur le dos, jusqu'à ce que les eaux de l'amnios se soient évacuées; parce que la tête, au moyen de cette précaution seule, s'est réduite souvent comme d'elle même à sa

472 Principes

position naturelle. Quand on s'est assuré; par un délai convenable, que ce changement de position ne peut s'opérer aussi naturellement, on insinue la main dans la matrice, en passant au - devant de la saillie du sacrum, jusqu'à ce que les doigts puissent embrasser exactement le sommet de la tête qui y répond, & l'entraîner vers le milieu du détroit supérieur; ce qui est toujours très-facile: après cela on attend patiemment l'expulsion de l'enfant. On retourne au contraire cet enfant, & on l'amène par les pieds, toutes les fois qu'il y a des accidens.

D. Comment doit - on retourner l'enfant dans cette seconde position des côtés de la

tête?

R. Si c'est le côté droit qui se présente, on insinue la main gauche en passant audevant de la faillie du sacrum, jusques sur le sommet de la tête, qu'on entraîne au détroit supérieur, comme si l'on ne vouloit que la rappeller à sa bonne position. Après avoir ramené la tête ainsi, on la dirige sur la fosse iliaque gauche, & l'on va chercher les pieds, en suivant la partie postérieure & latérale droite de la matrice, de même que le côté gauche de l'ensant; pour les dégager, & terminer l'accouchement, comme à l'occasion de la première position du sommet de la tête. Lorsque c'est le côté gauche de la tête.

fur l'Art des Accouchemens. 473
qui se présente, on introduit la main droite
en suivant la partie postérieure de la matrice; on commence par ramener le sommet au détroit supérieur, ensuite on dirige
la tête sur la fosse iliaque droite, pour
aller prendre les pieds, en suivant le côté
droit & le devant de l'ensant; comme on
l'a prescrit à l'égard de la seconde position du sommet de la tête.

D. Comment doit-on se comporter lorsquiun des côtés de la tête se présente dans la troi-

sième position?

R. Quand ce sera la troisième position du côté droit, on avancera la main droite dans le vagin, en dirigeant les doigts audessus du bord postérieur de l'orifice de la matrice, sur l'angle de la mâchoire inférieure & ses environs; on soulevera la face qui est alors couchée transversalement sur la faillie du facrum, tandis que de l'autre main on appuiera sur la région hypogastrique de la semme, à dessein de pousser l'occiput qui y répond, vers le milieu du détroit supérieur.

Si c'est le côté gauche, on avancera la main sous l'occiput même, alors appuyé sur la saillie du sacrum, & on l'entraînera

vers le milieu du bassin.

Après avoir ramené la tête de cette manière à fa bonne position, il est à propos de faire coucher la semme sur le côté gauche, asin d'y incliner un peu le sond de la matrice; & l'on abandonne l'accouchement aux foins de la nature.

D. Indiquez-nous la manière de retourner

l'enfant dans l'un & l'autre de ces cas.

R. Dans la troisième position du côté droit de la tête, on introduit la main droite en passant au-devant de la saillie du sacrum, sur laquelle la face est appuyée. On écarte la tête de ce même point, en la soulevant vers les os pubis & en la poussant sur la sosse iliaque droite; l'on parcourt ensuite le côté droit de l'ensant, la partie postérieure & latérale droite de la matrice, pour parvenir aux pieds, qu'on dégage comme on l'a prescrit pour la seconde position du sommet de la tête.

Lorsque c'est le côté gauche qui se présente dans la troisième position, on éprouve encore plus de facilité à opérer de la main droite, que de la gauche, & l'on fera bien de l'employer présérablement à

celle-ci.

On introduit cette main (la droite), en montant au-devant de la faillie du facrum, jusqu'au-dessus de l'occiput, qu'on entraîne vers le milieu du bassin, comme si l'on ne vouloit que ramener la tête à sa bonne position. On porte la tête ensuite sur la fosse iliaque droite, & l'on va prendre les pieds, en suivant le côté droit de l'ensant, comme on vient de le prescrire pour la position précédente.

D. Indiquez - nous comment on doit procéder à l'accouchement, lorsqu'un des côtés de la tête se présente dans la quatrième position.

R. Si l'on veut ramener la tête de l'enfant à sa bonne position, lorsque c'est le côté droit qui se présente, on introduira la main droite, en passant vis à vis la saillie du sacrum, sous l'occiput, qu'on entraînera vers le milieu du bassin. Après cela, on fera coucher la semme sur le côté droit, pour y incliner légérement le fond de la matrice.

Quand les circonstances exigent qu'on opère l'accouchement, on introduit la main gauche de la même manière audessous de l'occiput; & après avoir ramené la tête à sa bonne position, comme on vient de le recommander, on la porte sur la fosse iliaque gauche. On dirige la main le long du côté gauche de l'ensant, en suivant la partie postérieure & latérale gauche de la matrice, pour parvenir aux pieds & les dégager, comme on l'a preserve en parlant de la première position du sommet de la tête.

Pour ramener la tête à sa bonne position, lorsque c'est le côté gauche qui se présente, on repousse la face, qui est appuyée transversalement sur la faillie dusacrum, & l'on fait descendre l'occiput qui est au dessus du pubis, comme on l'a recommandé pour la troisième position

du côté gauche.

Quand les circonstances exigent qu'on retourne l'enfant, on introduit la main gauche au-devant de la faillie du sacrum, en relevant la face, comme on vient de le prescrire. On pousse la tête ensuite sur la fosse iliaque gauche, & l'on va prendre les pieds, en dirigeant cette main le long du côté gauche de l'ensant, ainsi que de la partie postérieure & latérale gauche de la matrice, de même que pour la première position du sommet de la tête.

#### ARTICLE IL

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente l'une ou l'autre épaule à l'orifice de la matrice (a) (\*).

# SECTION PREMIÈRE.

Des signes qui font connoître que l'enfant présente une des épaules.

D. A QUELS signes reconnoîtra-t-on que l'enfant présente une des épaules?

(a) Les Planches XXIV & XXV expriment l'attitude où est l'ensant, quand il présente l'épaule, le bras étant engagé dans le col de la matrice.

(\*) Nous croyons devoir nous dispenser d'exposer en particulier ce qui peut appartenir aux fur l'Art des Accouchemens. 477
R. Il est assez facile de reconnoître cette partie, lorsque la poche des eaux est ouverte; parce que l'épaule s'engage alors de manière à ce qu'on la touche aisément, & que le plus souvent le bras s'alonge & se déploie dans le vagin, de façon que la main paroît au dehors. Si l'Accoucheur introduit un doigt le long de ce bras, jusques dans l'oristice de la matrice, il distingue au toucher les côtes de l'enfant, la clavicule & l'omoplate: il juge également d'après ces mêmes signes, si c'est l'épaule droite ou l'épaule gauche qui se présente.

D. Est-on bien sondé à prononcer que c'est l'épaule qui se présente, toutes les sois que la

main de l'enfant paroît à la vulve?

R. Non; parce que la main peut s'engager avec la tête & la précéder, comme

accouchemens dans lesquels l'enfant présente l'un ou l'autre côté du col à l'orifice de la matrice; parce qu'il est extrêmement disficile que l'enfant se présente ainsi, dans le cours d'un travail soutenu. Si l'un des côtés du col répondoit à l'orifice de la matrice dans le début du travail, la tête ou l'épaule ne manqueroit pas d'être poussée en avant par les essorts de la nature, & de venir s'engager dans le détroit supérieur. En admettant d'ailleurs qu'un des côtés du col continue de se présenter malgré ces essorts, la circonstance n'en exigeroit pas une conduite dissérente de celle qu'nous allons tracer à l'occasion de l'épaule.

on l'a remarqué ci-devant: ce qui promett un événement bien différent, l'accouchement pouvant se faire sans beaucoup des difficulté dans ce dernier cas, tandis qu'ill est presque toujours impossible sans less secours de l'Art, lorsque c'est l'épaule qui se présente.

D. Y a-t-il des exemples que l'accouchement se soit opéré naturellement dans le cas; où l'enfant présentoit l'épaule?

R. Il en existe quelques-uns, si l'on veut appeller accouchement naturel, celui où l'ensant vient en présentant les sesses ou les pieds; car on a vu quelquesois ces parties se dégager les premières, quoique! l'épaule se sût long-temps présentée, même quoique le bras de l'ensant sût déployé dans le vagin, & que la main parût au dehors (a): mais on ne doit pas compter sur de pareilles ressources; & il vaut mieux:

<sup>(</sup>a) On ne trouve que quelques exemples d'accouchemens qui se soient terminés par les seules; forces de la nature, lorsque l'enfant présentoit: l'épaule à l'orifice de la matrice. Ces observations traduites de l'Anglois, & insérées dans le Journal de Médecine, Tomes LXIII & LXV, ne sont connoître qu'une exception à la règle générale; & l'on y remarque qu'il auroit été bien plus à propos d'opérer l'accouchement à temps, que de l'abandonner aux soins de la nature un seul enfant, sur trente, étant venu vivant.

fur l'Art des Accouchemens. 479 retourner l'enfant, & l'amener par les pieds, toutes les fois que l'épaule se préfente. La manière d'y procéder doit être différente à quelques égards, selon la position de l'épaule à l'orifice de la mattrice.

### SECTION II.

De la manière de procéder à l'accouchement dans tous les cas où l'une des épaules se présente.

D. QUELS sont les signes de la première position de l'une ou l'autre épaule, & comment doit-on alors opérer l'accouchement?

R. La première position des épaules est telle que la tête est au-dessus du pubis de la semme, tandis que le côté & la hanche sont appuyés sur la base du sacrum; la poitrine de l'ensant regardant la sosse iliaque gauche, lorsque c'est l'épaule droite qui se présente, & la sosse iliaque droite, lorsque c'est l'épaule gauche.

Pour opérer l'accouchement dans la première position de l'épaule droite, on insinue la main droite en suivant la partie postérieure & latérale gauche de la matrice, jusqu'au-dessus de la hanche de l'enfant. Etant parvenu à cette hauteur, on ramène les doigts sur la cuisse & sur la jambe, pour gagner les pieds, & les entraîner le long de la poitrine de l'enfant, jusques dans le vagin, soit en les dégageant ensemble ou successivement. Si l'on éprouve quelques difficultés à faire descendre les sesses, en tirant sur les pieds, après les avoir dégagés à ce point, on repoussera l'épaule qui est encore au détroit supérieur, sur la sosse iliaque droite, avant de se permettre de tirer avec plus de sorce.

Lorsque c'est l'épaule gauche qui ser présente, on doit opérer de la main gauche. On l'introduit en suivant la partier postérieure & latérale droite de la matrice, jusqu'à la hanche de l'ensant, d'oùt l'on dirige les doigts vers la cuisse & las jambe, pour parvenir aux pieds, & less dégager comme dans le cas précédent. Après les avoir amenés dans le vagin, ont repousse l'épaule sur la fosseiliaque gauche, autant que faire se peut, asin que les sesses trouvent moins de 'difficultés à descendre.

D. Quels sont les signes de la seconde position des épaules, & comment doit-on alors

procéder à l'accouchement?

R. La feconde position de l'une &: l'autre épaules est telle, que la tête de l'enfant est au-dessus du facrum de la mère, & la hanche au-dessus du pubis; la poitrine regardant le côté droit de la matrice, quandi

fur l'Art des Accouchemens. 481 lorsque c'est l'épaule droite; & le côté gauche, lorsque c'est l'épaule gauche.

Quand c'est l'épaule droite qui se présente, on introduit la main gauche en
suivant le côté droit du bassin, jusqu'à
ce qu'elle soit parvenue sur le front de
l'enfant; alors on pousse la tête, le plus
qu'on le peut, sur la fosse iliaque gauche,
de même que l'épaule, & l'on continue
d'avancer la main en montant le long de
la partie latérale droite de la matrice,
pour parvenir aux pieds, & les dégager
à l'ordinaire. Après les avoir amenés dans
le vagin, on repousse l'épaule de nouveau,
& l'on fait coucher la semme un tant soit
peu sur le côté droit, pour y incliner le
fond de la matrice; du reste, on se comporte comme dans les cas précédens.

Dans la feconde position de l'épaule gauche, on introduit la main droite en montant vers la fosse iliaque gauche. On pousse l'épaule & la tête vers le côté droit du bassin, puis on dirige les doigts le long de l'ensant, jusqu'à ce qu'on puisse saisir les pieds & les entraîner. S'ils descendent dissicilement, on repousse l'épaule de nouveau vers la fosse iliaque droite, te côté gauche.

D. Quels sont les signes de la troissème position de l'épaule droite, & comment doit-

on procéder alors à l'accouchement (a)?

R. Dans la troisième position de cette épaule, l'enfant est situé de manière que le ventre & la poitrine paroissent couchés transversalement sur la colonne lombaire de la mère; la tête étant appuyée sur la fosse iliaque gauche, & les fesses

placées sur la droite.

Pour retourner l'enfant en pareil cas, on introduit la main droite vers la partie postérieure de la matrice, en soulevant l'épaule, & en la portant, autant qu'il est possible, au-dessus des os pubis; on dirige ensuite les doigts vers les pieds, en suivant le côté de l'enfant, & en gagnant un peu la partie latérale droite de la matrice; l'on dégage ces extrémités ensemble ou successivement, en observant de tirer uniquement sur le pied gauche, mais pendant un instant seulement, dès qu'ils sont parvenus l'un & l'autre dans le vagin, & de relever encore l'épaule au-dessus du pubis de la mère.

D. Quels sont les signes de la troisième position de l'épaule gauche., & comment doit-

on procéder alors à l'accouchement?

R. La troisième position de l'épaule gauche est telle que le dos de l'enfant est situé transversalement sur la colonne lombaire de la mère; la poitrine, ainsi que

<sup>(</sup>a) Voyez la Planche XXIV.

fur l'Art des Accouchemens. 48; les jambes & les cuisses pliées à l'ordinaire, étant sous la partie antérieure de la matrice; la tête sur la fosse iliaque gauche, & les fesses sur la droite. C'est la plus fréquente des quatre positions de l'épaule gauche, & celle dans laquelle on rencontre le plus de difficultés à dégager les pieds.

Pour retourner l'enfant, on se servira de la main gauche, & on l'introduira d'abord en montant vers la fosse iliaque droite, jusques sur les fesses, ensuite sous la partie antérieure & latérale droite de la matrice, en suivant la cuisse gauche, jusqu'à ce qu'on puisse accrocher le pied de ce côté, & l'entraîner, en le faisant descendre sur la poitrine de l'enfant, & derrière le pubis de la mère. On reportera la main, comme ci-devant, pour dégager l'autre pied, & l'on agira uniquement fur ce dernier pendant un instant, après avoir amené l'un & l'autre dans le vagin; en observant dans ce même moment, de repousser l'épaule, le plus qu'on pourra, au-dessus de la faillie du facrum. L'on se comportera pour le reste, comme dans les autres positions.

D. Quels sont les signes de la quatrième position de l'épaule droite, & comment doiton alors procéder à l'accouchement (a)?

<sup>(</sup>b) Voyez la Planche XXV.

R. Cette quatrième position est telle que le dos de l'enfant est couché transversalement sur la colonne lombaire de sa mère; la poitrine, les cuisses & les jambes se trouvant sous la partie antérieure de la matrice, la tête sur la fosse iliaque droite, & les fesses sur la fosse iliaque gauche. C'est la plus ordinaire des quatre positions

de l'épaule droite.

Pour retourner l'enfant avec tout l'avantage possible alors, on introduira la main droite en montant vers la fosse iliaque gauche, jusques sur les sesses; de-là, on la dirigera sous la partie latérale gauche & antérieure de la matrice, en suivant la cuisse droite, pour gagner le pied & l'entraîner, en le faisant descendre sur la poitrine de l'enfant, & sous le pubis de la mère. L'on dégagera le pied gauche avec le même foin, & l'on tirera dessus pendant un instant, tandis que de quelques doigts on refoulera l'épaule de nouveau audessus de la base du sacrum, pour terminer l'accouchement à l'ordinaire.

D. Quels sont les signes de la quatrième position de l'épaule gauche, & comment doit-

on alors opérer l'accouchement?

R. La quatrième position de l'épaule gauche est telle que la poitrine de l'en-fant paroît couchée transversalement sur la colonne lombaire-de la femme, la tête fe trouvant sur la fosse iliaque droite, &

fur l'Art des Accouchemens. 48 §. les fesses, ainsi que les pieds, sur la fosse

iliaque gauche.

Pour opérer avantageusement dans ce cas, on introduira la main gauche audevant de la faillie du facrum, en repouffant l'épaule au - desfus du pubis de la femme; on dirigera les doigts ensuite le long du côté de l'enfant, & de la partie postérieure & latérale gauche de la matrice, jusqu'à ce que l'on soit parvenu aux pieds; on entraînera ces extrémités ensemble, ou l'une après l'autre, en les faisant descendre sur la poitrine même de l'enfant; & les ayant amenés dans le vagin, si l'on éprouve encore quelques difficultés à les dégager, on tirera plus fort, & même uniquement pendant un instant, fur le pied droit, tandis qu'on repoussera l'épaule de nouveau au - desfus des os pubis. On se comportera, pour le reste, comme dans les autres cas.



### SECTION II.

De la sortie du bras & de la main de l'enfant, quand l'une des épaules se présente, & de ce que doit saire l'Accoucheur à cette occasion.

D. COMMENT doit-on considérer l'accouchement dans lequel le bras de l'enfant s'échappe le premier de la matrice, au point que la main

paroît au dehors?

R. La fortie du bras de l'enfant n'a jamais rendu l'accouchement essentiellement plus difficile, que dans le cas où l'épaule se présente simplement à l'orifice de la matrice. L'on a toujours attribué à la présence de cette extrémité, des dissicultés qui provenoient d'une autre cause, & qui exigeoient des secours bien dissérens de ceux qu'on a mis alors en usage; & rien ne sauroit excuser l'espèce de cruauté que l'ignorance a souvent exercée dans ces mêmes circonstances. Si quelques Accoucheurs ont cherché à repousser les bras de l'ensant, & à le saire rentrer dans la matrice, les autres ont tenté vainement d'opérer l'accouchement, en tirant sur ce bras; plusieurs ont arraché cette extrémité, l'ont amputée, &c. sans se mettre en peine de l'état de l'ensant, qu'ils ont

quelquesois amené vivant malgré de pareilles manœuvres: ce qui est plus déplorable encore, c'est qu'après de semblables procédés, l'on a quelquesois démembré l'ensant au moyen des crochets, pour l'extraire par lambeaux, ne trouvant pas plus de facilité pour le retourner après l'arrachement ou l'amputation du bras, qu'on n'en avoit rencontré auparavant; tandis qu'avec un peu de méthode, & par des moyens très-simples, on l'auroit pu conserver, ainsi que sa mère.

D. Il n'est donc pas nécessaire, selon vous, de faire rentrer le bras qui est sorti de la matrice, pour parvenir à terminer l'accouchement?

R. Non: indépendamment de ce que la réduction du bras est impossible dans la plupart des cas, & toujours très-difficile dans ceux qui y paroissent les plus favorables, comme à l'instant même de l'écoulement des eaux de l'amnios; c'est qu'il ne peut jamais en résulter un avantage remarquable. La présence de ce bras dans l'orifice de la matrice & le vagin, n'est pas ce qui s'oppose le plus à l'introduction de la main de l'Accoucheur; nous dirons même qu'il n'en résulte aucun obstacle, & que ceux qu'on rencontre alors tiennent moins à la présence de cette extrémité, qu'au ressercement du col de la

X iv

matrice, & à la contraction de ce viscère sur le corps de l'enfant.

Loin de repousser le bras de l'enfant,

nous recommanderons de le retenir.

D. Doit-on condamner également l'intention de ceux qui se sont proposés d'extraire l'enfant en tirant sur le bras?

R. Cette conduite ne porte pas moins l'empreinte de l'ignorance, que les efforts: infructueux qu'on a faits pour réduire le bras dans la matrice. Un enfant à terme-& de grosseur ordinaire, ne sauroit traverfer un bassin de largeur naturelle, dans la position où il se trouve, quand on tire inconsidérément sur le bras; & si l'on peut, à la rigueur, extraire ainsi un enfant beaucoup plus petit, il seroit inhumain de le faire de cetté manière; parce qu'on peut l'amener autrement, avec plus de facilité & d'avantage. Une pareille conduite seroit au plus tolérable dans le cas où l'on a la certitude de la mort de l'enfant & de son peu de grosseur. Le plus grand inconvénient qu'il y auroit

à tirer sur le bras, seroit celui de ne pouvoir extraire l'enfant vivant, même de ne pouvoir absolument l'entraîner, quoique mort, s'il n'est pas très petit, & le bassin de sa mère très-grand. En tirant sur le bras, on augmente sa tuméfaction, si l'enfant est vivant, &: on en accélère la mortification; on luxe ce bras, on le désarfur l'Art des Accouchemens. 489 ticule, & on l'arrache; l'on irrite la matrice, elle se contracte davantage sur l'enfant, elle l'enveloppe plus étroitement, elle devient douloureute & s'enslamme, &c.; en un mot, on multiplie les obstacles & le danger.

D. L'arrachement du bras, ou son amputation, si souvent répété en pareilles circonstances, avec une sorce de succès, ne vous paroîtroit il pas plus nécessaire que la réduction

te cette extremité dan la matrice?

R L'idée d'une pareille opération ne reut qu'inspirer de l'horreur; rien ne peut xcuser ceux qui l'ont mise en exécution; ceux même qui se sont glorisiés d'avoir contervé l'enfant par ce procédé, qui issurent s'être frayé, à ce moyen, un chemin plus facile vers les pieds de cet 'ntant, auxquels ils n'avoient pu atteindre uparavant; & nos loix désormais deroient sévir avec rigueur, contre les. perionnes de l'Art qui le conduiront avec ussi peu de principes, & autant d'inhunamté. La mort seule de l'enfant sempleroit autoriser à couper ou à arracher e bras, s'il formoit essentiellement oblacle à l'accouchement. Mais d'après quels fignes pourra t-on être certain de fe mort? Sera-ce d'après l'état du bras exclusivement? Tel enfant n'ayant été mutilé que parce que le bras sorti étoit tumésié, noir, livide, & rempli de phlectaine, est venu

490 vivant après l'arrachement de cette extrémité. Quel que soit l'état du bras, on ne doit donc ni l'arracher, ni l'amputer, si sa présence ne s'oppose pas essentiellement à l'accouchement : or, elle ne fauroit s'y opposer.

D. D'où provenoient donc les obstacles que tant d'Accoucheurs disent avoir rencontrés dans ces sortes de cas, & qu'on y rencontre

en effet quelquefois?

R. Ces obstacles provenoient de l'état de la matrice même, & ne fauroient jamais dépendre d'une autre cause. Quelquefois le col de la matrice, à peine entreouvert pour recevoir le bras à l'instant où il est forcé de s'y engager, embrasse cette extrémité à l'instar d'une ligature médiocrement serrée, mais assez cependant pour que l'avant-bras & la main ne tardent pas à s'enfler, & à changer de couleur. D'autres fois le col de la matrice, très-ouvert au moment où la poche des eaux se déchire, & où le bras s'engage, se resserre autour de ce bras, comme dans le cas précédent, & y détermine le même gonflement & le même changement de couleur. La matrice, dans tous ces cas, s'efforçant en vain d'expulser l'enfant, se contracte & le serre étroitement de toutes parts; irritée par les obstacles, elle agit plus fortement, & acquiert tant de sensibilité, que le moindre attouchement devient douloureux pour la semme, & que le ventre même supporte à peine le poids des vêtemens. C'est du concours de toutes ces causes que naissent les difficultés qu'on rencontre à opérer l'accouchement: la présence du bras dans le col de la matrice y ajoute bien peu, mais les efforts inconsidérés de l'Accoucheur les augmentent singulièrement, en même temps qu'ils aggravent le danger que courent la mère & l'enfant.

D. Comment démontrerez-vous que la préfence du bras dans le col de la matrice, ne peut pas s'opposer fortement à l'introduction de la main de l'Accoucheur?

R. L'on sera bien convaincu que la présence du bras de l'enfant dans le col de la matrice, ne peut s'opposer fortement au passage de la main de l'Accoucheur, si l'on se rappelle la dilatation dont l'orisice est susceptible, & qu'il éprouve dans tous les accouchemens, on verra qu'il peut admettre la main de l'Accoucheur, quoique le bras de l'ensant y soit engagé, n'importe quelle que soit la grosseur de ce bras. Pour y parvenir, il ne saut que relâcher & détendre le bord de cet orisice, qu'affoiblir la contraction même de la matrice, relâcher ce viscère, & saire cesser l'état d'érétisme où il se trouve après un travail aussi long que pénible & infructueux.

X vj

. Une défaillance inattendue, une perte inopinée, ont fait cesser plus d'une sois cet état d'érétisme & de spasme, chez des semmes qu'on ne pouvoit accoucher, & on les a delivrées avec aussi peu de dissiculté, que si le bras n'eût point été éngagé. On a porté librement la main dans la matrice, malgré la sortie du bras, on a retourné l'enfant, & on l'a amené par les pieds, toutes les fois qu'on y a procéde à l'instant de l'ouverture de la poche des eaux, & de la fortie du bras même, & que l'orifice s'est alors trouvé dilaté convenablement : ce qui prouve clairement que les obstacles ne dépendent que, de l'état même de la matrice; que le bras de l'enfant y ajoute bien peu, & qu'il n'est pas nécessaire de le faire rentrer, ni de l'arracher ou de l'amputer.

D. Indiquez - nous donc la conduite que doit tenir l'Accoucheur dans tous les cas où le bras de l'enfant s'est engagé le premier?

le bras de l'enfant s'est engagé le premier?

R. Cette conduite doit être différente,
felon les circonstances que présentent
l'état de la femme.

On retournera l'enfant, & on l'amenera par les pieds, toutes les fois que le col de la matrice fera assez souple & assez dilaté à l'instant même où le bras s'y engagera; mais il faudra dissérer l'accouchement, quel que soit le laps de temps qui se sera écoulé depuis la sortie du fur l'Art des Accouchemens. 493 bras, si le col de la matrice est peu essacé, si le bord de l'orifice est dur & peu sus-ceptible de prêter à la dilatation; s'il y a de la sécheresse, de la chaleur, & de la sensibilité dans cette partie & dans le vagin; si la matrice est fortement resservée sur l'enfant, si le ventre de la semme est tendu & douloureux, si le pouls est accéptéré & robuste.

Avant d'opérer l'accouchement, dans tous ces cas, on fera faire une ample saignée du bras, qu'on répétera même, si les forces & les circonstances l'exigent; on mettra la semme dans le bain, si l'on peut se procurer les choses convenables; & au défaut du bain, on fera des somentations émollientes sur le ventre, & des injections dans le vagin; ensin, l'on n'entreprendra de retourner l'ensant, & de l'extraire, qu'après avoir calmé l'état d'érétisme, & procuré le relâchement de la matrice.

Si l'obstacle à l'introduction de la main ne dépend que du peu de dilatation de l'orifice de la matrice, de ce que le col de ce viscère n'étoit pas complétement développé & ouvert à l'instant où le bras de l'enfant s'y est engagé, il faut attendre que les efforts de l'accouchement aient procuré des dispositions plus savorables, & qu'ils aient opéré la dilatation convenable. On recommandera seulement à la

'494 Principes
femme de ne pas faire valoir ses douleurs,
& on la touchera rarement.

D. Comment doit-on procéder à l'accouchement, après les préparations dont on vient

de parler?

R. Après s'être bien assuré de la véritable position de l'ensant dans la matrice; ce qu'on reconnoît par la situation même de l'épaule à l'égard du détroit supérieur; on ira chercher les pieds, en avançant la main, comme on l'a recommandé cidevant pour les diverses positions de l'une & l'autre épaules : la sortie du bras ne devant rien changer aux procédés qui ont été décrits alors.

D. Que devient le bras de l'enfant, lorfque l'Accoucheur introduit sa main, & qu'il

dégage les pieds de cet enfant?

R. Si l'Accoucheur ne retient pas la main de l'enfant au dehors pendant qu'il introduit la sienne, il est presque impossible de ne pas la resouler dans le vagin, où les doigts, le poignet & l'avant-bras se sléchissent d'une manière incommode pour l'opérateur, & quelquesois fâcheuse pour l'enfant. Si la main de l'enfant n'est pas resoulée dans ce premier moment, souvent elle disparoît & remonte à messure que les pieds s'avancent au dehors, & que les sesses le dégagent; pour reparoître quelquesois un instant après, appliquée sur l'une des hanches, ou sur

sur l'Art des Accouchemens. 495 le ventre. D'autres tois l'avant-bras & le poignet se fléchissent dans le vagin, comme on vient de le remarquer, & y prennent une position différente, relativement au corps de l'enfant, qu'on continue de faire descendre. Cette extrémité peut alors se porter sur la poitrine, & dans la suite sur l'un des côtés de la tête & du col, comme on l'observe dans presque tous les accouchemens où l'entant vient en présentant les pieds. Elle peut, en d'autres cas, se porter vers le dos de l'enfant; &, forcée de se relever dans cette direction à melure que le corps se dégage, elle est exposée à se luxer ou à se fracturer.

Pour prévenir tant d'inconvéniens, il faut retenir la main de l'enfant au dehors, pendant qu'on pénetre dans la matrice, & qu'on en dégage l'entant même, de manière que le bras reste toujours alongé dans le vagin. Si cette main est forcée de remonter, & de rentrer en quelque sorte à mesure que les pieds s'avancent au dehors, il faut la dégager de nouveau, dès que les sesses paroissent à la vulve.

D. Comment peut-on retenir la main de l'enfant au dehors, pendant qu'on va cher-

cher les pieds?

R. Comme il seroit incommode, même disficile, que l'Accoucheur pût la retenir d'une main, tandis qu'il opère de l'autre, nous conseillons de placer un ruban au

496 poignet, comme nous avons recommandé de s'en servir pour le pied, dans autre circonstance.

L'Accoucheur, d'une main un peu éloignée des parties de la femme, tirera sur ce ruban autant qu'il le faudra pour tenir le bras de l'enfant alongé, pendant qu'il introduira l'autre main dans la matrice, & qu'il en dégagera les pieds. Il cessera de tirer sur ce ruban, pendant que les pieds descendront, pour que l'épaule de l'enfant puisse, dans ce moment, s'éloigner du détroit supérieur, & que la main puisse remonter jusques dans le vagin. Mais il s'en servira de nouveau, pour faire redescendre cette main aussi-tôt que les fesses paroîtront à la vulve; & julqu'à ce qu'il puisse saisir de ses deux mains, le bras & la partie inférieure du tronc de l'enfant en même temps.



pl.xxiv.

pag.406.



BioBe . Soulp .



pag .496. pl.XXV.



### ARTICLE III.

Des Accouchemens dans lesquels l'enfant présente un des côtés proprement dit, & la hanche (a).

# SECTION PREMIÈRE.

Des signes qui font reconnoître ces parties; & du jugement qu'on doit porter de l'accouchement.

D. A QUELS signes reconnoîtra-t-on que l'enfant présente un des côtés & la hanche?

R. On reconnoît aisément cette partie en touchant la femme après l'ouverture de la poche des eaux. On distingue les côtes & la crête de l'os des îles. Quand c'est la hanche même qui se présente, on peut porter quelquefois le doigt jusqu'à l'anus, & aux parties sexuelles de l'enfant.

Il n'est pas plus difficile de juger si c'est le côté droit ou le côté gauche qui se

présente.

D. De combien de manières ces parties

penvent-elles se présenter au détroit supérieur?
R. Le côté & la hanche peuvent se présenter de quatre manières.

<sup>(</sup>a) La Planche XXVI montre l'enfant dans l'attitude où il est, quand il présente la hanche.

Dans la première position, l'aisselle des l'enfant est appuyée sur le pubis de lau mère, & les sesses les pieds répondent à la partie postérieure de la matrice; la poitrine regarde la sosse diaque gauche, lorsque c'est le côté droit qui se présente; & la sosse iliaque droite, quand c'est le côté gauche.

Dans la feconde, l'aisselle de l'ensant est au-dessus du facrum, & les sesses répondent à la partie antérieure de la matrice, près le pubis. La poitrine regarde la sosse iliaque droite, lorsque c'est le côté droit qui se présente ainsi; & la sosse iliaque gauche, lorsque c'est le côté

gauche.

Dans la troisième, l'aisselle est appuyée sur le bas de la fosse iliaque gauche, & les sesses occupent la fosse iliaque droite; la poitrine est couchée transversalement sur la colonne lombaire de la mère, lorsque c'est le côté droit; & sous la partie antérieure de la matrice, quand c'est le

côté gauche.

Dans la quatrième, l'aisselle est appuyée sur le bas de la fosse iliaque droite, & les sesses sont placées sur la gauche. La poitrine de l'enfant est sous la partie antérieure de la matrice, lorsque c'est le côté droit qui se présente; & couchée transversalement sur la colonne lombaire, lorsque c'est le côté gauche.

Sur l'Art des Accouchemens. 499 D. Quel jugement doit-on porter de l'acouchement où l'enfant présente le côté & la

R. L'on a vu l'accouchement s'opérer vaturellement en pareil cas; parce que es fesses de l'enfant, toujours alors trèsrès du détroit supérieur, se sont insensilement rapprochées de ce détroit, par ine suite des efforts même de l'accouchement, & se sont engagées comme elles e font lorsqu'elles se présentent en premier lieu. Ce changement de position s'opère rarement de foi-même, & plus rarement encore, lorsque c'est le côté proprement dit qui se présente, que dans le cas où c'est l'une des hanches.

Lorsque c'est une hanche, on peut espérer de faire venir les fesses de l'enfant comme d'elles-mêmes au détroit fupérieur, en faisant coucher la semme, avant l'ouverture de la poche des eaux, fur le côté même où répondent les fesses. On la fera donc coucher fur le dos, toutes les fois que la hanche est placée de manière que les fesses se trouvent appuyées contre la partie postérieure & inférieure de la matrice; sur le côté gauche, lors-que les sesses de l'ensant seront sur la fosse iliaque de ce côté; & sur le côté droit, quand elles répondront au côté droit du bassin. L'on ne doit rien attendre de la situation de la femme, dans le cas

où la hanche est placée de manière que le fesses sont au-dessus du pubis.

Si l'on parvient à ramener ainsi les sesses de l'ensant à l'entrée du bassin, il saudra se conduire, pour le reste, comme on l'a prescrit en parlant des accouchemens où ces parties se présentent naturellement à l'orisice de la matrice. Si l'on ne pouvoitt obtenir cet avantage de la seule situation de la semme, il saudroit dégager les pieds de l'ensant, comme on l'a fait dans toutess les circonstances décrites jusqu'ici, c'est à dire, en portant la main dans la matrice.

### SECTION II.

De la manière d'opérer l'accouchement dans les divers cas où l'enfant présente le côté & la hanche.

D. COMMENT doit-on procéder à l'accouchement dans la première position du côté & de la hanche?

R. Toutes les fois qu'on pourra procéder à l'accouchement à l'instant où les eaux s'écouleront, on introduira l'une ou l'autre main en montant le long de la partie postérieure de la matrice, sur la hanche & les fesses de l'enfant; jusqu'à ce qu'on puisse accrocher les pieds, de manière à fur l'Art des Accouchemens. 501 es entraîner en retirant cette main. On observera, pendant qu'on entraînera les pieds, de tenir la semme couchée à plat ur le dos, & d'appuyer légérement sur e ventre, à dessein de diminuer l'obliquité antérieure de la matrice.

On réussitaisément, quand c'est la hanche nême qui se présente; mais on y trouve quelquesois beaucoup de difficultés, lorsque c'est le côté, & sur-tout quand il y a long-temps que les eaux de l'amnios sont écoulées. Dans ce dernier cas, il vaudra mieux se comporter de la manière suivante.

Lorsque c'est le côté droit, on introduit la main droite en montant le long du côté gauche de la matrice, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre les pieds & les dégager, en les ramenant sur la poitrine de l'enfant même, comme on l'a prescrit pour la première position de l'épaule droite. Lorsque c'est le côté gauche, on intro-

Lorsque c'est le côté gauche, on introduit la main gauche en montant vers la fosse iliaque droite, pour dégager les pieds, comme à l'occasion de la première

position de l'épaule gauche.

D. Comment doit-on procéder à l'accouchement dans la seconde position du côté & de la hanche?

R. Dans la feconde position du côté droit, on doit introduire la main gauche en montant vers la partie latérale droite de la matrice, & en la recourbant un

peu vers le dessus du pubis, jusqu'à que l'on soit parvenu aux genoux de l'es fant, & de-là sur les pieds; pour les estraîner ensemble, ou l'un après l'autre comme à l'occasion de la seconde potion de l'épaule droite.

Lorsque c'est la hanche qui se présent le contenter d'accrocher l'agenoux, & de les entraîner; parce que est alors difficile de dégager les pieds s

premier lieu.

Quand c'est le côté ou la hanche gauch qui se présente, on introduit la ma droite en suivant le côté gauche de la m trice, pour parvenir aux pieds, ou au genoux de l'enfant, & les dégager; comm on l'a fait pour la seconde position ( l'épaule gauche.

D. Comment doit-on procéder à l'accor chement dans la troissème position du côté c

de la hanche?

R. Lorsque c'est le côté droit qui présente, on doit introduire la main droité en la passant au-dessous de l'ensant même en dirigeant les doigts le long de la partipostérieure de la matrice, & un peu ver le côté droit de la femme, jusqu'à ce qu'i soient parvenus sur la hanche, la cuisse le genou; d'où on ira prendre les pieds pour les dégager, en observant tout caqui a été prescrit à l'occasion de la trossième position de l'épaule droite.

fur l'Art des Accouchemens. 503

Si la hanche même se présentoit, il suffiroit de prendre les genoux, alors trèsprès du déssoit supérieur, & appuyés sur

la partie postérieure de la matrice.

Lorsque c'est le côté gauche qui se préfente dans la troissème position, si les eaux de l'amnios sont évacuées depuis long-temps, il faut aller chercher les pieds, en introduisant la main gauche sous la partie satérale droite & antérieure de la matrice, comme on l'a recommandé pour la troissème position de l'épaule gauche.

Si c'est la hanche gauche qui se préfente, on avancera la main gauche vers la sosse iliaque droite, jusqu'à ce que les doigts puissent embrasser les pieds & les fesses de l'enfant, de manière à entraîner le tout au détroit supérieur, pour ne tirer

dès-lors que sur les pieds.

On peut aller prendre les pieds de la même manière dans la troisième position de l'un & l'autre côtés, ainsi que de la hanche droite, lorsqu'on opère l'accouchement au moment de l'ouverture de la pache des gauxs

poche des eaux.

D. Comment doit - on procéder à l'accouchement dans la quatrième position du côté

ou de la hanche?

R. Dans cette quatrième position, soit du côté droit, soit du côté gauche, si les eaux de l'amnios ne sont que de s'écouler, on introduira la main droite

en montant vers la fosse iliaque gauche sur laquelle les fesses & les pieds se trouvent appuyés : on entraînera toutes ce parties au détroit supérieur, pour ne dés

gager ensuite que les pieds.

Quoique les eaux soient évacuées depuis long-temps, on pourra se conduire encor de cette manière, si c'est l'une des hans ches qui se présente dans la position assignée; parce que les sesses & les piede sont alors très-près du détroit supérieur; mais on pourroit y rencontrer de grandes difficultés, si c'étoit l'un des côtés.

Lorsque c'est le côté droit qui se présente, il vaut mieux introduire la main droite, en montant vers le devant de la fosse iliaque gauche, & sous la partie antérieure de la matrice, pour dégager les pieds, comme à l'occasion de la quatrième position de l'épaule droite. Lorsque c'est les côté gauche, on avancera la main gauche au-dessous de l'ensant même, en suivants la partie postérieure & latérale gauche du la matrice, pour dégager les pieds, comme on l'a fait à l'occasion de la quatrièmes position de l'épaule gauche.







## CHAPITRE VI.

De la grossesse & de l'accouchement de plusieurs enfans; de l'avortement ou fausserouche; du faux travail & des fausses grossesses.

## ARTICLE PREMIER.

De la grossesse & de l'accouchement de plusieurs enfans.

D. DE combien d'enfans la femme peutelle être enceinte à la fois, & comment désigne-t-on ces enfans?

R. Il existe beaucoup d'exemples de grossesses composées de deux enfans; quelques-uns de grossesses de trois enfans; mais à peine un seul bien constaté de quatre enfans. On se sert du mot de jumeaux, de tri-jumeaux, de quadri-jumeaux, pour désigner le nombre d'enfans portés à la fois dans le sein de la semme.

D. Quand il existe plusieurs ensans, ontils été conçus en même temps?

R. Le plus souvent ils sont le fruit d'une seule & même conception; en admettant

la proposition contraire, il faudroit con-venir que ces ensans ont été conçus à des époques très-rapprochées, comme dans le cours de la même heure ou du même jour; ce qui ne s'accorde pas avec l'opinion la plus générale. Quelquefois cependant les jumeaux ont été conçus à des époques plus éloignées, même à plusieurs mois de distance, & la semme en est accouchée à des intervalles également marqués. La possibilité de la supersétation est établie sur des faits si positifs, qu'on ne peut en douter; mais on ne convient pas encore qu'une femme, qui n'a qu'une seule matrice, & qui est déjà grosse, puisse concevoir un second enfant, ou un troisième, &c.; parce qu'il n'est pas démontré que cet organe n'étoit pas double dans les cas où la supersétation a eu véritablement lieu : l'on connoît plusieurs exemples d'une pareille conformation.

D. Dans la grossesse composée, chacun des enfans a-1-il ses enveloppes particulières & son

placenta distinct?

R. Le plus souvent il ne paroît y avoir qu'un seul placenta pour les jumeaux; ou les deux arrière-faix sont tellement rapprochés, même réunis, qu'ils semblent ne former qu'une seule masse, de laquelle naissentautant de cordons qu'il y a d'enfans. Dans ce même cas, il n'y a aussi qu'une seule membrane appellée chorion; mais

fur l'Art des Accouchemens. 507 presque toujours chaque sœtus est dans une poche particulière sormée par la membrane amnios, de sorte que les eaux qui baignent la surface de l'un, ne peuvent mouiller la surface de l'autre.

Quelquefois il s'est trouvé autant de placenta qu'il y avoit d'ensans, & dans le cas même où il n'existoit qu'une seule membrane appellée chorion. On a vu également chez d'autres semmes, que chaque sœtus avoit son placenta, son chorion, son amnios & ses eaux. Ensin, l'on a observé que les jumeaux étoient rensermés dans une seule & même poche, de sorte qu'ils étoient baignés par les mêmes eaux.

D. Les jumeaux se développent ils également, prennent - ils le même accroissement, présentent-ils la même force, la même grofseur, au terme de la naissance; & sont - ils

toujours de même sexe?

R. En général, les jumeaux sont plus petits au terme de la naissance, qu'un ensant qui a été porté seul, le même espace de temps; toutes choses étant égales d'ailleurs, du côté de la santé & de la constitution de la mère. On observe de plus qu'un des jumeaux est un peu plus gros & plus sort que l'autre.

Le plus fouvent les jumeaux sont de même sexe; mais l'on a vu naître aussi un garçon & une fille; conséquemment des enfans de l'eur & l'eutre seves

des enfans de l'un & l'autre sexes.

D. Un des jumeaux ne peut-il pas mourir avant le terme de la naissance, & exposer, par son voisinage, la vie du second enfant?

R. Un des enfans peut mourir en effet, même se putrésier long-temps avant l'accouchement; mais, quoique mort & même putrésié, il n'influe pas toujours sur le développement du second. L'on a vu naître dans le même moment un enfant bien portant & un autre putrésié à l'excès. Quelquesois ce dernier paroissoit du même terme que le premier; d'autres sois il ne sembloit que du terme de sept mois, de six, & même au dessous. Mais ces jumeaux étoient dans des poches particulières formées par la membrane amnios, de sorte qu'ils ne pouvoient se toucher immédiatement, ni être baignés par les mêmes eaux.

On a vu des femmes avorter d'un enfant mort à un terme quelconque de la grossesse, & porter l'autre enfant jusqu'à l'époque du neuvième mois.

D. La semme qui est enceinte de plusieurs enfans, les porte-t-elle jusqu'à l'époque du neuvième mois?

R. Il est rare que la durée de ces sortes de grossesse soit parfaitement égale à celle d'une grossesse ordinaire; la plupart des femmes accouchent alors vers le milieu du neuvième mois, & quelques-unes même

fur l'Art des Accouchemens. 509 un peu plutôt, fans qu'aucune caufe étrangère à la grossesse puisse être soupçonnée d'y contribuer.

D. Quel est celui des jumeaux qui est

l'ainé?

R. On accorde ce titre à celui des enfans qui vient au monde le premier, quoique le commun des hommes se perfuade encore que cet enfant a été conçu le dernier.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des signes de la grossesse composée de plusieurs enfans.

D. PEUT-ON reconnoître avant le moment de l'accouchement, s'il existe plusieurs enfans?

R. Les signes qui dénotent l'existence de plusieurs enfans sont on ne peut plus obscurs avant les six ou sept premiers mois de la grossesse. On ne peut que le présumer d'après le volume extraordinaire du ventre; sa division en deux tumeurs, par la dépression superficielle de la ligne blanche; ainsi que des mouvemens qui se passent dans la matrice, & souvent en plusieurs endroits à la sois: mais après le sixième, & sur-tout le septième mois, le toucher peut nous faire connoître, chez quelques semmes, s'il y

¥ 11]

a plusieurs enfans ou un seul. Si l'on ne peut encore introduire le doigt dans l'orifice de la matrice, à cette époque, on recherche en palpant aux environs de cet orifice, quelle est la partie que l'enfant présente au détroit supérieur; si c'est la tête, on remarque quelle en est à-peu-près la grofseur & la mobilité; on l'agite un peu au moyen du doigt, tandis que de l'autre main placée à l'extérieur, on palpe le ventre, pour reconnoître le lieu où se trouvent les fesses & les pieds de ce même enfant, ce qu'on distingue en certains cas avec une facilité étonnante. Il existe plusieurs enfans, quand la tête qui se pré-fente en en bas, est petite, peu mobile, & comme sixée sur l'entrée du bassin; quand le ventre de la semme est en même temps volumineux, la matrice sort élevée & très-large d'un côté à l'autre; quand la femme éprouve de fréquens mouvemens, mais obscurs, comme gênés, & en divers endroits à la fois.

S'il n'y avoit qu'un enfant dans une matrice aussi spacieuse, & un ensant aussi petit que nous l'annonçons, il y seroit extrêmement mobile; on l'agiteroit aisément au moyen du doigt porté dans le vagin, & la semme en éprouveroit des mouvemens très étendus & très-libres; parce que cet ensant seroit alors au milieu

fur l'Art des Accouchemens. 511 d'une masse d'eau considérable, relativement à son volume.

On distingue quelquesois les deux enfans en palpant le ventre de la semme.
S'il est possible de se tromper en quelques
cas d'après l'ensemble de ces signes, on
ne peut du moins conserver de doute au
temps de l'accouchement. Quand il existe
plusieurs ensans, le ventre de la semme
reste très-gros après la sortie du premier;
la matrice s'élève encore au dessus de
l'ombilic, & présente, toutes proportions
gardées, autant de largeur d'un côté à
l'autre, que de hauteur: le doigt porté dans
l'orisice même de ce viscère, fait alors reconnoître évidemment l'existence du second
ensant.

#### SECTION II.

De la manière dont s'opère l'accouchement lorsqu'il y a plusieurs enfans; & de ce que doit faire l'Accoucheur dans tous ces cas.

D. COMMENT s'opère l'accouchement, dans le cas où il existe plusieurs enfans?

R. Le plus fouvent il s'opère aussi naturellement que s'il n'y avoit qu'un seul enfant; parce que les jumeaux se présentent successivement, & dans une bonne

Y iv

position, à l'orifice de la matrice. On remarque seulement que la sortie du premier se fait un peu plus lentement, toutes choses égales d'ailleurs, que celle d'un enfant qui seroit seul dans la matrice.

L'expulsion du second enfant, quand il est bien tourné, exige peu d'efforts de la part de la femme; parce que le premier lui a préparé la voie. Il est rare que la sortie de ce second enfant tarde au delà d'une demi-heure; & le plus souvent la femme n'éprouve que deux ou trois douleurs pour s'en délivrer.

Si l'on a vu un second enfant demeurer plusieurs jours dans le sein de sa mère après la fortie du premier, c'est parce qu'il étoit situé de manière à ne pouvoir venir seul; c'est parce qu'on ne l'a point reconnu, & qu'on a pris les douleurs que la semme éprouvoit pour de simples tranchées de couches.

D. L'accouchement peut-il s'opérer naturellement, toutes les fois qu'un des jumeaux se présente bien à l'orifice de la matrice?

R. Non: il arrive quelquefois qu'il ne peut s'opérer de cette manière, parce que le second enfant est placé de saçon qu'il s'oppose en quelque sorte à l'action immédiate de la matrice sur le premier (a).

<sup>(</sup>a) Nous pourrions rapporter ici des observations intéressantes, en preuve de ce que nous avançons.

Sur l'Art. des Accouchemens. 513

D. Que faudroit-il faire si l'enfant, quoique bien situé, s'engageoit peu, malgré la force des douleurs, ou s'il cessoit d'avancer

après s'être engagé?

R. Il faut extraire cet enfant après le délai convenable, pour s'affurer qu'il ne peut fortir naturellement. On se servira du forceps, si la tête est très-basse; on dégagera les pieds, si ce sont eux qui se présentent; on accrochera les hanches au moyen de l'index de l'une & l'autre mains, si ce sont les sesses qui ont été poussées en avant; on se conduira ensin, dans tous ces cas, comme si l'enfant étoit seul dans la matrice.

D. Que doit-on faire dans ces mêmes cas

après la sortie du premier enfant?

R. On doit s'assurer de la manière dont le second se présente à l'orifice de la matrice, & le laisser venir naturellement, s'il se présente bien; se bornant alors à solliciter les contractions de la matrice, en faisant des frictions sur le ventre de

la femme, au moyen d'une main.

Lorsque le second enfant se présente en mauvaise situation, on doit le retourner; mais après en avoir dégagé les pieds. on attendra, pour l'extraire, que la matrice se soit bien contractée, & que la temme éprouve de nouvelles douleurs; afin de prévenir l'affaissement de ce viscère, & d'empêcher qu'il ne tombe dans une sorte

Principes d'inertie; suite assez ordinaire d'un accouchement trop prompt.

D. Que faudroit - il faire, quand il y a plusieurs enfans, si le travail de l'accouche-

ment étoit compliqué d'accidens?

R. Il faudroit opérer l'accouchement comme on l'a prescrit en faisant mention de ces mêmes accidens.

D. Indiquez-nous quelques-unes des positions que les jumeaux peuvent prendre, soit à l'égard de l'orifice de la matrice, soit res-

pectivement l'un à l'autre.

R. 1°. Les jumeaux peuvent présenter la tête au détroit supérieur; mais celle de l'un ne peut alors s'engager dans ce détroit, qu'autant que celle de l'autre s'en écarte, en remontant vers l'une des fosses iliaques. Quand elles sont pressées également sur la marge du bassin, aucune ne peut s'engager, & l'accouchement devient impossible sans les secours de l'Art.

est quelquesois telle, qu'ils se croisent de manière que la tête de l'un se trouve appuyée sur le bas de la fosse iliaque gauche, tandis que les fesses & les pieds répondent à la partie latérale droite de la matrice; la tête du second sur le bas de la fosse iliaque droite, & les fesses ainsi que les pieds sous le côté gauche de la matrice.

sur l'Art des Accouchemens. 515
3°. Un des enfans peut présenter la tête convenablement, & l'autre les deux pieds,

ou bien un seul.

4°. L'un d'eux peut offrir la tête, tandis que le second sera couché transversalement sur la partie postérieure, ou sous la partie antérieure de la matrice.

5°. L'un peut présenter les fesses, tandis

que le suivant présentera la tête.

6°. Quelquefois le premier présente le bras, ou toute autre partie, & le second s'avance dans la suite convenablement, pour qu'il puisse sortir sans aucun secours.

7°. L'un & l'autre peuvent présenter les pieds en même temps à l'orifice de la matrice; ou bien ils se succéderont dans

cette position.

8°. Le cordon ombilical de l'un peut fortir à l'instant de l'ouverture de la poche des eaux, & l'autre se présenter de manière à venir le premier, &c.

D. Dites nous comment on doit proceder

à l'accouchement dans tous ces cas?

R. Quelle que soit la cause qui s'oppose à la fortie du premier enfant, lorsque la tête a été poussée jusqu'au fond du bassin, il faut opérer l'accouchement comme nous l'avons déjà dit plus haut. Mais l'on ne doit retourner l'enfant, en pareils cas, qu'autant qu'on ne peut se procurer le forceps, & quelqu'un qui sache l'appliquer.

Y vi

1°. Lorsque les jumeaux présentent la tête dans le voisinage du détroit supérieur, de manière que celle de l'un s'oppose à la descente de celle de l'autre, il faut essayer d'en écarter une de ce détroit; & fi l'on ne peut y parvenir, on ira prendre les pieds de l'un de ces enfans, on le retournera, & l'on en fera l'extraction à l'ordinaire. On aura l'attention seulement de n'extraire ce premier enfant que dans l'intervalle des douleurs, & de recommander à la femme de ne faire alors aucun effort, dans la crainte que la tête du second, déjà dans le voifinage du détroit supérieur, ne soit poussée en avant, ou qu'elle ne soit comme entraînée par l'autre, de manière à s'opposer sortement à sa fortie.

Si le fecond enfant, après l'issue du premier, se présente bien, on le laissera venir; s'il se présente mal, on l'amenera

par les pieds.

2°. Lorsque les jumeaux se croisent dans la matrice, de manière que la tête de l'un & l'autre se trouve appuyée sur les sosses iliaques, il faut aller prendre les pieds de celui qui est en dessous, le retourner & l'extraire avec les précautions recommandées précédemment.

L'on se conduira dans la suite, à l'égard du second, selon la manière dont il se

présentera.

fur l'Art des Accouchemens. 517
3°. Quand l'un des enfans présente la tête & l'autre les pieds, il faut se conduire différemment, selon que ces derniers seront plus ou moins engagés. On repoussera ces extrémités, le plus qu'on pourra, sur l'une des fosses iliaques, s'ils se présentent simplement à l'orifice de la matrice, pour que la tête de l'autre enfant puisse s'engager librement & sortir. Mais si ces mêmes extrémités étoient à la vulve, & la tête de l'autre enfant très-éloignée, il faudroit les dégager, & extraire cet enfant en premier lieu, après avoir repoussé sa tête de l'autre.

4°. On laissera venir l'enfant dont la tête se présente; & on retournera le second, pour l'amener par les pieds, s'il se trouve dans la suite placé transversalement sur

le détroit supérieur.

5°. Quand l'un des enfans présente les fesses, si elles sont très-engagées, on les accrochera d'un doigt légérement recourbé sur le pli des aînes, comme on l'a recommandé ailleurs; ou bien on ira chercher les pieds, si elles ne peuvent descendre à ce point. Mais on laissera aux soins de la nature, l'expulsion du second enfant, s'il se présente bien.

6°. Lorsqu'un des enfans présente le bras, au point que la main soit au dehors, il faut le retourner & l'amener par les pieds; à moins que la tête de l'autre ne


Le foit profondément engagée en même temps que ce bras; car il faudroit alors laisser venir cette tête, ou l'extraire avec Le forceps, si elle ne pouvoit sortir.

7°. Quand l'un & l'autre jumeaux présentent les pieds en même temps, trouvant alors trois ou quatre de ces extrémités à l'orifice de la matrice, il faut
s'assurer, avant de ne rien entreprendre,
si elles appartiennent à un ensant monstrueux, comme l'on en connoît des
exemples, ou bien à deux jumeaux ordinaires. Quand toutes ces extrémités appartiennent à un ensant monstrueux, on les
dégage à la sois; mais lorsqu'elles appartiennent à deux ensans, il ne saut dégager
que les pieds de celui qu'on doit extraire
en premier lieu, & repousser ceux du
second ensant.

8°. Il est assez difficile de reconnoître si le cordon qui s'est précipité au dehors, à l'instant de l'ouverture de la poche des caux, appartient au jumeau qui a commencé à s'engager, ou à l'autre: mais voici quelques règles de conduite relativement

à l'accouchement.

Si la tête de l'un de ces enfans se trouve très-avancée, & disposée à sortir promptement, on la laissera venir, quel que soit celui des ensans à qui appartient le cordon qui est au dehors; mais on sera l'extraction de cette tête, au moyen du





Pl.xxvIII.

pag . 51 8 .





sur l'Art des Accouchemens. 519 forceps, si elle ne peut venir naturellement & aussi promptement; pour se comporter ensuite à l'égard du second enfant, selon la manière dont il se présentera. Lorsqu'aucun des enfans ne paroît disposé à sortir, à l'instant où le cordon s'échappe, il faut aller prendre les pieds, & retourner celui à qui appartient ce cordon, &c. (a).

# ARTICLE II.

De l'avortement.

D. Qu'entendez-vous par avortement?
R. L'avortement est l'expulsion du fœtus & de ses dépendances avant le terme de sa maturité; c'est-à-dire, avant qu'il ne soit assez fort & assez développé, pour continuer de vivre après sa naissance, quelques soins qu'on donne alors à sa conservation. Tout accouchement qui se fait avant le septième mois de la grossesse, est un avortement.

D. Le mot de fausse-couche signifie-t-il autre chose que le mot avortement?

(b) Les Planches XXVII & XXVIII représentent les jumeaux dans la position où ils se trou-vent le plus souvent, respectivement l'un à l'autre,

<sup>(</sup>a) L'on a exposé ailleurs les préceptes qui font relatifs à la délivrance après l'accouchement de plusieurs enfans. Voyez le Chapitre de la Délivrance, page 264.

R. Ces deux mots expriment la même chose. Une sausse-couche est un avortement: c'est l'expulsion d'un sœtus qui n'est point à terme. Dans le langage commun, on présère le mot fausse-couche à celui d'avortement, qui semble affecté plus spécialement à l'espèce des brutes. L'expulsion d'une môle, de ces masses d'hydatides, de ces amas de sang ou d'eau, qui constituent les sausses grossesses dont nous parlerons ci-après, doit également s'exprimer par le mot sausses.

## SECTION PREMIÈRE.

Des causes & des signes de l'avortement.

D. INDIQUEZ-NOUS les causes qui peuvent donner lieu à l'avortement?

R. Ces causes sont en grand nombre:

les unes proviennent de l'ensant même,

les autres de la mère, & il y en a qui

font purement accidentelles.

Les maladies dont l'enfant peut être affecté avant sa naissance, & qui peuvent influer alors sur sa vie, doivent être regardées comme autant de causes éloignées de l'avortement; parce que la matrice irritée par la présence d'un enfant mort, ne tarde pas à faire des essorts pour l'expulser.

Les maladies aiguës ou chroniques de

Sur l'Art des Accouchemens. 521
la femme peuvent également donner lieu à l'avortement, soit en influant sur la vie de l'enfant, soit en troublant l'ordre du développement de la matrice.

La ténuité des enveloppes du fœtus est fouvent une autre cause d'avortement; parce que ces enveloppés se déchirent aux moindres efforts, & laissent échapper les eaux quelquesois long-temps avant le terme

de la maturité de la grossesse.

La foiblesse organique, l'extrême rigidité, & l'excès de sensibilité de la matrice, produisent également l'avortement.

L'abus des plaifirs de l'amour en est une cause beaucoup plus ordinaire. Les passions désordonnées, l'exercice sorcé, les courses à cheval, le cahot des voitures, la danse, le chant, le rire immodéré, ainsi que les coups, les chûtes, & les essorts inconsidérés pour aller à la garderobe, peuvent également provoquer l'avortement. Nous ne développerons pas ici la manière d'agir de chacune de ces causes; parce que cette explication seroit inutile pour des Sages-semmes.

D. Quels sont les symptomes qui dénotent

qu'une semme est menacée d'avorter?

R. Quelquéfois le travail de l'avortement se déclare sans qu'aucun symptome n'ait annoncé qu'il étoit à craindre, ou que la semme en étoit menacée. D'autres sois, & c'est le cas le plus ordinaire, la semme

ressent auparavant une sorte de lassitude dans toute l'habitude du corps, de pesanteur & de douleurs dans les membres: son pouls est fréquent, élevé, dur, irrégulier, & comme fébrile; le visage est: comme décomposé, les yeux paroissent : enfoncés, & les paupières comme livides; la femme se plaint d'une pesanteur dans le fond du bas-ventre, au-dessus de l'anus, accompagnée d'un tiraillement douloureux vers les lombes & les aînes; les mouvemens de l'enfant deviennent plus fréquens, ou plus obscurs, ou bien la semme n'en ressent aucun, si ce n'est une espèce de ballottement; il se maniseste un écoulement glaireux, quelquefois féreux & roufseâtre, d'autres fois de sang pur; enfin il survient des douleurs semblables à celles de l'accouchement. Ces derniers fymptomes dénotent un avortement prochain; & l'ensemble des autres annonce seulement que la femme en est menacée.

- D. L'avortement a-t-il lieu toutes les fois que quelques-uns de ces symptomes se manifestent?
- R. Non: l'on a vu des femmes perdre du fang abondamment, même à diverses reprises, & éprouver une longue suite de douleurs, soit avec perte, soit sans perte, & ne point avorter. On peut espérer que l'avortement n'aura pas lieu, si l'orisice

de la matrice reste sermé malgré la continuité des douleurs; si le col de ce viscère ne perd rien de sa longueur; si les mouvemens de l'ensant continuent de se saire sentir, &c. L'on est parvenu quelques à rétablir le calme, quoique le travail de l'avortement eût été plus avancé; puisque le col de la matrice étoit assez dilaté pour permettre d'y porter librement le doigt, & que la poche des eaux commençoit à s'y engager.

#### SECTION II.

Des moyens de prévenir l'avortement; & des fecours qu'on doit donner à la femme dans le temps même où il se fait.

D. QUELS sont les moyens de prévenir

R. Rien ne fauroit empêcher l'avortement, lorsqu'il a pour cause éloignée, les maladies aiguës ou chroniques de la semme; parce qu'on ne peut empêcher que ces maladies n'influent quelquesois sur la grossesse.

Il est également impossible de s'opposer à l'avortement, lorsqu'il a pour cause les maladies & la mort de l'enfant. Mais un bon régime, un exercice modéré, les bains froids, long-temps continués avant

524 Principes

& même pendant la grossesse, l'ont sous de vent prévenu, lorsqu'il n'avoit pour cause péloignée, que la foiblesse des organes de la femme; & au moyen de ce régime, de bien des femmes, après plusieurs fausses-couches, ont porté leurs enfans jusqu'au uterme ordinaire.

Le régime hume chant, les bains chauds, des petites faignées répétées à propos, ont procuré le même avantage aux femmes; qui avoient la matrice extrêmement irri-

table & fensible.

L'avortement pouvant être la suite des grandes passions de l'ame, d'un exercice pénible, de la gêne occasionnée par des habits trop serrés, de grands efforts pour aller à la garde-robe, &c., des efforts du vomissement & de la toux; on le préviendra en éloignant toutes ces causes, & en modérant celles qu'on ne peut détruire entiérement.

D. Quels sont les moyens de s'opposer à l'avortement, quand quelques - uns de ses symptomes avant-coureurs se sont déjà ma-

nifestés?

R. Lorsque la grossesse a été vivement ébranlée par quelque cause que ce soit, on sera garder le repos à la semme, on lui prescrira des boissons tempérantes & des potions calmantes; & on lui sera observer un régime analogue. On lui tirera quelques palettes de sang du bras, si le

sur l'Art des Accouchemens. 525 pouls est plein & accéléré; si elle ressent de la douleur dans le bas-ventre, de la pesanteur vers le fond de cette cavité, au-dessus du fondement; si les mouvemens de l'enfant font devenus plus obscurs, s'ils font une impression douloureuse, s'il existe un écoulement féreux ou fanguinolent, qui menace d'augmenter, &cc.

D. Quels sont les secours qu'on doit donner à la femme, dans le temps même de l'avorte-

ment?

R. Ces secours doivent être dissérens; selon les circonstances qui peuvent compliquer l'état de la femme, & selon le terme de la grossesse auquel se fait l'avortement.

L'expulsion du fœtus & de l'arrièrefaix doit être confiée aux soins de la nature, toutes les fois qu'il n'existe pas d'accidens alarmans; tels qu'une hémor-

rhagie, des convulsions, &c.

Lorsque la femme n'éprouve que les douleurs inféparables des contractions de la matrice, fans lesquelles l'expulsion du fœtus & de l'arrière faix ne fauroit s'opérer, on attend patiemment; on évite de porter le doigt trop fréquemment à l'orifice de la matrice, comme le font la plupart des Sages-semmes, dans l'espoir de le dilater; & l'on s'abstient plus soigneusement encore d'ouvrir la poche des eaux, dès qu'elle commence à se former à travers cet orifice; car on retarderoit fouvent de beaucoup la délivrance, en touchant fréquemment, & en faisant écouler les eaux prématurément. On doit fe rappeller qu'il en coûte moins d'efforts à la nature, pour expulser la totalité du produit de la conception à la fois, & comme en une seule masse, avant le troisième mois de la grossesse, que pour le faire en détail, comme dans l'accouchement ordinaire.

Quand la poche des eaux se déchire de trop bonne heure, dans l'avortement qui se fait avant le troisième mois de la grossesse, ce fluide & le fœtus sont expulsés aussi-tôt, & l'arrière-faix, beaucoup plus gros, ne peut sortir qu'après un nouveau travail, toujours d'autant plus long, que l'orisice de la matrice se sera plus resservés après l'ouverture de la poche des eaux (a).

Lorsque l'avortement n'a lieu qu'après les quatre ou cinq premiers mois de la grossesse, il faut se comporter auprès de la femme, comme dans l'accouchement à terme; tant pour ce qui regarde la sortie de l'enfant même, que pour celle de

l'arrière faix.

D. Quelles sont les suites les plus ordinaires de l'avortement?

<sup>(</sup>a) Voyez p. 260 & suiv.

fur l'Art des Accouchemens. 527
R. Ces suites différent peu de celles d'un accouchement à terme; il y a, comme après celui-ci, des lochies rouges, puis séreuses & sanguinolentes, enfin blanchâtres ou laiteuses.

Le sein se tumésie du deuxième au troisième jour, & quelquesois plus tard; mais cette révolution ne manque presque jamais de se faire, quelle que soit l'époque de la grossesse à laquelle l'avortement ait lieu: ce qui doit engager la semme à se conduire, dans ce cas, comme dans celui de l'accouchement ordinaire.

#### ARTICLE III.

Du faux travail.

D. Qu'ENTEND-ON ordinairement par faux travail?

R. On désigne ainsi une suite de douleurs plus ou moins longues, & assez se semblables à celles de l'accouchement, pour faire craindre qu'il n'en soit le rést sultat.

Si toutes ces douleurs se sont sentir dans le bas-ventre, & à des intervalles marqués, comme les vraies douleurs de l'accouchement, elles ne proviennent pas toutes de la même cause. Les unes dépendent réellement des efforts que la matrice

fait à contre-temps pour expulser l'enfant; & les autres ne sont que des douleurs de colique intestinale, de colique hépatique ou néphrétique.

D. Quelles sont les causes qui psuvent donner lieu à ces différentes espèces de douleurs?

R. Les coliques intestinale, hépatique, & néphrétique, dépendent en général de la fabure des entrailles, de la rétention de la bile dans ses propres couloirs, de la présence d'une pierre dans la vésicule du fiel, dans les reins, dans l'un des uretères, ou dans la vessie même, &c. Ces maladies exigent toute la sagacité du Chirurgien, ou du Médecin; & le traitement en est étranger aux Sages-semmes.

Les douleurs qui dépendent des contractions de la matrice, fouvent ne font : que l'effet d'une affection spasmodique de ce viscère même, & se combattent par l'usage des bains, des potions calmantes, &c. D'autres sois elles proviennent de la plénitude des vaisseaux, & exigent une saignée, & même deux; ensin elles peuvent être la suite de quelques-unes des causes qui provoquent l'avortement.

D. Comment distinguera-t-on les douleurs qui dépendent de l'affiction spasmodique de la matrice, ou des contractions de ce viscère, d'avec les dissérentes espèces de coliques dont qui vient de faire mention?

R.

Sur l'Art des Accouchemens. 529 R. Les douleurs de coliques intestinales n'ont point de siège fixe; si elles affectent un point du bas-ventre dans un instant, aussi tôt après elles se sont sentir dans un autre lieu. Les douleurs hépatiques ont leur siège sous les fausses-côtes du côté droit, & les néphrétiques vers l'un ou l'autre côté des lombes, &c. Les douleurs qui proviennent de l'action de la matrice se font sentir dans l'espèce de globe que présente ce viscère. Ce globe se durcit pendant ces mêmes douleurs, & redevient plus fouple enfuite; si ces douleurs continuent, l'orifice de la matrice ne tarde pas à s'entre - ouvrir & la poche des eaux se forme, de manière que tous les symptomes de l'accouchement paroissent successivement. Dans les autres espèces de douleurs, aucuns de ces symptomes ne se manisessent. Voyez p. 161 & Suiv.

D. Quel jugement doit-on porter de ces différentes espèces de douleurs, relativement à

la grossesse?

R. On doit craindre, dans tous les cas, qu'elles ne provoquent l'avortement ou l'accouchement prématuré; & la femme en est sur-tout ménacée, quand ces dou-leurs tiennent à l'action de la matrice. Il convient donc d'en rechercher la cause, & de s'efforcer de les calmer par un traitement convenable.

#### ARTICLE IV.

Des sausses grossesses, de leurs signes & de leurs suites.

D. Qu'ENTENDEZ-VOUS par fausses

grossesses?

R. On appelle fausses grossesses, celles qui sont produites par des substances qui ne présentent aucunes traces ni aucuns débris du sœtus. Ces substances paroîtront de deux sortes, soit qu'on les considère relativement à leur nature, ou à leur origine; car les unes sont solides, & les autres plus ou moins sluides; les unes sont le produit de la conception, & les autres, indépendantes de celle-ci.

D. Comment appellez-vous ces substances que vous regardez comme le produit de la conception; & quelles sont celles qui y sont

étrangères?

R. On désigne les premières sous le nom de môle ou de faux-germe; & les autres sont de l'eau, du sang ou des humeurs glaireuses : quelquesois ce n'est que de l'air retenu & rarésié dans la matrice.

D. Qu'entendez-vous par môle?

R. C'est une espèce de masse, pour l'ordinaire, en apparence charnue, qui n'a d'autre forme que celle du lieu où elle s'est développée, & de l'espèce de silière à travers laquelle elle a passé en sortant de la matrice. Quelquesois la môle n'est qu'un amas consus de petites vessies remplies d'eau, & attachées par un pédicule extrêmement délié, à une base qui paroît de la même nature que le placenta: on nomme ces petites vessies hydatides, & l'espèce de masse qui en résulte, môle en grappe, par rapport à sa ressemblance, quoiqu'imparsaite, avec une grappe de raissins ou de grosses groseilles. Il y a donc des môles qui sont comme charnues, & d'autres vésiculaires.

D. Peut-on expliquer la formation de ces sortes de môles; & le germe en existe-t-il in-dépendamment des substances qui rejultent or-

dinairement de la conception?

R. Il est assez difficile d'expliquer la formation de ces différentes espèces de môles; mais on peut assurer que le germe n'en existe pas avant la conception. Ces substances ne prennent ce caractère qu'accidentellement; & quand on les examine attentivement, on y trouve les débris d'une bonne conception; il n'y manque que le sœtus, qui a été détruit dès les premiers temps de sa formation, & avant que ses parties n'eussent acquis assez de solidité pour se conserver. La môle qui est comme charnue, offre toujours une cavité tapissée de membranes, & le plus souvent remplie

Zij

Principes Principes

d'eau. Cette cavité est très-petite, quand l'embrion a été détruit dès les premiers temps de sa formation, quelle que soit la grosseur de la môle à l'instant où la nature l'expulse; elle est plus grande, lorsque l'embrion s'est détruit plus tard, comme au terme d'un mois & plus.

Quand le peu d'eau que contient cette cavité s'évacue à l'instant où l'embrion est frappé de mort, la môle s'affaisse en quelque sorte, sans se détacher de la matrice, & sans cesser de s'accroître; la cavité s'en oblitère & paroît à peine, quand on la recherche après l'expulsion de cette masse. Cette espèce de môle n'est donc, à proprement parler, que l'arrière faix qui a continué de végéter & de se développer après la mort de l'embrion; elle ne dissère du placenta, que parce que les vaisseaux ombilicaux n'y existent pas comme dans celui-ci.

D. La môle est-elle dissérente du faux-

R. La môle ne diffère pas de ce qu'on appelle assez souvent faux-germe. Ces dénominations expriment la même chose, & l'usage permet d'employer l'une ou l'autre. Il n'existe pas de faux-germe, si la forme & la consistance des môles ne sont pas toujours les mêmes; s'il y en a de plus soldes les unes que les autres, de plus sèches & de plus abreuyées de

fur l'Art des Accouchemens. 533 fluides, ces différences ne sont qu'accidentelles.

D. La môle est-elle d'une autre nature que le polype de la matrice?

R. Il existe une très grande différence entre le polype & la môle. Le polype est une excroissance, une végétation, un développement de la propre substance de la matrice, qui n'a d'autres racines que les vaisseaux & le tissu fibreux de ce viscère même. La môle au contraire, n'est liée à la matrice, que comme le placenta y est attaché dans une grossesse ordinaire, & n'a rien de commun avec la substance de ce viscère.

D. Quelle est la grosseur de la môle, & la durée du séjour qu'elle fait dans la matrice?

R. La môle peut acquérir plus ou moins de grosseur, selon qu'elle est d'une nature plus ou moins songueuse & humide, & le temps qu'elle séjourne dans la matrice. Celle qui est solide & comme charnue, acquiert moins de volume dans un temps déterminé, que celle qui est vésiculaire, & c. L'expulsion de ces môles se fait le plus ordinairement vers le troissème mois de la grossesse; mais elles peuvent cependant rester plus long-temps dans la matrice. Nous en avons vu qui y ont séjourné audelà du terme ordinaire d'une bonne grossesse.

D. Comment appelle-t-on les fausses grofsesses qui ne sont sormées que de fluides?

R. On appelle hydropisse de matrice, la fausse grossesse qui n'est formée que par de l'eau; tympanite de matrice, celle qui ne dépend que de l'air; & amas de sang, lorsqu'il n'y a que du sang mêlé d'humeur glaireuse.

### SECTION PREMIÈRE.

Des signes qui indiquent ces différentes espèces, de fausses grossesses.

D. QUELS sont les signes qui caractérisent une fausse grossesse?

R. Il n'y a point de signes qui puissent faire distinguer, dans les premiers mois; une sausse grossesse, de quelque espèce qu'elle soit, d'une grossesse ordinaire. L'une & l'autre, assez constamment, sont accompagnées de la suppression des règles, du gonssement du sein, de la sécrétion & de l'excrétion d'une humeur séreuse, plus ou moins jaunâtre ou blanchâtre, qu'on prend pour du lait; des nausées, du crachotement, du vomissement, &c. Dans l'un & l'autre cas, le ventre se tumésse, & il le fait souvent de très-bonne heure; de manière qu'il paroît aussi gros à deux

fur l'Art des Accouchemens. 535 mois, qu'il l'est fréquemment à cinq & à six, quand son volume ne dépend que de la dilatation de la matrice: ce qui provient alors du gonslement spasmodique des entrailles. Dans la fausse grossesse, comme dans la grossesse ordinaire, la semme ressent des mouvemens dans le bas-ventre, vers l'époque du quatrième mois, & quelquesois plutôt. Dans l'un de ces cas, ce sont les mouvemens de l'ensant; dans l'autre, ce sont des mouvemens histériques ou spasmodiques, qui ressemblent assez aux premiers, pour que les semmes même qui ont eu plusieurs ensans s'y trompent.

Le mouvement de ballottement, que quelques femmes disent éprouver dans le bas-ventre, quand elles s'agitent ou changent d'attitude, n'est qu'un signe fort illusoire de la présence d'une môle, quoique quelques Auteurs l'aient donné pour un signe certain. Si la fausse grossesse est quelques accompagnée d'un suintement séreux & sanguinolent; si les règles ont quelques sieu, quoique imparsaitement, dans cet état; les mêmes esses se remarquent assez souvent dans une bonne grossesse. Si les sausses grossesses ont des signes particuliers, ce sont des nuances imperceptibles, qu'on ne peut saisir que sort tard; & il est rare que les corps étrangers qui constituent ces espèces de grossesses séjournent assez long-temps dans la ma-

Z iv.

trice, pour que nous puissions prononcer

sans craindre de nous tromper.

D'après ces remarques, l'on voit avec quelle prudence la femme devroit se conduire dans le cas où elle se croit grosse, & où elle est menacée de fausse-couche: l'on voit avec quelle réserve on doit lui permettre l'usage de certains remèdes vantés pour hâter l'expulsion d'une môle, on de toutes autres espèces de corps étrangers contenus dans la matrice. Il ne faut user de ces remèdes dans aucun cas, puisqu'on ne peut être certain dans aucun, qu'il n'existe qu'une môle.

#### SECTION II. -

De l'expulsion de la môle & des autres substances qui constituent la fausse grossesse.

D. COMMENT s'opère, en général, l'ex-pulsion des substances qui constituent les fausses grossesses?

R. La fausse grossesse, qui ne dépend que de la présence de l'air, ou de l'eau retenus dans la matrice, se termine plutôt ou plus tard, & toujours sans de grands efforts de la part de la nature : cette maladie d'ailleurs est extrêmement rare, & elle exige toute l'attention du Médecin.

La fausse grossesse qui provient d'un

fur l'Art des Accouchemens. 537
amas de fang, peut exiger les fecours de la Chirurgie; en ce qu'elle peut avoir pour cause éloignée, l'obturation de l'orifice de la matrice, ou du vagin: cette obturation peut être accidentelle, ou de première conformation.

La fausse grossesse dépendante d'une môle, quelle qu'en soit l'espèce, ne demande pas d'autres soins que ceux qu'on accorde à la semme dans une grossesse ordinaire; & la nature se délivre de ce corps étranger, comme elle se délivre d'un ensant & de son arrière saix. Il s'établit, pour l'expulsion de la môle, un travail semblable à celui de l'accouchement; si ce n'est, peut-être, qu'il est un peu moins douloureux pour la semme. Les contractions répétées de la matrice, en dilatent l'orisice, détachent la môle & l'expulsent, avec essus de la moins grande de sang.

D. Quels sont les secours qu'on doit donner

à la femme pendant ce travail?

R. Elle n'a besoin pour l'ordinaire, d'aucun secours : elle doit attendre patiemment l'expulsion du corps étranger, lorsqu'il n'existe pas d'accidens. Mais si le travail nécessaire à cet esset, étoit précédé ou accompagné d'une perte abondante, il faudroit recourir aux moyens proposés contre cet accident; il faudroit hâter l'expulsion de la môle, & même en faire l'extraction,

 $Z_{v}$ 

fi la chose étoit possible; comme on a recommandé de procéder à celle de l'arrière-saix du tœtus abortif. Voyez p. 261 & suiv.

D. Quelles sont les suites de ces espèces

de fausses-couches?

R. Elles ne sont pas différentes de celles de l'avortement. La semme éprouve, après l'expulsion d'une môle, les mêmes évacuations qu'après l'expulsion d'un sœtus abortif, & de son arriere-saix; dans l'un, ainsi que dans l'autre cas, le sein se tumésie après plusieurs jours, il en découle une humeur laiteuse, & il y a des vuidanges ou lochies. Le régime que doit garder la semme après l'expulsion d'une môle, devroit donc être le même qu'après l'avortement & l'accouchement, puisqu'elle a les mêmes accidens à redouter.



## CHAPITRE VII.

Préceptes sur le régime & les remèdes généraux qui conviennent aux femmes enceintes; sur les maladies & les accidens qui peuvent survenir pendant la grossesse à après l'accouchement; sur les accidens & les maladies des enfans nouveaux-nés.

S. I. L E régime ne se borne pas au choix & à la quantité des alimens que la semme doit prendre chaque jour, il s'étend sur toutes les choses qui peuvent influer en bien ou en mal sur la santé; tels que l'air qu'on respire, le travail & le repos, les vêtemens, les évacuations, les passions de

l'ame, &c.

Quoiqu'il n'y ait pas d'alimens absolument mauvais pour les semmes enceintes, & qu'on puisse leur accorder ou leur resuser ce qu'elles desirent ardemment, sans craindre que leurs ensans en soient marqués, elles seront cependant bien de présérer les plus succulens & les plus faciles à digérer, parmi ceux que l'opulence ou la médiocrité de leur fortune leur permettra de se procurer. La quantité de ces

alimens sera proportionnée à la constitution de la semme & à ses besoins; mais elle n'en prendra jamais avec excès.

Toutes les boissons fermentées, telles que le vin, le cidre & la bière, conviennent également aux femmes enceintes; elles en useront donc à leur choix, mais toujours avec modération. Celles qui auront de la répugnance pour ces boissons préparées, choissiront l'eau la plus pure. Le casé à l'eau & les liqueurs spiritueuses, donnés avec réserve, sont quelques is trèsutiles pendant la grossesse, loin d'être nuisibles; mais l'excès en est toujours dangereux.

Un air pur & tempéré est celui qui convient le mieux aux femmes enceintes. Celui qui est trop sec ou trop humide, trop chaud ou trop froid, peut nuire à la santé de quelques-unes de ces femmes; l'air chargé de parsums, d'odeurs & de mias-mes putrides pre convient à aucune

mes putrides, ne convient à aucune.

L'exercice est salutaire à ces mêmes femmes; mais il doit être modéré. Celles de la campagne doivent mettre des bornes à leur travail, & se procurer chaque jour un peu plus de repos que dans l'état habituel, sur-tout vers les derniers temps de la grossesse. Elles éviteront de se coucher sur le gazon, ou sur la terre fraîche & humide, pour dormir ou se délasser, soit dans le cours de la journée ou vers le soir; de marcher pieds nuds, &c.,

fur l'Art des Accouchemens. 341 dans la crainte de supprimer la transpiration, & les écoulemens laiteux qui ont souvent lieu pendant la grossesse. Ces femmes ne porteront point de corps balénés, ne se serreront pas trop étroitement dans leurs corsets, & s'habilleront de manière à se désendre du grand froid, & ne pas se procurer trop de chaleur.

La constipation étant très-ordinaire aux femmes grosses, & les efforts nécessaires alors pour aller à la garde-robe pouvant avoir des suites désagréables & même sâcheuses, elles prendront des lavemens de temps à autre, pour se procurer la liberté du ventre. Les lavemens se feront avec de l'eau & un peu de beurre frais; avec une décoction de graine de lin, ou de quelques plantes émollientes.

Si les urines venoient à se supprimer, ou à diminuer considérablement, il faudroit user d'une boisson propre à les augmenter, & à en rétablir le cours; comme l'eau de chiendent, de pariétaire, ou de graine de lin , à laquelle on ajoutera quinze ou dix-huit grains de sel de nitre par pinte.

Les violentes passions n'étant pas moins nuisibles aux femmes enceintes, que les mouvemens extraordinaires du corps, & ne donnant pas moins d'atteintes à la grofsesse, elles observeront de ne s'abandonner à aucunes, & de ne s'en procurer que de douces & agréables.

S. II. Les remèdes généraux qu'on emploie le plus fréquemment dans la groffesse sont la saignée du bras, les lavemens, les purgatifs & les bains: leur usage est même tellement familier, que bien des femmes se dispensent de consulter sur le temps & la nécessité de les administrer, quoique leurs essets ne soient pas indissérens.

La faignée peut être nécessaire dans tous les temps de la grossesse; & souvent plus nécessaire dans le commencement que sur la fin, quoique la plupart des semmes ne s'y soumettent qu'avec regrets avant le quatrième mois & demi. La saignée est indiquée toutes les sois que la semme éprouve, depuis quelques jours, un sentiment de lassitude, de pesanteur & de douleurs dans les membres; de l'engour-dissement, des crampes, de l'oppression, des maux de tête & de reins, des étour-dissements, ou des éblouissemens. On ne doit jamais tirer au-delà de deux palettes de sang à la sois; & il convient que la femme garde le repos le jour de la saignée.

Les lavemens ne conviennent qu'aux femmes qui fort constipées, à celles qui éprouvent de la chaleur & de la douleur dans les entrailles, ou qui sont tourmentées

de coliques.

Il faut être bien plus réservé dans l'em-

fur l'Art des Accouchemens. 543 ploi des purgatifs que dans celui des lavemens. Ils ne sont nécessaires qu'autant qu'il y a des marques de plénitude dans les premières voies, que la semme éprouve du dégoût pour les alimens ordinaires, qu'elle a la bouche pâteuse & amère, la langue épaisse & chargée d'un limon blanchâtre & jaunâtre.

Les purgatits amers conviennent mieux que ceux qui sont gras, huileux & sucrés, & il faut toujours affocier les uns aux autres; mais c'est au Chirurgien ordinaire; & non à la Sage-femme, à les pres-

crire.

1

5

X

L'utilité des bains n'est pas moins évidente, en bien des cas, que celle des autres remèdes généraux; & ils peuvent avoir de même leurs inconvéniens. Si les femmes qui vivent dans l'aisance, au milieu des grandes villes, en usent souvent à l'excès, celles de la campagne sont presque toujours privées des avantages qu'elles pourroient en retirer; soit préjugé contre les bains, soit désaut de moyens pour se baigner.

S. III. Indépendamment de la foule de maladies & des accidens qui peuvent survenir dans le cours de la vie, il en est beaucoup qui semblent dépendre de la grossesse, & qu'on peut attribuer à la manière dont la matrice est affectée par le produit de la conception, au volume

que ce viscère acquiert graduellement, àl la situation qu'il prend en se développant, & à la pression qu'il exerce sur les parties: circonvoisines. On peut en effet rapporter à ces causes, l'inappétence ou les dégoûts. qu'éprouvent la plupart des femmes enceintes; les nausées, le vomissement, le ptialisme ou crachottement; le gonslement: douloureux des mammelles, la tension & la douleur du mammelon; la constipation, la diarrhée, les coliques; la difficulté d'uriner, l'incontinence & la rétention des urines; la toux, l'oppression ou la difficulté de respirer, les palpitations de cœur, le crachement de fang; les douleurs de tête, de dents & des oreilles; les étourdissemens, les éblouissemens, les vertiges, l'infomnie & l'apoplexie; les douleurs & les ardeurs d'estomac; les douleurs des reins & des aînes; les hémorrhoïdes, les varices, le gonflement œdémateux des grandes lèvres, des cuisses, des jambes, des pieds, & de toute l'habitude du corps; certaines descentes, le relâchement du vagin, sa chûte & celle de la matrice; la perte de fang, les con-vulsions, l'avortement, &c.

La plupart de ces maladies & de ces accidens ne sont, pour bien des semmes, que de légères indispositions, qu'elles supportent sans se plaindre; & bien loin de consulter sur les moyens de s'en délivrer,

fur l'Art des Accouchemens. 549 elles refusent même les remèdes qu'on leur propose, persuadées que le temps seul les en guérira. Si ces indispositions n'exigent pas une sérieuse attention lorsqu'elles sont légères, il seroit dangereux de ne pas s'en occuper, quand elles altèrent visiblement la constitution de la femme. Elles demandent toute la sagacité du Médecin ou da Chirurgien; tantôt l'on ne peut y remédier qu'au moyen de la saignée, tantôt par les purgatifs, les amers, les anti-spasmodiques, les délayans, les abforbans, &c.; même par des opérations chirurgicales.

§. IV. Parmi les maladies & les acci-dens qui peuvent troubler l'ordre naturel des suites de couches, il en est de peu S. IV. Parmi les maladies & les accid'importance, dont le traitement peut être confié aux Sages-Femmes; & d'autres trèsgraves, qui demandent les plus profondes connoissances en Médecine ou en Chi-

rurgie.

1

1

La contusion, le gonslement, la déchirure des grandes lèvres, celle de la fourchette & du périné même , lorsqu'elle ne s'étend pas jusqu'à l'anus, sont des accidens légers qui n'exigent que des fomentations, des lotions émollientes & résolutives, répétées plusieurs fois dans le cours de la journée. On se servira d'abord de lait chaud, ou d'une décoction de racine de guimauve, dans laquelle on fera infuser par la suite des sleurs de sureau, de mellilot & de camomille; ou bien à laquelles on substituera l'eau d'orge miellée ou le vin. Ces mêmes accidens demandent pluss de soins, lorsqu'ils sont accompagnés d'inflammation, qu'il se forme des dépôts, que le périnée est déchiré jusqu'à l'anus, &c.. Lorsqu'il y a de la sièvre, insomnie, rétention ou incontinence d'urine, éjections involontaire des matières stercorales, &c..

Les tranchées utérines, les hémor-rhoïdes, le relâchement & le renversement du vagin, la descente de matrice,, la chûte du fondement, les engorgemens; confécutifs du fein, les gerçures ou cre-vasses des mammelons, sont encore des: accidens légers auxquels une Sage-femme: peut remédier. Il n'y a pas de spécifiques: contre les tranchées, mais on emploie: utilement les cataplasmes émolliens & les: fomentations sur la région hypogastrique; les boissons délayantes & adoucissantes, telles que l'eau de veau ou de poulet, l'eau de graine de lin ou de pariétaire, &c. les potions composées d'eau de laitue, de pariétaire, de tilleul, & de fleurs d'orange, avec quelques gouttes de liqueur minérale anodine d'Hoffman, sur chaque cuillerée, & un peu de fyrop de guimauve. Les hémorrhoïdes n'exigent pas un autre

Les hémorrhoïdes n'exigent pas un autre traitement que le gonflement douloureux des parties naturelles, si ce n'est l'appli-

sur l'Art des Accouchemens. 547 cation des fangsues, quand elles sont vo-lumineuses & accompagnées de grandes douleurs. Les engorgemens du sein se guérissent avec les cataplasmes émolliens & résolutifs, &c.

La perte de fang, les convulsions, les fyncopes & le renversement de la matrice, sont des accidens beaucoup plus graves, & qui demandent des secours bien plus

prompts. La pe La perte qui survient immédiatement après l'accouchement, est presque toujours la suite de l'inertie de la matrice; elle peut être abondante ou médiocre, apparente ou cachée; la perte est apparente toutes les sois que le sang se répand au dehors; elle est cachée, quand il s'épanche dans la matrice. Dans l'un & l'autre cas, on fera de fortes frictions avec la main fur la région hypogastrique de la semme, sepour réveiller l'action de la matrice, & exciter ce viscère à se resserrer; on appliquera sur cette région & sur les cuisses, des ferviettes trempées dans l'eau froide & le vinaigre; on injectera de ces liqueurs dans la matrice, & on en versera sur le ventre; on établira un courant d'air froid dans la chambre, & on y exposera la femme couchée bien à plat. Ši la perte continue malgré ces fecours, on tamponnera le vagin, même le col de la matrice, si on le peut, avec des lambeaux de linge

vant alors de tenir une main appuyée fortement sur la région hypogastrique de la femme, pour empêcher que le sang retenui par le tampon ne s'épanche pas dans la matrice.

Quel que soit l'état de soiblesse où se trouve la semme après une perte, il ner faut pas s'empresser de la ranimer, de lau réchausser, & de la remuer pour la changers de lit. On la tiendra dans le plus grandle repos pendant plusieurs heures; on ne luit accordera que quelques cuillerées de bouillon à la sois; on ne lui donnera que de la limonade pour boisson, & au désaut de celle-ci, de l'eau sucrée acidulée avec le vinaigre ordinaire.

Quand la perte est médiocre, & accompagnée de douleurs ou de tranchées, elle: exige des moyens dissérens. Les potions: calmantes & anodines sont plus essicaces alors que ceux dont nous venons de parler.

Les convulsions qui se manifestent à l'instant de l'accouchement peuvent î.re la suite d'une perte abondante; de l'extrême sensibilité qu'acquièrent les organes, dans un travail pénible; du trouble que produisent des efforts long-temps soutenus, & de l'engorgement du cerveau, qui est la suite de ces mêmes efforts; ces convulsions peuvent être l'effet du renversement de la matrice, ou bien elles sont

fur l'Art des Acconchemens. 549
habituelles. Les convulsions sont toujours
fâcheuses, quand elles succèdent à une
perte considérable; elles cèdent à l'usage
des potions calmantes & des bains, lorsqu'elles ne dépendent que de la sensibilité
accidentelle de la semme; elles exigent la
staignée du pied, & souvent de la gorge,
quand elles ont pour cause l'engorgement
du cerveau, &c. Les Sages-semmes doivent
appeiler promptement un Médecin, ou un
Accoucheur, dans tous ces cas.

Les foiblesses ou syncopes, quoique moins alarmantes que les convulsions, peuvent être aussi fâcheuses. On tiendra la femme couchée horifontalement, on dirigera fur elle un courant d'air frais, on lui frottera les tempes & la paume des mains avec un linge trempé dans le vinaigre, ou d'autres liqueurs spiritueuses; & on appliquera autour du ventre le bandage de corps recommandé, page 269 & fuiv. On donnera de temps en temps quelques cuillerées de bon vi 1, s'il n'y a point de perte ; on évacuera les caillots de sang, fi la matrice en renterme, avec l'attention, dans ce dernier cas, d'empêcher qu'il ne s'en forme de nouvelaux.

Le renversement de la matrice est un accident des plus sâcheux, pour l'ordinaire; & presque toujours il est suivi de perte, de convulsion. & de syncopes, si l'on n'y remédie pas sur le champ. L'on

ne peut donner aux Sages femmes une idée plus juste de ce renversement, qu'en comparant la matrice à une bourse retournée sur elle-même, de sorte que le dedans en fasse le dehors. Il peut être

complet ou incomplet.

Dans le premier, la matrice renversée remplit tout le vagin, & forme le pluss souvent au dehors, une tumeur semblables à une poire, mais plus grosse qu'aucunes des poires qui nous soient connues : cette tumeur est plus molle à l'instant où elle paroît, que quelque temps après; elle est plus large en bas que dans son principe, & l'on ne distingue plus l'orifice de la matrice en parcourant le fond du vagin, au moyen du doigt. Voyez Planche XXIX.

Dans le renversement incomplet, la tumeur que forme le sond de la matrice est moins grosse; elle semble sortir de l'orifice même de ce viscère, mais elle ne descend pas au-dessous de la vulve. Voyez Pl. XXX. En palpant le ventre de la semme au-dessus du pubis, dans le premier cas, l'on ne distingue nullement la matrice; mais on la trouve dans le second, & l'on s'apperçoit qu'elle sorme dans sa partie supérieure, une sorte de cavité plus ou moins évasée.

La matrice ne peut pas se renverser ou se retourner, qu'elle ne soit dans l'inertie, que ses parois ne soient souples & slasques

sur l'Art des Accouchemens. 551 au toucher. Les causes capables d'opérer ce renversement sont toutes mécaniques; il faut que quelque chose presse extérieurement sur le fond de la matrice, pour le déprimer & le pousser à travers l'orifice; ou bien qu'une autre puissance, agissant au-dedans de la matrice mêmé, Rentraîne cette partie; ce que fait le placenta, lorsque l'Accoucheur se presse d'opérer la délivrance, en tirant sur le cordon ombilical. Les femmes qui sont d'une constitution molle & délicate; celles qui acconchent précipitamment & fans beaucoup d'efforts, étant debout ou assises; celles qui soutiennent ces efforts après la fortie de la tête & des épaules de l'en-fant, font plus exposées que les autres lau renversement de la matrice, sur-tout lorsque le cordon ombilical est très-court, ou lorsqu'il se trouve contourné plusieurs fois sur le col de l'enfant.

Il est tellement au pouvoir de l'Accoucheur de prévenir le renversement de la simatrice, qu'il ne peut en être le témoin doculaire, sans qu'on ne puisse justement le taxer d'ignorance; & l'impéritie est impardonnable, lorsqu'il a donné lieu à cet accident, en opérant la délivrance

avec trop de précipitation.

L'on préviendra le renversement de la matrice, 1° en empêchant la femme de pousser fortement après la sortie de la

tête & des épaules de l'enfant; 2° et désentorti lant le cor lon ombilical, lorsqu'il décrit plusieurs circulaires sur le col, ou bien en le coupant, si l'on ne peut le développer; 3° en ne procédant à l'extraction du placenta que quand la matrice est bien contractée sur elle-même, & qu'on la sent extérieurement au dessus du pubis, sous la forme d'une boule rénittente & dure.

Quel que soit le degré de renversement, dès qu'on s'apperçoit qu'il existe,, il faut restituer la matrice dans son étatt naturel. On y trouve peu de difficultés,, quand ce renversement est incomplet;; mais souvent on en éprouve de très grandes, & quelquesois d'insurmontables, lorsqu'il est complet. Dans le premier cas, on introduira la main dans le vagin, ont avancera les doigts réunis dans le col'de: la matrice, & on repoussera le fond de: ce viscère. Si la tumeur que forme cette: partie renversée traversoit le col de la. matrice, & descendoit jusques dans le vagin, il faudroit l'embrasser de tous les doigts convenablement écartés, la presser mollement, & la repousser de même. C'est encore de cette manière qu'il faut se comporter pour réduire & retourner une matrice complétement renverlée : on embrassera toute la tumeur, on la pressera sur les côtés, en devant & en arrière en même

même temps, comme pour diminuer son volume, & on la sera repasser à travers l'orifice, en commençant par ce qui en est le plus près. Si le placenta y étoit encore attaché, il ne faudroit pas l'en séparer avant d'entreprendre la réduction.

Si la Sage-femme parvient à réduire la matrice, c'est-à-dire, à la retourner, elle y laissera sa main un instant pour en exciter la contraction & le resserrement: si elle trouve trop de dissicultés à opérer cette réduction, elle appellera, sans perdre de temps, un Accoucheur instruit, qui se comportera relativement aux circonstances, selon qu'il le jugera convenable; car, après les premières heures, la réduction de la matrice n'est plus toujours possible.

Le renversement du vagin & la chûte de la matrice sont des accidens bien dissérens de celui que nous venons de décrire, & ils sont également bien moins fâcheux. La Sage-semme la moins instruite ne prendra jamais l'un pour l'autre, si elle y donne la plus légère attention. Dans le renversement & la chûte du vagin, c'est plutôt une sorte de bourlet, plus ou moins épais, qui sort de la vulve, qu'une tumeur en sorme de poire; & l'on remarque au milieu une ouverture qui conduit au col de la matrice. Dans la chûte ou descente de matrice, quel que soit le

A a

542

volume de la tumeur, qui est au dehors; elle est plus large auprès de la vulve que dans son extrémité inférieure, qui est sormée par le museau de tanche, & où se remarque évidemment l'orifice de la matrice.

On réduit aisément le vagin & la matrice dans ces fortes de cas; & on prévient de même le retour de l'accident, en tenant la femme au lit, & en lui recommandant de ne faire aucuns efforts, soit pour aller à la garde-robe, ou pour rendre ses urines. L'on s'en tient à ces moyens dans les premiers temps; mais dans la suite on emploie utilement les fo-mentations aromatiques, le pessaire, &c.

Les grands accidens dont nous venons de parler ne sont pas les seules occasions où les Sages-semmes doivent appeller un Accoucheur ou un Médecin instruit : il y en a beaucoup d'autres qui paroissent moins graves d'abord, & dans lesquelles la vie de l'accouchée est également en danger. Elles auront recours à ces ministres de santé, 1°. lorsqu'il se manifestera de la fièvre dès les premiers jours; ou bien lorsque celle qui survient au troisième se foutient au - delà du quatrième; lorsque cette fièvre sera précédée ou accompagnée de frisson, de nausées & de vomissement, de coliques & de diarrhée; 2°, toutes les fois que la femme éprouvera

de la chaleur & de la douleur dans toute la capacité du ventre, ou dans un seul point; lorsque le ventre se tumésiera, se tendra, & deviendra sensible à la pression du doigt; 3° lorsque la semme sera agitée au point de ne pouvoir goûter un seul instant de repos, lorsque la tête sera pesante & douloureuse, que les yeux ne pourront supporter la lumière, qu'il y aura des tressaillemens dans les membres, que la langue deviendra épaisse, & se couvrira d'une croûte blanchâtre & jaunâtre; 4° lorsque les lochies se supprimeront tout-à-coup, & ne reparoîtront pas quelques instans après, &c. &c.; car dans tous ces cas, la semme est menacée d'une maladie grave, & souvent mortelle.

S. V. Nous avons déjà donné quelques préceptes sur les soins qu'on doit à l'enfant à l'instant de sa naissance; mais nous n'avons pu rensermer dans la même Section, tout ce qui est relatif aux divers accidens qui peuvent dès-lors influer sur sa vie, & qui exigent conséquemment la plus sérieuse attention de la part des personnes de l'Art. Nous ne serons qu'indiquer ces mêmes accidens, pour que les Sages-semmes, à qui le traitement n'en sauroit être consié, appellent au plutôt un Chirurgien instruit.

es

en

le ne

pa-

40.

200

212

Il est rare que l'enfant n'apporte pas en naissant quelque tumeur à la tête,

Aaij

5 44 quand l'accouchement, quoique naturel, a été pénible & long. Souvent ce n'est qu'une sorte d'empâtement ou de bouffisfure dans une portion des tégumens du crâne, qui se dissipe promptement, si on a le soin d'étuver cet endroit de temps en temps avec du vin chaud, ou de l'eau salée & animée d'un peu d'eau-de-vie. D'autres fois c'est une tumeur remplie de sang, qu'on ne sauroit ouvrir trop tôt; parce qu'elle s'augmente visiblement d'un jour à l'autre, que la résolution ne peut s'en faire, qu'elle a son siège sur les os du crâne, que le trop long séjour du sang pourroit altérer.

La tête de l'enfant, à la suite de ces mêmes accouchemens, paroît quelquefois d'une forme extraordinaire; elle est alongée dans un sens, applatie dans un autre, & comme recourbée sur elle-même, un de ses côtés étant plus arrondi, & l'autre déprimé. Quoique le public soit dans l'opinion que la Sage-femme, dans tous ces cas, doive redonner à la tête sa forme naturelle, en la pétrissant entre les mains, elle n'en fera rien, & elle abandonnera ce foin à la nature. Il n'en est pas de même, quand la difformité de la tête tient à la dépression ou à la fracture des os du crâne; alors on appellera un Chirurgien.

La moindre inattention de la Sagefemme, dans l'accouchement où elle est

Sur l'Art des Accouchemens. 548 obligée de retourner l'enfant, & de l'extraire par les pieds, pouvant donner lieu à la luxation ou à la fracture d'un bras, ou d'une cuisse, elle l'examinera avant de l'emmailloter, pour s'affurer s'il n'y a point de difformités dans l'un ou l'autre de ses membres, s'il les remue aisément & fans donner de marques de grandes douleurs.

L'enfant n'est jamais plus exposé à la luxation de la cuisse, que quand on le tire par un feul pied, ou lorfqu'il vient en présentant les fesses; & à la luxation du bras, que dans ces cas où le bras s'est relevé & porté derrière la tête & le col, à mesure qu'on dégageoit le corps.

Le filet, des brides placées sur les côtés de la langue, l'imperforation de l'anus &z du canal de l'urètre, font les vices de conformation auxquels il est le plus im-portant de remédier dès les premiers jours

de la naissance.

e,

erla

00°

elt

Il n'y a pas une seule semme qui ne foupçonne son enfant d'avoir le filet, lorsqu'il ne peut tetter librement; & qui ne fache que c'est un repli membraneux, mince & comme transparent, qui attache la langue assez étroitement au bord de la mâchoire, pour l'empêcher de fortir de la bouche, & de s'appliquer au palais. Quelques Sages-femmes déchirent ce repli avec l'ongle, sans se douter que ce procédé A a iii

peut avoir des inconvéniens. La fection du filet doit se faire avec des ciseaux; & cette opération, quoique simple en ellemême, doit être faite par un Chirurgien.

L'obturation de l'anus peut influer bien davantage sur la vie de l'enfant, que ne le fait le filet. Quelquesois c'est l'anus même qui est fermé par la peau; d'autres sois c'est l'intestin qui est bouché par une cloison membraneuse plus ou moins éloignée de l'anus; ou bien cet intestin est ob'itéré & manque entiérement. On peut être certain qu'il existe l'un ou l'autre de ces désauts de conformation, quand l'enfant n'évacue pas dans les premières vingt-quatre heures; lorsqu'il fait des essorts instructueux pour évacuer, & que les lavemens ne peuvent pas pénétrer. On peut ouvrir l'anus, & sendre la cloison membraneuse qui serme l'intestin rectum; mais on ne remédie pas à l'oblitération de ce dernier.

L'obstacle qui s'oppose à l'évacuation des urines, ne provient quelquesois, chez les garçons, que de l'obturation du prépuce, ou de l'ouverture du gland de la verge, & on y remédie facilement alors; d'autres sois il dépend de l'oblitération du canal de l'urêtre même, & ce cas est des plus sâcheux, sans l'être cependant autant que celui où l'intestin recum est

sur l'Art des Accouchemens. 547
oblitéré: tous ces cas exigent la présence

d'un Chirurgien.

Il en est de même de beaucoup d'autres vices de conformation plus apparens, tels que le bec-de-lièvre, avec écartement des os du palais, l'union des paupières, l'obturation des narines, l'union des doigts

entre eux, &c.

La chûte prématurée du cordon ombilical, ou sa rupture près de l'ombilic à
l'instant de l'accouchement, sont encore
des accidens qui doivent être connus des
Sages-semmes, en ce qu'ils arrivent sous
leurs yeux, & qu'elles sont obligées d'y
apporter les premiers remèdes. Quand le
cordon se détache avant que les vaisseaux
ne soient oblitérés, ou quand il se déchire à
l'instant de la naissance, on applique de
la charpie rapée sur l'ombilic, on met
pardessus un large morceau de tassetas d'Angleterre, ou un emplâtre agglutinatif quelconque, des compresses, & le bandage de
corps recommandé page 288; on observe
d'ailleurs de ne pas serrer l'ensant dans
ses langes. Si le sang se répand malgré cet
appareil, on doit appeller un Chirurgien.

Les convulsions sont des accidens d'une autre espèce, qui exigent les secours les plus prompts. Celles qui affectent l'enfant dans les premiers jours, dépendent le plus souvent de ce qu'il n'évacue pas assez; on les calme en administrant des

lavemens, de légers purgatifs, &c. Quand elles se répètent après l'administration de ces remèdes, si la face de l'enfant est tumésiée & livide, & s'il reste dans un état d'assoupissement; on applique des sangsues derrière les oreilles, ou aux tempes, & on lui donne de quelques potions calmantes & anti-spasmodiques.

Les autres maladies particulières à ce premier âge de la vie, n'ont pas une marche affez rapide, pour qu'on ne puisse consulter un Médecin ou un Chirurgien.

#### EXPLICATION

## DES PLANCHES XXIX & XXX.

La Planche XXIX représente une matrice complètement renversée.

AA. La matrice renversée.

B. Le fond de la matrice, auquel étoit attaché le placenta.

C. Bourlet formé par la partie antérieure du vagin.

DD. Les grandes levres écartées par la tumeur que forme la matrice.

La Planche XXX représente la matrice renversée incomplétement.

AA. Le corps de la matrice.







sur l'Art des Accouchemens. 549

BB. Le fond de la matrice, formant une tumeur dans l'orifice & dans le vagin.

CC. Le bord antérieur de l'orifice de la

matrice.

D. Enfoncement que décrit dans sa partie supérieure une matrice à demi renversée.

eeee. Les ligamens larges & l'extrémité

des trompes de Fallope.

fff. Le vagin ouvert dans sa partie antérieure.

 $F I N_{\bullet}$ 

# TABLE DES TITRES. PREMIÈRE PARTIE.

DE l'Accouchement en général, de ses différences, & des qualités nécessaires aux personnes de l'un & de l'autre sexe; qui se destinent à l'exercice de l'Art d'accoucher,

page 1.

CHAD I Down with J. I Committee
CHAP. I. Des parties de la femme qui ont rapport
a ca generation, a la grosselle G a l'accouchement. 6
ART. I. Du Baffin. ibid.
SECT. I. Des os des îles.
SECT. II. De l'os facrum.
SECT. III. Du Coccyx.
SECT. IV. De la connexion des os du bassin entre
eux, de celle du bassin même avec la colonne ver-
tébrale & les extrémités inférieures. 16
SECT. V. De l'état des symphises des os du bassin,
de l'altération qu'elles éprouvent quelquefois, soit
pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement.
SECT VI Division du Ratio
SECT. VI. Division du Bassin. 27
SECT. VII. Des vices de conformation du bassin. 35
SECT. VIII. Des parties molles qui ont rapport au
baffin. 45
SECT. IX. De la manière d'examiner le bassin pour
reconnoître s'il est bien ou mal conformé. 49
ART. II. Des parties molles qui ont rapport à la
génération, à la grossesse & à l'accouchement. 56
SECT. I. Des parties externes. ibid.
SECT. II. Des parties molles internes. 64
SECT. III. De la matrice considérée dans l'état de
grossesses 77
CHAP. II. Des règles, de la fécoudité, de la sté-
rilies & de la concentian

TINE DEC TIMES
TABLE DES TITRES. 551
SECT. I. Des règles. ibid
SECT. II. De la sécondité & de la stérilité. 88
SECT. III. De la conception & de la génération. 91
CHAP. III. De la groffesse, de ses différentes espèces,
Sect. I. De la grossesse & de sa division.
SECT. III. Du toucher, de son utilité, & de la ma-
nière d'y procéder.
CHAP. IV. Du fœtus, du placenta, du cordon
ombilical, des membranes & des eaux. 113
SECT. I. Du fætus. ibid.
CHAP. V. Du placenta, du cordon ombilical, des
membranes & des eaux. 134
SECT. I. Du placenta. ibid.
SECT. II. Du cordon ombilical.
SECT. III. Des membranes du fœtus. 142
SECT. IV. Des eaux de l'amnios.
SECT. V. De la nutrition du fœtus & de ses dépen-
dances.
CHAP. VI. De l'accouchement naturel en général,
& de ses différences.
SECT. I. Des causes de l'accouchement en général,
& particulièrement de l'accouchement naturel. 155
SECT. II. Des signes de l'accouchement. 161
SECT. III. De l'accouchement dans lequel l'enfant
présente le sommet de la tête à l'orifice de la ma-
trice. 172
SECT. IV. De l'accouchement dans lequel l'enfant
présente les pieds, considéré comme naturel. 186
SECT. V. Des accouchemens où l'enfant présente les
genoux & les fesses. 195
CHAP. VII. Des soins qu'on doit donner à la semme
pendant l'accouchement, & de ceux qu'exigent
l'enfant immédiatement après sa naissance. 200
SECT. I. Des choses auxquelles l'Accoucheur doit
donner toute son attention des le commencement du
srayail de l'accourhement. 201

552 TABLE DES TITRES.
SECT. II. Du régime & des remèdes généraux qu'il convient de prescrire dans le cours du travail. 204
SECT. III. Du lit & des choses néces Caixas pour l'as
SECT. III. Du lit & des choses nécessaires pour l'ac- couchement.
SECT. IV. Des secours dont la semme peut avoir
besoin dans les derniers temps de l'accouchement.
214
SECT. V. Des soins qu'on doit à l'enfant immédia-
tement après sa naissance. 227
CHAP. VIII. De la délivrance. 238
SECT. I. Du temps où il convient d'aider la femme
à se délivrer dans les ças les plus ordinaires, &
de la manière de le faire.
SECT. II. Des cas qui rendent la délivrance plus difficile ou qui exigent quelques préqueines porti-
difficile, ou qui exigent quelques précautions parti- culières, relativement au temps & à la manière d'y
procéder. 244
CHAP. IX. Du traitement de la femme après l'ac-
couchement, & des soins qu'en doit lui donner
immédiatement après la délivrance. 266
immédiatement après la délivrance. 266 SECT. I. De l'habillement des femmes en couche.
268
SECT. II. Du régime que doit observer la semme en
CHAD Y De Permaille terrant for du rigina de Per
CHAP. X. De l'emmaillotement & du régime de l'en- fant. 285
SECT I De l'emmaillotement ibid
SECT. II. Du régime de l'enfant jusqu'à l'époque du
sevrage. 294
SECT. III. Du choix d'une nourrice.
SECT. IV. De l'allaitement au biberon, ou de la
manière de nourrir l'enfant avec le lait des ani-
maux.
SECT. V. Suite de la nourriture de l'enfant jusqu'au
terme du sevrage. 319

#### SECONDE PARTIE.

CHAP. I. De l'accouchement contre nature & labo?
rieux, des causes qui peuvent le rendre tel, &ca
328
ART. I. Des causes qui peuvent rendre l'accouche-
ment contre nature ou laborieux, des signes qui
feront reconnoître que l'accouchement sera tel, &
de ce qu'il faut faire dans chacun de ces cas, 329
SECT. 1. De la mauvaise situation de l'enfant, de
sa conformation monstrueuse. 330
SECT. II. Des accidens qui peuvent se manifester dans
le cours de l'accouchement, & le rendre contre na-
ture.
SECT. III. Des vices de conformation, des accidens
& maladies des parties de la semme, qui peuvent
rendre l'accouchement difficile.  SECT. IV. De l'obliquité de la matrice.  342
SECT. IV. De l'obliquité de la matrice.
SECT. V. De la rupture de la matrice considérée
comme cause d'acconchement difficile.

SECT. VI. Des conceptions ou grossesses extra - utérines. ART. II. Des préceptes généraux relatifs à la ma-

nière d'opérer l'accouchement contre nature ou difficile, & des devoirs que la religion preserit dans quelques-uns de ces cas.

SECT. I. Des préceptes relatifs à la manière d'opérer les accouchemens contre nature.

SECT. II. Des devoirs que prescrit la Religion. 370 CHAP. II. Des accouchemens où l'enfant présente les pieds, les genoux & les fesses, & de la manière d'opérer ces accouchemens.

ART. I. Des acconchemens dans lesquels l'enfant présente les pieds. ibid.

SECT. I. De la conduite qu'on doit tenir en général, lorsque les pieds se présentent. SECT. II. De la manière d'extraire l'enfant, dans

554 TABLE DES TITRES.
la position des pieds qui les talons regardent le côt
SECT. III. De la manière d'opérer l'escoveles
for jant prefente les pieds dans la deuxième
secr. IV. De l'arrachement du tronc de l'enfant, o
de ja jeparation a avec la tete.
De l'arrachement de la tête, on de sa séparation de tronc.
ART. II. Des accouchemens dans lesouels l'enforce
projette tes gertoux.
ART. III. De la manière d'opérer l'accouchement quand l'enfant présente les sesses 390
SECT. 1. Du jugement qu'on doit porter sur l'accou
chement où l'enfant présente les sesses. ibid SECT. II. De la manière de dégager les pieds de l'en
141 WILL DIELETTE IPC POLLOC
CHAP. III. Des accouchemens où l'enfant présent le sommet de la tête, la face, la poitrine & l
ens ventre.
ART. I. Des accouchemens où le sommet de la têu se présente.
SECT. I. Des causes qui peuvent rendre l'accouche
sente aifficile, quand le sommet de la tête se présente.
Des obstacles qui proviennent de la situation même
de la tête.  Des obstacles qui proviennent de la sortie d'une main,
ou a un plea avec la lere.
Les obstacles qui dependent de la grosseur de la tête
De l'enclavement de la tête.
Des signes de la mort de l'enfant.
SECT. II. De la manière de retourner l'enfant, quand le sommet de la tête se présente à l'orifice de la matrice.
mainte.
ART. II. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la face à l'orifice de la matrice. 427.
4.27

TABLE DES TITRES. 555

SECT. I. Des fignes qui caractérisent la face, & de ce qu'il convient de saire, en général, quand cette partie se présente.

SECT. II. De la manière d'opérer l'accouchement où l'enfant presente la face.

ART. III. Des accouchemens où l'enfant présente le devant du col & la poitrine à l'orifice de la matrice.

SECT. I. Des signes & des différences de ces sortes d'accouchemens.

SECT. II. De la manière d'opérer l'accouchement où l'enfant présente le devant du col & la poitrine. 437 ART. IV. Des accouchemens où l'enfant présente le

ventre à l'orifice de la matrice. 440

SECT. I. De l'attitude de l'enfant, lorsqu'il présente le ventre, & des signes de cette espèce générale d'accouchemens.

SECT. II. De la manière d'opérer l'accouchement lorfque l'enfant présente le ventre.

CHAP. IV. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la région occipitale, le derrière du col, le dos & les lombes à l'orifice de la matrice.

ART. I. Des accouchemens où l'enfant présente la région occipitale & le derrière du col. ibid.

SECT. I. Des signes qui font connoître ces parties, & du jugement qu'on doit porter sur ces sortes d'accouchemens.

SECT. II. De la manière d'opérer l'accouchement, quand l'enfant présente le derrière de la tête & du col. 450

ART. II. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le dos à l'orifice de la matrice.

SECT. I. Des signes qui font reconnoître le dos, & du jugement qu'on doit porter sur ces sortes d'accouchemens. ibid.

SECT. II. De la manière d'opérer l'accouchement où l'enfant présente le dos.

ART. III. Des accouchemens où l'enfant présente les lombes à l'orifice de la matrice.

350	T	A B	LE	DE	S	$T_1$	TR	ĔŠ.
-----	---	-----	----	----	---	-------	----	-----

CHAP. V. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les diverses régions de l'un & l'autre côtés du corps. 465 ART. I. Des accouchemens dans lesquels l'enfans présente un des côtés de la tête à l'orifice de la matrice. SECT. I. Des signes qui caractérisent ces sortes d'accouchemens, &c. ibid. SECT. II. De la manière de procéder à l'accouchement dans tous les cas où l'enfant présente l'un des côtés de la sête. ART. II. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente l'une ou l'autre épaule à l'orifice de la matrice. 476 SECT. I. Des signes qui font connoître que l'enfant présente une des épaules. SECT. II. De la manière de procéder à l'accouchement dans tous les cas où l'une des épaules se présente. SECT. III. De la sortie du bras & de la main de l'enfant, quand l'une des épaules se présente, & de ce que doit faire l'Accoucheur à cette occasion. 486 ART. III. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente un des côtés proprement dit, & la hanche. SECT. I. Des signes qui font reconnoître ces parties; & du jugement qu'on doit porter de l'accouchement. SECT. II. De la manière d'opérer l'accouchement dans tous les cas où l'enfant présente le côté & la hanche. 500 CHAP. VI. De la grossesse & de l'accouchement de plusieurs enfans; de l'avortement ou fausse couche; du faux travail & des fausses grossesses. ART. I. De la groffesse & de l'accouchement de plusieurs enfans. ibid. SECT, I. Des signes de la grossesse composée de plu-

509

sieurs enfans.

TABLE DES TITRES. 557	
SECT. II. De la manière dont s'opère l'accouchement;	
lorsqu'il y a plusieurs enfans, & de ce que doit saire	
APT II D''	
Titl. II. De l'avoitement.	
SECT. I. Des causes & des signes de l'avortement.	
SECT II Des manuel 1 mg/ 1 mg	
SECT. II. Des moyens de prévenir l'avortement, &	
des secours qu'on deit donner à la semme dans le	
temps même où il se fait.  ART. III. Du faux travail.  523 527	
ART IV Des fausses arolles de leure some 6.	
ART. IV. Des fausses grossesses, de leurs signes & de leurs suites.	
SECT. I. Des signes qui indiquent les différentes espèces	
de taulles arallelles	
SECT. II. De l'expulsion de la mble & des autres	
substances qui constituent la fausse grossesse. 536	
CHAP. VII. Préceptes sur le régime & les remèdes	
generaux qui conviennent aux femmes enceintes; sur	
les maladies & les accidens qui peuvent survenir	
pendant la grossesse & après l'accouchement; sur les	
accidens & les maladies des enfans nouveaux-nés.	
539	
S. I. Du régime. ibid.	
§. II. Des remèdes généraux.	
S. III. Des maladies & accidens qui surviennent	
pendant la groffesse. 543	
S. IV. Des maladies & accidens qui peuvent suivre l'accouchement.	
S. V. Des maladies & accidens des enfans nouveaux-	
nés. 546	
1174	

Fin de la Table

EXTRAIT des Registres de l'Académie royale de Chirurgie. Du Jeudi 31 Mai 1787.

MESSIEURS VERMONT & BY, que l'Académie avoit nommés pour examiner un Ouvrage de M. BAUDELOCQUE, intitule: Principes sur l'Art des Accouchemens, en faveur des Sages-femmes de la Campagne, publiés par ordre du Gouvernement; ayant dit, dans leur rapport, que cet Ouvrage répond aux vues de sagesse & d'humanité qui en ont fait desirer l'exécution; qu'il contient des instructions lumineuses très - utiles, non - seulement pour les Sages - femmes de la Campagne, auxquelles il est destiné, mais encore aux jeunes Chirurgiens qui se proposent de se livrer à la pratique des Accouchemens, &c. L'Académie a permis à l'Auteur de faire imprimer cet Ouvrage sous le Privilège de la Compagnie: en foi de quoi je lui ai délivré le présent extrait des registres, que je certifie vécitable. A Paris, le 5 Juin 1787.

Signé LOUIS, Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Chirurgie,

